



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

KF  
2715

NEDL TRANSFER  
  
HN 2XPL Z

KF 2715

Harvard College Library



FROM THE LIBRARY OF  
CHARLES SANDERS PEIRCE  
(Class of 1859)  
OF MILFORD, PENNSYLVANIA

GIFT OF  
MRS. CHARLES S. PEIRCE  
June 28, 1915





# RECUEIL DE FORMULES

ET DE

# TABLES NUMÉRIQUES,

PAR J. HOÜEL,

Ancien Elève de l'École Normale, Professeur de Mathématiques pures  
à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

---

TROISIÈME ÉDITION.



PARIS,

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE  
DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,  
SUCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,  
Quai des Augustins, 55.

1885

(Tous droits réservés.)

K F 2715

Harvard College Library  
June 28, 1915.  
Gift of  
Mrs. Charles S. Peirce



L'Auteur et l'Éditeur de cet Ouvrage se réservent le droit de le reproduire ou de le faire traduire en toutes langues. Ils poursuivront, en vertu des Lois, Décrets et Traités internationaux, toutes contrefaçons ou toutes traductions faites au mépris de leurs droits.

Le dépôt légal de cet Ouvrage a été fait à Paris, et toutes les formalités prescrites par les Traités sont remplies dans les divers États avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires.

---

Tout exemplaire du présent Ouvrage qui ne porterait pas, comme ci-dessous, la griffe du Libraire-Éditeur, sera réputé contrefait. Les mesures nécessaires seront prises pour atteindre, conformément à la loi, les fabricants et les débitants de ces exemplaires.

*Gauthier Villars*



# TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
AVERTISSEMENT.....	v
INTRODUCTION. — DISPOSITION ET USAGE DES TABLES.....	xi
Formules relatives aux fonctions hyperboliques.....	xxx
Formules relatives aux fonctions elliptiques.....	xxxiii
Exemples d'applications numériques des fonctions elliptiques.....	lxi
TABLE I. — Logarithmes vulgaires ou décimaux des 2000 premiers nombres.	2
TABLE II. — Antilogarithmes.....	6
TABLE III. — Logarithmes d'addition et de soustraction.....	8
TABLE IV. — Logarithmes du rapport $\frac{1+x}{1-x}$ .....	12
TABLE V. — Table abrégée pour le calcul des logarithmes vulgaires à 15 décimales.....	14
TABLE VI. — Logarithmes naturels ou hyperboliques à 4 décimales.....	16
TABLE VII. — Table abrégée pour le calcul des logarithmes naturels à 20 décimales.....	18
TABLE VIII. — Tables de conversion des logarithmes naturels en logarithmes vulgaires, et des parties décimales du rayon en parties décimales du quadrant, et réciproquement, ou Tables des multiples de $M, \frac{1}{M}, \frac{2}{\pi}, \frac{\pi}{2}$ .....	19
TABLE IX. — Valeurs naturelles des fonctions circulaires, à 4 décimales, de 15' en 15' d'arc, ou de minute en minute de temps.....	20
TABLE X. — Logarithmes des fonctions circulaires, à 4 décimales, de minute en minute jusqu'à 100', et de 10' en 10' pour le reste du quadrant....	23
TABLE XI. — Logarithmes des fonctions circulaires à 4 décimales de 6' en 6' ou de dixième en dixième de degré.....	26
TABLE XII. — Valeurs naturelles, à 3 décimales, des fonctions circulaires, pour chaque centième du quadrant, avec la conversion des parties décimales du quadrant en parties sexagésimales.....	30

	Pages.
TABLE XIII. — Logarithmes des fonctions circulaires à 3 décimales, de centième en centième du quadrant, et à 4 décimales de millièrne en millièrne du quadrant.....	31
TABLE XIV. — Valeurs naturelles et logarithmiques des fonctions circulaires et hyperboliques, pour des arcs croissant de millièrne en millièrne du quadrant.....	36
TABLE XV. — Valeurs naturelles des fonctions circulaires à 10 décimales.	56
TABLE XVI. — Tables de fonctions elliptiques.....	57
TABLE XVII. — Tables de diverses transcendantes.....	60
TABLE XVIII. — Table des carrés à 4 décimales des nombres depuis 0,000 jusqu'à 1,200.....	62
TABLE XIX. — Tables de puissances.....	64

---

## AVERTISSEMENT.

---

En rédigeant ce Recueil de formules et de Tables, je me suis proposé un double but. J'ai voulu, d'une part, rassembler des Tables abrégées à l'usage des personnes qui s'occupent d'applications numériques n'exigeant pas beaucoup d'approximation, ce qui est le cas d'une grande partie des calculs d'Astronomie ou de Physique; mais, d'autre part, mon dessein principal a été de venir en aide à ceux qui étudient les parties élevées des Mathématiques, et auxquels la mise en nombre des formules peut faciliter l'intelligence des théories, en jouant un rôle analogue à celui des expériences dans l'enseignement des sciences physiques.

Pour remplir ce double objet, et pour pouvoir en même temps offrir une série de Tables aussi complète que possible sous un mince volume, j'ai construit les diverses Tables avec un petit nombre de décimales, avec quatre généralement, ce qui suffit dans la plupart des calculs vraiment pratiques. J'ai cependant inséré dans ce volume quelques Tables avec un grand nombre de figures, servant de complément aux grandes Tables logarithmiques ordinaires, et destinées aux calculs qui exigent une approximation exceptionnelle.

Dans la plupart des cas, l'interpolation de ces Tables peut se faire à simple vue. Aussi ai-je cru inutile d'y ajouter les parties proportionnelles des différences, qui, pour être d'une utilité réelle, auraient dû souvent occuper autant de place que les Tables elles-mêmes. D'ailleurs on suppléera toujours, avec un grand avantage, aux Tables auxiliaires de parties proportionnelles, en employant l'admirable instrument connu sous le nom de *règle à calcul*, et dont un préjugé inexplicable, contre lequel je ne saurais trop énergiquement protester, a jusqu'ici retardé l'adoption universelle par les calculateurs.

Cet Ouvrage se compose de deux Sections principales : d'un Recueil de formules relatives aux applications pratiques des fonctions elliptiques, et d'une série de Tables mathématiques qui permettent de mettre ces formules en nombres.

Comme préliminaires aux formules de la théorie des fonctions elliptiques, j'ai donné les principales formules relatives à des fonctions, analogues aux fonctions circulaires ou trigonométriques, auxquelles Lambert a donné le nom de *fonctions hyperboliques*, parce qu'elles expriment les coordonnées de l'hyperbole équilatère, de même que les fonctions trigonométriques expriment les coordonnées du cercle.

L'espace ne m'a pas permis d'indiquer les nombreux usages de ces

fonctions hyperboliques dans le calcul intégral. On trouvera d'amples développements sur ce sujet dans les ouvrages de Gudermann (\*) et de M. Gronau (\*\*), ainsi que dans divers Mémoires répandus dans les *Archives de Mathématiques* de M. Grunert. J'ai seulement transcrit les formules fondamentales, en les accompagnant d'applications numériques à diverses questions de Géométrie et de Mécanique, principalement à celles qui conduisent aux transcendentes elliptiques, et où les fonctions hyperboliques jouent un rôle aussi capital que les fonctions circulaires. On verra, d'après les cas que j'ai traités, de quelle utilité pratique seraient des Tables plus étendues de ces importantes fonctions.

Pour les formules concernant les fonctions elliptiques, j'ai pris pour point de départ la théorie des fonctions  $\mathfrak{F}$ , sur laquelle sont fondées les méthodes les plus simples et les plus directes pour le calcul numérique et pour l'étude théorique des transcendentes elliptiques. J'ai consulté principalement les ouvrages de Legendre, de Jacobi, de Gudermann (\*\*\*), de Schellbach (\*\*\*\*), qui sont ceux où le point de vue pratique a reçu le plus de développement.

J'ai conservé autant que possible les notations classiques de l'auteur des *Fundamenta nova*, en les abrégeant un peu, à l'exemple de Gudermann, et me conformant seulement, pour les fonctions  $\mathfrak{F}$ , à l'usage, adopté généralement aujourd'hui, de prendre pour argument de ces fonctions, non plus l'intégrale elliptique  $u$ , mais le produit  $x = \frac{\pi u}{2K}$ . Je n'ai pas cru cependant devoir aller dans cette

voie aussi loin que l'a fait M. Schellbach dans l'ouvrage cité, et j'ai continué à prendre l'intégrale  $u$  pour argument des *fonctions elliptiques*, qui sont les rapports deux à deux des fonctions  $\mathfrak{F}$ .

J'ai désigné provisoirement les intégrales elliptiques de troisième espèce au moyen des notations proposées par Gudermann, en y ajoutant, par analogie, un symbole pour représenter, au même point de vue, en fonction de  $u$  et de  $a$ , la transcendente  $\Pi(\varphi, n)$  de Legendre. Ces notations provisoires ne m'ont servi qu'à formuler brièvement les propriétés essentielles des intégrales de troisième espèce. Elles n'offrent guère d'utilité dans la pratique, où l'on remplace toujours ces intégrales par leurs expressions au moyen des fonctions  $\mathfrak{F}$ .

Ce Recueil de formules est terminé par quelques applications pratiques des fonctions elliptiques, qui montrent bien quelle grande simplification on introduit dans les calculs par l'emploi des fonctions hyperboliques proposé par Gudermann. J'ai résumé, en faisant usage de cette notation, les belles formules du *Mémoire* de Jacobi sur la *rotation des corps*, et l'on voit sans peine combien ces formules

(\*) *Theorie der Potenzial- oder Cyklisch-hyperbolischen Functionen*. 1 vol. in-4, extrait du *Journal de Crelle*, tomes VI, VII, VIII et IX.

(\*\*) *Tafeln für sämtliche trigonometrische Functionen der cyklischen und hyperbolischen Sektoren*. Danzig, 1863.

*Theorie und Anwendungen der hyperbolischen Functionen*. Danzig, 1865.  
Voyez aussi l'Introduction des *Tavole dei logaritmi delle funzioni circolari ed iperboliche*, dal dott. Ang. Forti. Pisa, 1863.

(\*\*\*) *Theorie der Modular-Functionen und der Modular-Integrale*. 1 vol. in-4, extrait des tomes XVIII-XXV du *Journal de Crelle*.

(\*\*\*\*) *Die Lehre von den elliptischen Integralen und den Theta-Functionen*. Berlin, 1864.

gagnent par là en élégance et en simplicité, et combien leur mise en nombre devient facile par l'usage des Tables de fonctions hyperboliques. C'est ce que prouvent les calculs que j'ai effectués pour quelques-unes de ces formules.

La seule opération un peu pénible dans ces sortes de calculs, c'est la détermination d'une intégrale elliptique de première ou de seconde espèce, correspondante à une amplitude et à un module donnés. Pour faciliter ce travail, il serait bien à désirer que l'on possédât des Tables plus étendues, s'il est possible, que celles de Legendre, et d'une disposition plus commode. En attendant que de pareilles Tables aient été construites, on y supplée par des méthodes de calcul assez expéditives, tirées, soit de la transformation de Landen, soit de la théorie des fonctions  $\vartheta$ . C'est ce dernier moyen que j'ai employé pour construire la petite Table (page 58) qui donne les logarithmes de  $F(\varphi, \theta)$  pour les valeurs des deux arguments voisines de  $\frac{\pi}{2}$ , de centième en centième du quadrant.

Les Tables qui forment la seconde Section de l'Ouvrage peuvent se diviser en trois parties principales, comprenant : la première, les logarithmes vulgaires et naturels; la seconde, les fonctions circulaires et hyperboliques; la troisième, les Tables de diverses transcendentes et les Tables de puissances.

Parmi les Tables dont se compose la première partie, les Tables I et II, qui donnent avec quatre décimales les logarithmes des 2000 premiers nombres et les antilogarithmes, n'offrent rien de particulier dans leur disposition.

La Table III des logarithmes d'addition et de soustraction présente une disposition un peu différente de celle que j'avais adoptée pour les Tables analogues contenues dans mon précédent Recueil. L'expérience m'a démontré l'avantage de cette modification, grâce à laquelle le maniement de ces Tables acquiert une plus grande régularité, sans que la précision en souffre, comme cela a lieu lorsqu'on adopte les dispositions que j'ai critiquées dans l'Avvertissement de mes Tables à cinq décimales.

Par la combinaison des deux Tables d'addition et de soustraction, on forme une troisième Table donnant, pour chaque valeur de  $\log x$ , le logarithme du rapport  $\frac{1+x}{1-x}$ . L'idée de la construction de cette Table est due à Gauss, qui en fit calculer une semblable, vers 1829, par son élève Weidenbach. Cette Table a été insérée dans l'édition donnée par Jahn des Tables de Maurice de Prasse (\*). Gauss en recommande l'usage dans divers calculs trigonométriques, notamment pour la résolution des équations

$$p \sin(A + P) = a, \quad p \sin(B + P) = b,$$

qui donnent (*Theoria motus corp. cœl.*, art. 78)

$$\operatorname{tang} \left( \frac{A + B}{2} + P \right) = \frac{a + b}{a - b} \operatorname{tang} \frac{A - B}{2}.$$

---

(\*) *Moritz v. Prasse's logarithmische Tafeln für die Zahlen, Sinus und Tangenten, revidirt u. s. v. von K. Br. Mollweide und G. A. Jahn. Leipzig, o. J., in-16.*

J'ai donné à cette Table la même disposition et la même étendue qu'à la Table des logarithmes d'addition et de soustraction.

Les Tables V et VII, qui servent à calculer les logarithmes vulgaires et les logarithmes naturels avec un grand nombre de figures, sont, comme la Table analogue du précédent Recueil, extraites du *Supplément logarithmique* de Leonelli. J'ai eu soin de vérifier tous les logarithmes qu'elles renferment.

Les Tables VI et VIII ne donnent lieu à aucune remarque spéciale.

Dans la seconde partie, j'ai rassemblé des Tables des valeurs, tant naturelles que logarithmiques, des fonctions circulaires, construites suivant les diverses divisions angulaires qui ont été proposées jusqu'ici. Les deux premières correspondent à la division sexagésimale pure, soit du jour, soit du quadrant. La suivante, Table XI, se rapporte au système mixte imaginé par Briggs, et peut servir également dans la cas où l'on divise le degré en minutes et dans celui où on le divise en parties décimales. J'ai pu profiter de l'avantage que m'offrirait cette division pour donner à la Table une disposition à *double entrée*, favorable à la rapidité des calculs.

Les quatre Tables qui viennent ensuite se rapportent à la division décimale du quadrant. J'ai fait ressortir ailleurs les immenses avantages que présente cette division naturelle sur les divisions artificielles jusqu'ici en usage (\*), et les exemples numériques que j'ai développés justifieront la cause que je défends, comme on peut le voir en reprenant les mêmes calculs à l'aide des Tables sexagésimales.

La première de ces Tables, la Table XII, donne les valeurs naturelles des fonctions circulaires avec trois décimales. La suivante, la Table XIII, contient les valeurs logarithmiques à quatre décimales, et est disposée à double entrée, comme la Table XI. La Table XV donne les valeurs naturelles avec dix décimales.

La Table XIV, dont il nous reste à parler, forme la partie la plus importante de notre volume. Elle contient les valeurs, tant naturelles que logarithmiques, des fonctions circulaires, de millièmière en millièmière du quadrant, et, par l'addition de deux colonnes auxiliaires, sert en même temps de Table pour les fonctions hyperboliques. Je me suis inspiré, pour la construction de cette Table, de l'ouvrage de M. Gronau, que j'ai cité plus haut; mais j'ai modifié sa disposition de manière à rassembler sur une même ligne toutes les fonctions d'un même argument, circulaire ou hyperbolique. De plus, j'ai donné deux évaluations du double secteur hyperbolique, savoir : sa valeur propre et son produit par le module des logarithmes vulgaires; en d'autres termes, l'argument hyperbolique

$$u = \log \operatorname{tang} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)$$

est exprimé, sur chaque page de droite, par un logarithme naturel, et sur chaque page de gauche, par un logarithme décimal. La pratique montre que ces deux modes d'évaluation ont chacun leurs avantages, suivant les cas que l'on traite.

---

(\*) *Essai critique sur les principes fondamentaux de la Géométrie élémentaire*, Note V. — *Note sur les avantages qu'offrirait, pour l'Astronomie théorique et pour les sciences qui s'y rapportent, la construction de nouvelles Tables trigonométriques suivant la division décimale du quadrant* (*Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft*, 2<sup>e</sup> cahier, p. 86).

Cette Table peut servir en même temps à faire connaître les puissances positives et négatives de  $e$ ,

$$e^u = \text{Chu} + \text{Shu}, \quad e^{-u} = \text{Chu} - \text{Shu}.$$

Toutes les valeurs relatives aux fonctions circulaires ont été extraites de la *Trigonometria Britannica* de Briggs.

La troisième partie se compose de Tables des fonctions elliptiques et d'autres transcendentes importantes, d'une Table des carrés et de diverses Tables de puissances.

Les petites Tables de fonctions elliptiques ont été en partie extraites des Tables de Legendre, en partie calculées directement. Les unes peuvent s'interpoler et servir ainsi au calcul effectif des valeurs quelconques de ces fonctions; les autres ont plutôt pour but de montrer la marche générale des transcendentes qu'elles renferment, ce qui suffit souvent pour la discussion des questions.

Les autres transcendentes, dont on trouvera ici des Tables abrégées, sont les fonctions  $\Gamma$ , le logarithme intégral et la fonction

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$ , qui est d'un grand usage dans le calcul des probabilités.

Vient ensuite une Table à quatre décimales des carrés des nombres depuis 0,000 jusqu'à 1,200. Cette Table est destinée aux calculs de la méthode des moindres carrés.

Enfin, la dernière page renferme diverses Tables de puissances d'un fréquent usage dans les calculs.

Dans ce travail, pour lequel je n'avais souvent aucun modèle qui pût me guider, j'ai dû laisser sans doute beaucoup de points incomplets. Sans doute aussi je n'ai pu, malgré tous mes soins, faire disparaître toutes les incorrections, soit dans les formules, soit dans les calculs numériques. J'espère cependant que le public saura gré à la *Société des Sciences physiques et naturelles* de Bordeaux de m'avoir mis à même de publier cet essai, qui pourra un jour donner l'idée de composer un ouvrage plus étendu et plus parfait.

Pour assurer du moins à cet opuscule le mérite de la correction typographique, je prie instamment toutes les personnes qui y découvriront quelque faute, si légère qu'elle soit, de vouloir bien m'en donner avis, soit directement, soit par l'intermédiaire de M. Gauthier-Villars. Les fautes seront indiquées dans les *Nouvelles Annales de Mathématiques*, et les personnes qui les auront signalées recevront en retour un exemplaire corrigé.

---

partie  
corrections,

---

à cinq déci-

—

(\*) *Essai sur*  
*Note V. — Sur*  
*les sciences qu'*  
*suivant la divis.*  
*gesellschaft, 2<sup>e</sup> c<sup>1</sup>*



---



---

# INTRODUCTION.

---

## DISPOSITION ET USAGE DES TABLES.

---

### I.

(Pages 2-5.)

#### Logarithmes vulgaires à 4 décimales des 2000 premiers nombres.

1. Nous avons prolongé cette Table jusqu'à 2000, pour faciliter les calculs d'interpolation des logarithmes des nombres voisins de l'unité, ces logarithmes étant ceux que l'on rencontre le plus fréquemment dans les applications, et qui correspondent, dans le premier millier, aux différences tabulaires les plus considérables.

A l'aide des logarithmes des rapports  $\frac{\sin}{\text{arc}}$ ,  $\frac{\tan}{\text{arc}}$ , que donnent les Tables auxiliaires placées au bas des pages 3 et 5, la Table I peut servir de Table trigonométrique pour les petits arcs inférieurs à  $0^{\circ}, 05$ . Ainsi, pour avoir  $\log \sin (0^{\circ}, 03658)$ , on ajoutera au logarithme  $\bar{2},5633$  de l'arc exprimé en quadrants, le logarithme de la colonne marquée  $\sin : \text{arc}$  correspondant à  $0^{\circ}, 036\dots$ , c'est-à-dire  $0,1959$ , ce qui donne  $\bar{2},7592$  pour le logarithme cherché. Voyez l'*Introduction aux T. à 5 D.* (\*), pages xvi et xix.

---

### II.

(Pages 6-7.)

#### Table antilogarithmique à 4 décimales.

2. Cette Table ne diffère en rien de celle qui fait partie des *T. à 5 D.*, et dont l'usage a été expliqué (*Introduction*, page xxxi).

---

### III.

(Pages 8-11.)

#### Logarithmes d'addition et de soustraction à 5 décimales.

3. L'usage de ces Tables a été longuement développé dans l'*Introduction aux T. à 5 D.*, pages xxi et suiv., et nous n'y reviendrons que pour indiquer les modifications que les Tables actuelles présentent dans leur disposition.

Les Tables de notre précédent recueil, de même que celles de Gauss, offraient l'inconvénient d'avoir des différences tabulaires négatives; et, de plus, la partie la plus importante de ces Tables, celle qui sert à calculer de petites corrections,

---

(\*) Nous désignerons ainsi, pour abrégé, nos *Tables de Logarithmes à cinq décimales*, auxquelles le présent Recueil sert de complément.

et qui correspond à des valeurs très-inégaies des deux termes du binôme  $a \pm b$ , se trouvait rejetée vers la fin. La disposition que nous avons adoptée rend les différences tabulaires positives, comme dans les Tables de logarithmes ordinaires, et nous permet de placer en tête des deux Tables la partie importante dont nous parlons.

Il nous a suffi, pour cela, de prendre pour argument, non plus le logarithme du rapport  $\frac{a}{b}$  du plus grand terme du binôme au plus petit, mais le logarithme du rapport inverse  $\frac{b}{a}$ , logarithme dont la caractéristique est nécessairement négative.

De cette manière,  $x$  désignant une fraction moindre que l'unité, nos nouvelles Tables donnent, pour  $x$  variant de 0 à 1, et, par suite, pour  $\log x$  variant de  $-\infty$  à 0, les valeurs correspondantes des fonctions

$$\log(1+x), \quad \log \frac{1}{1-x} (*).$$

Nous avons disposé parallèlement les logarithmes d'addition et les logarithmes de soustraction sur deux pages en regard, ce qui offre une plus grande commodité dans certains calculs, en rendant, en outre, impossible la confusion qui eût pu résulter de la similitude d'aspect des deux Tables.

En prolongeant la Table de soustraction au delà de la valeur  $\log \frac{1}{2}$  de l'argument, nous avons évité l'emploi de l'*entrée inverse*, qui était nécessaire dans la Table de notre précédent Recueil toutes les fois que le rapport  $\frac{b}{a}$  surpassait une demi-unité.

**EXEMPLE.** — Étant donnés

$$\log a = \bar{3},17192, \quad \log b = \bar{4},91712,$$

on en tire

$$\log \frac{b}{a} = \bar{1},74520 = \log x,$$

d'où (pages 10 et 11)

$$\log(a+b) = \log a + \log(1+x) = \bar{3},17192 + 0,19205 = \bar{3},36397,$$

$$\log(a-b) = \log a - \log \frac{1}{1-x} = \bar{3},17192 - 0,35277 = \bar{4},81915.$$



#### IV.

(Pages 12-13).

**Table donnant, pour chaque valeur de  $\log x$ , la valeur de  $\log \frac{1+x}{1-x}$ .**

4. Cette Table est formée par l'addition des nombres des deux Tables précédentes qui correspondent à une même valeur de  $\log x$ .

Si l'on pose

$$\frac{1+x}{1-x} = y,$$

---

(\*) Il est aisé de voir que, si l'on désigne par  $y$  l'un des nombres  $1+x$  ou  $\frac{1}{1-x}$ , l'*entrée inverse* des deux Tables donnera, pour chaque valeur de  $\log y$ , les valeurs correspondantes de  $\log(y-1)$  et de  $\log\left(1-\frac{1}{y}\right) = \log \frac{y-1}{y}$ .

$y$  étant  $> 1$ , la Table donnera, par l'entrée inverse, pour chaque valeur de  $\log y$ , la valeur correspondante de  $\log \frac{y-1}{y+1}$ .

Si l'on fait  $x = \cos \theta$ , la Table donnera, pour chaque valeur de  $\log \cos \theta$ , la valeur correspondante de  $\log \cot^2 \frac{\theta}{2}$ .

5. Cette Table sert à abrégé un grand nombre de calculs, par exemple le calcul des angles d'un triangle dont on connaît un angle avec les logarithmes des deux côtés qui le comprennent. Ainsi, dans le cas traité à la page xxv de l'*Introd.* aux *T.* à 5 *D.*, où l'on avait

$$\log \frac{c}{b} = \bar{1},69571 = \log x,$$

la Table donnera immédiatement (page 13), par une seule lecture,

$$\log \frac{b+c}{b-c} = \frac{1+x}{1-x} = 0,47187 + 131 \times 0,71 = 0,47280.$$

Par l'entrée inverse, en prenant

$$\log \frac{b}{c} = 0,30429 = \log y,$$

on aurait eu

$$\log \frac{b-c}{b+c} = \log \frac{y-1}{y+1} = \bar{1},527 + \frac{15}{76} = \bar{1},52720.$$

## V.

(Pages 14-15.)

### Table abrégée pour le calcul des logarithmes vulgaires à 15 décimales.

6. Cette Table, comme la Table analogue que nous avons insérée dans les *T.* à 5 *D.* (page 109), est extraite du *Supplément logarithmique* de Leonelli, et son usage repose également sur les principes que nous avons développés dans l'*Introd.* aux *T.* à 5 *D.*, pages xxix et suiv., et dans celle de l'édition française de la *Table d'interpolation* de Schrön, page 2. La seule différence consiste en ce que, au lieu d'opérer chiffre par chiffre, on opère par groupes de deux chiffres, en s'aidant d'une Table de multiplication (\*), telle que la *Table d'interpolation* de Schrön, qui donne au moins les produits de tous les nombres de deux chiffres les uns par les autres.

Si l'on veut calculer, par exemple, avec 15 décimales le logarithme de

$$e = 2,7182\ 8182\ 8459\ 0452\dots,$$

on divise d'abord  $e$  par 28, en s'aidant de la Table de multiplication, ce qui donne

(\*) Pour faire commodément usage de la Table de multiplication dans ces calculs, on opérera comme il suit. Soit à multiplier 9999 9753 9556 8737 par 1,0000024. Je sépare autant de chiffres sur la droite du multiplicande qu'il y a de décimales au multiplicateur (soit ici 7), et je multiplie 999997539,55... par 24, en négligeant les décimales, après avoir ajouté, pour plus d'exactitude, au produit de la partie entière les retenues provenant du produit par 24 des décimales supprimées, 0,55...  $\times 24 = 13$ . On opère comme dans la multiplication ordinaire, si ce n'est qu'on écrit deux chiffres à chaque multiplication partielle. Ainsi, en prenant les produits dans la colonne qui porte en tête 240 (*Table d'interpolation*, pages 42 et 43), on dira:  $39 \times 24 + 13 = 936 + 13 = 949$ , dont on retient les 9 centaines;  $75 \times 24 + 9 = 1809$ , dont on retient les 18 centaines, et ainsi de suite.

pour quotient 0,9708 1493 8735 3733.... On dispose ensuite le calcul comme il suit :

PRODUITS.	MULTIPLICATEURS.	LOG. DES MULTIPL.
2,7182 8182 8459 0452	$\frac{1}{72}$	5528 4196 8657 781
9708 1493 8735 3733	1,029	124 1537 4762 433
281 5363 3223 3258		4 3407 7479 319
9989 6857 1958 6991	1,001	1302 8639 028
9 9896 8571 9587		104 2305 506
9999 6754 0530 6578	1,00003	2 6057 668
2999 9026 2159		191 090
9999 9753 9556 8737	1,0000024	3 909
239 9994 0949		15
9999 9993 9550 9686	1,0760	5657 0551 8096 749
5 9999 9964		
9999 9999 9550 9650	1,0 <sup>8</sup> 4490350	

Complément = log. cherché 0,43429448 1903 251,

valeur exacte à moins d'une unité près du 15<sup>e</sup> ordre décimal.

Soit proposé maintenant de trouver le nombre correspondant au logarithme

$\bar{1},9176\ 4829\ 7002\ 426.$

Voici le tableau du calcul :

9176 4829 7002 426				
9138 1385 2383 717	82	(1)	(4)	$\bar{1},0000\ 0003\ 4958\ 739$ $130\ 0000\ 045 = (4) \times \text{abov}$
38 3444 4618 709				
34 6053 2109 506	1,008	(2)	(3)	$\bar{1},0000\ 0133\ 4958\ 784$ $8\ 6000\ 1148\ 065 = (3) \times \text{abov}$
3 7391 2509 203				
3 7333 2744 357	1,00086	(3)	(2)	$\bar{1},0008\ 6133\ 6106\ 849$ $80\ 0689\ 0688\ 855$
57 9764 846				
56 4582 459	1,0000 013	(4)	(1)	$\bar{1},0088\ 6822\ 6795\ 704$ $8272\ 7194\ 5972\ 475$
1 5182 387				
1,4706 012	1,0000 0003 4	(5)		Le nombre cherché est donc
416 375				$0,8272\ 7194\ 5972\ 475.$
412 580	1,0 <sup>9</sup> 95	(6)		
3 795				
3 778	1,0 <sup>11</sup> 87	(7)		
17				
17	1,0 <sup>13</sup> 39	(8)		

## VI.

(Pages 16 et 17.)

**Logarithmes naturels ou hyperboliques à 4 décimales.**

7. Pour trouver le logarithme naturel d'un nombre, on commence par transporter la virgule à la gauche du premier chiffre significatif; on calcule par interpolation le logarithme du nombre ainsi obtenu; puis on lui ajoute le logarithme de la puissance de 10 par laquelle il faudrait maintenant multiplier le nombre pour le ramener à sa valeur primitive.

Pour trouver le nombre correspondant à un logarithme donné, on ôte du logarithme donné le logarithme d'une puissance (positive ou négative) de 10, telle que le reste soit compris entre  $\log 1 = 0,0000$  et  $\log 10 = 2,3026$ . On calcule, au moyen de la Table, le nombre dont ce reste est le logarithme, puis on multiplie ce nombre par la puissance de 10 dont on avait soustrait le logarithme.

Ainsi, pour avoir le logarithme de 0,047159, on cherche celui de 4,7159, qui est 1,5509, et l'on ajoute à ce logarithme celui de  $10^{-2}$ , ou  $\bar{5},3948$ , ce qui donne  $\bar{4},9457 = -3,0543$ .

Pour avoir la valeur de  $\frac{1}{e}$ , dont le logarithme naturel est  $-1$  ou  $\bar{1},0000$ , j'ajoute à ce logarithme  $\log 10 = 2,3026$ , ce qui donne 1,3026, correspondant au nombre 3,679. Donc  $\frac{1}{e} = 0,3679$ .

## VII.

(Page 18.)

**Table abrégée pour le calcul des logarithmes naturels ou hyperboliques à 20 décimales.**

8. L'emploi de cette Table est identique à celui de la Table analogue relative aux logarithmes vulgaires dans les *T. à 5 D.*, en tenant compte seulement de ce que l'on vient de dire au sujet de la Table VI. *Voyez* aussi l'*Introduction* à la *Table d'interpolation* de Schrön, pages 2 et 3.

## VIII.

(Page 19.)

**Table de conversion des logarithmes naturels en logarithmes vulgaires et des parties décimales du rayon en parties décimales du quadrant, et réciproquement, ou Tables des multiples de  $M, \frac{1}{M}, \frac{2}{\pi}, \frac{\pi}{2}$ .**

9. L'usage de ces Tables n'a besoin d'aucune explication.

## IX.

(Pages 20-22.)

**Valeurs naturelles à 4 décimales des fonctions circulaires de 15 en 15 minutes de degré, ou de minute en minute de temps, avec l'évaluation des arcs en parties de rayon.**

10. Cette Table est une extension de celle que nous avons donnée à la page 86 des *T. à 5 D.*, et peut servir aux mêmes usages. Pour la conversion du temps en arc ou de l'arc en temps, on s'aidera de la Table auxiliaire suivante :

Table auxiliaire pour la conversion des parties de la circonférence en parties du jour, et réciproquement.

0'	0	5'	20	10'	40	0	0.0	5	1.15	10	2.30
1	4	6	24	11	44	1	0.15	6	1.30	20	5.0
2	8	7	28	12	48	2	0.30	7	1.45	30	7.30
3	12	8	32	13	52	3	0.45	8	2.0	40	10.0
4	16	9	36	14	56	4	1.0	9	2.15	50	12.30

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35
1	1,5	1,65	1,8	1,95	2,1	2,25	2,4	2,55	2,7	2,85
2	3,0	3,15	3,3	3,45	3,6	3,75	3,9	4,05	4,2	4,35
3	4,5	4,65	4,8	4,95	5,1	5,25	5,4	5,55	5,7	5,85
4	6,0	6,15	6,3	6,45	6,6	6,75	6,9	7,05	7,2	7,35
5	7,5	7,65	7,8	7,95	8,1	8,25	8,4	8,55	8,7	8,85
6	9,0	9,15	9,3	9,45	9,6	9,75	9,9	10,05	10,2	10,35
7	10,5	10,65	10,8	10,95	11,1	11,25	11,4	11,55	11,7	11,85
8	12,0	12,15	12,3	12,45	12,6	12,75	12,9	13,05	13,2	13,35
9	13,5	13,65	13,8	13,95	14,1	14,25	14,4	14,55	14,7	14,85

X.

(Pages 23-25.)

Logarithmes à 4 décimales des fonctions circulaires de minute en minute pour les 100 premières minutes, et de 10 en 10 minutes pour le reste du quadrant.

11. Cette Table est particulièrement appropriée aux calculs dans lesquels on divise la minute en parties décimales. Sa disposition est la même que celle des Tables de Lalande ou de nos *T.* à 5 *D.*

12. REMARQUE. — Pour trouver le logarithme du sinus ou de la tangente d'un très-petit arc, on commencera par multiplier cet arc par une puissance de 10, telle que le produit soit compris entre 10' et 100' = 1° 40'. On cherchera alors, par interpolation, le logarithme du sinus ou de la tangente de ce nouvel arc, et l'on diminuera ensuite la caractéristique d'un nombre d'unités correspondant à la puissance de 10 par laquelle on a multiplié.

Ainsi, pour avoir log sin 1',432, on cherchera

$$\log \sin 14',32 = \bar{3},6099 + 299 \times 0,32 = \bar{3},6195,$$

et l'on en conclura

$$\log \sin 1',432 = \bar{4},6195.$$

Autrement, on prendra le logarithme du nombre de minutes, et l'on y ajoutera le logarithme d'une minute en parties du rayon, en se servant de la Table I. Ainsi

$$\begin{array}{r} \log 1,432 \dots \dots \dots \quad 0,1559 \\ \log 1' \dots \dots \dots \quad \bar{4}.4637 \\ \hline \log \sin \text{ ou tang } 1',432 \dots \dots \bar{4},6196 \end{array}$$

On voit aisément comment on résoudra le problème inverse, de déterminer un arc très-petit, connaissant son log sin ou son log tang.

---

## XI.

(Pages 26-29.)

**Logarithmes à 4 décimales des fonctions circulaires de 6 en 6 minutes, ou de dixième en dixième de degré.**

13. L'objet principal de cette Table est de faciliter les calculs rapides, dans lesquels on divise le degré lui-même en parties décimales, quoiqu'elle se prête aussi aux calculs où l'on conserve la division du degré en minutes. Dans ce dernier cas, les calculs d'interpolation sont tout pareils à ceux des Tables ordinaires, de minute en minute, lorsqu'on y divise la minute en secondes.

Pour les fonctions des petits arcs, voir la remarque du numéro précédent.

14. Nous avons ajouté, au bas des pages 26 et 27, des Tables de conversion des parties sexagésimales du degré en parties décimales, et réciproquement. Dans ces Tables, les chiffres renfermés entre parenthèses sont les périodes des fractions décimales. Ainsi, on trouve

$$47'' = 0^{\circ},0130(5) = 0^{\circ},013055555\dots$$

15. Au bas des pages 28 et 29 nous avons placé deux petites Tables donnant les logarithmes à 3 décimales des sinus et des tangentes de degré en degré, et destinées soit à l'ébauche, soit à la révision rapide des calculs.

---

## XII.

(Page 30.)

**Valeurs naturelles à 3 décimales des fonctions circulaires pour chaque centième du quadrant, donnant la conversion des parties décimales du quadrant en parties sexagésimales de la circonférence et en parties décimales du quadrant.**

16. L'usage et la disposition de cette Table sont entièrement analogues à ceux de la page 86 des *T. à 5 D.* (Voyez *Introduction*, pages xx et xxi.)

La Table auxiliaire du bas de la page donne par addition la conversion des parties décimales du quadrant en parties sexagésimales, et par soustraction la conversion réciproque.

---

## XIII.

(Pages 31-35.)

**Logarithmes des fonctions circulaires : 1° à 3 décimales pour chaque centième du quadrant; 2° à 4 décimales pour chaque dix-millième du quadrant jusqu'à 0°,0300, et pour chaque millième dans toute l'étendue du quadrant.**

17. Cette Table est disposée comme la Table XI, et son usage est analogue, en tenant toujours compte, pour les petits arcs, de la remarque du n° 12.

De 0°,0000 à 0°,0300, la Table de la page 31 donne log tang  $x$  au moyen de la formule

$$\log \operatorname{tang} x = \log \sin x + \log \sec x.$$


---

XIV.

(Pages 36-55.)

Valeurs naturelles et logarithmiques, à 4 décimales, des fonctions circulaires et hyperboliques, correspondantes à toutes les valeurs de l'arc ou de l'amplitude hyperbolique, de millième en millième du quadrant.

18. La partie de cette Table relative aux fonctions circulaires est disposée à simple entrée, comme la partie trigonométrique des *T.* à 5 *D.*

19. Avant d'expliquer l'usage des colonnes auxiliaires qui donnent les *fonctions hyperboliques*, rappelons en quelques mots l'origine géométrique de ces fonctions. L'hyperbole équilatère, de demi-axe = 1, peut être représentée par l'ensemble des deux équations

$$x = \sec \varphi, \quad y = \tan \varphi,$$

$\varphi$  étant l'angle  $NOx$ , que fait avec l'axe des  $x$  l'hypoténuse d'un triangle rectangle qui a pour côtés  $OA = 1$ ,  $NO = x$ ,  $AN = y$ .

D'autre part, le double de l'aire du secteur hyperbolique  $OAM$  étant désigné par  $u$ , les coordonnées  $x$  et  $y$  auront pour expressions

$$x = \frac{e^u + e^{-u}}{2}, \quad y = \frac{e^u - e^{-u}}{2}.$$

Par analogie avec les expressions des coordonnées du cercle de rayon 1, en fonctions de l'arc ou du double secteur circulaire  $t$ ,

$$x = \cos t = \frac{e^{t\sqrt{-1}} + e^{-t\sqrt{-1}}}{2}, \quad y = \sin t = \frac{e^{t\sqrt{-1}} - e^{-t\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}.$$

on désigne les coordonnées de l'hyperbole, considérées comme fonctions du double secteur hyperbolique  $u$ , sous les noms de *cosinus hyperbolique* et de *sinus hyperbolique*. Nous représenterons ces quantités par les notations

$$\text{Ch } u = \frac{e^u + e^{-u}}{2}, \quad \text{Sh } u = \frac{e^u - e^{-u}}{2}.$$

Le rapport  $\frac{\text{Sh } u}{\text{Ch } u}$  s'appelle la *tangente hyperbolique*,

$$\text{Th } u = \frac{e^u - e^{-u}}{e^u + e^{-u}}.$$

Les fonctions circulaires et les fonctions hyperboliques forment les deux cas extrêmes des fonctions elliptiques  $\cos am u$ ,  $\sin am u$ ,  $\tan am u$ , correspondants aux valeurs 0 et 1 du module. L'angle  $\varphi$  des formules précédentes étant ce que devient l'*amplitude* des fonctions elliptiques lorsque le module devient égal à l'unité, nous proposons de donner à cet angle le nom d'*amplitude hyperbolique* de l'*argument*  $u$ , et nous le désignerons par la notation  $\text{Amh } u$ .

L'amplitude  $\varphi$  est liée à l'argument  $u$  par les relations

$$\text{Sh } u = \tan \varphi, \quad \text{Ch } u = \sec \varphi, \quad \text{Th } u = \sin \varphi, \quad du = \frac{d\varphi}{\cos \varphi}.$$

Voyez le *Recueil de formules relatives aux fonctions hyperboliques*, page xxx.

20. D'après cela, chaque fonction circulaire de l'arc  $\varphi$  est en même temps une certaine fonction hyperbolique de l'argument  $u$ . Cette correspondance est indiquée par un double *en-tête*, placé en haut comme en bas de chaque colonne.

L'interpolation se fait comme pour les fonctions trigonométriques, en tenant compte de ce que l'argument ne varie pas par intervalles constants.



**EXEMPLES.** — 1°. Pour  $u = 0,3284$ , on a (pages 44 et 45)

$$\text{Sh } u = \text{Sh } (0,3277 + 7) = 0,3336 + 18 \times \frac{7}{17} = 0,3343,$$

$$\log \text{Th } u = \log \text{Th } (0,3277 + 7) = \bar{1},5003 + 21 \times \frac{7}{17} = \bar{1},5012.$$

2° Pour  $Mu = 0,08605$ , on a (pages 40 et 41)

$$\text{Ch } u = \text{Ch } \frac{0,08583 + 22}{M} = 1,0196 + 3 \times \frac{22}{69} = 1,0197,$$

$$\log \text{Sh } u = \bar{1},2987 + 35 \times \frac{22}{69} = \bar{1},2998.$$

3° Pour  $\text{Th } u = 0,2613$ , on a (pages 42 et 43)

$$u = \text{Arg Th } (0,2608 + 5) = 0,2670 + 16 \times \frac{5}{16} = 0,2675,$$

$$Mu = 0,11596 + 71 \times \frac{5}{16} = 0,11619.$$

21. Pour les petites valeurs de l'arc  $\text{Am } u$  ou de l'argument hyperbolique  $u$ , on obtiendra les logarithmes des sinus et des tangentes hyperboliques en se servant de la remarque faite au sujet de la Table X (n° 12).

$$\text{Ainsi, on prendra } \text{Sh } (0,000307) = \frac{1}{100} \text{Sh } (0,0307),$$

$$\log \text{Sh } (0,0307) = \bar{2},4875, \text{ d'où } \log \text{Sh } (0,000307) = 4,4875.$$

Autrement, on prend approximativement

$$\text{Sh } u = \text{Th } u = u.$$

22. Pour de grandes valeurs de  $u$ , au contraire, on a sensiblement

$$\text{Sh } u = \text{Ch } u = \frac{1}{2} e^u, \quad \text{Th } u = 1,$$

d'où l'on conclut

$$\log \text{vulg } \text{Sh } u = \log \text{vulg } \text{Ch } u = Mu - \log \text{vulg } 2.$$

Ainsi, pour  $Mu = 2,7172$ ,

$$\log \text{Sh } u = \log \text{Ch } u = 2,7172 - 0,3010 = 2,4162.$$

Si  $u$  n'est pas assez grand pour que cette égalité soit suffisamment approchée, la différence entre  $\log \text{Sh } u$  et  $Mu - \log 2$  sera très-petite, et variera très-peu dans l'intervalle de deux termes consécutifs de la Table. Étant donné, par exemple,  $\log \text{Ch } u = 1,2811$ , on voit que, pour le nombre tabulaire voisin  $\log \text{Ch } u = 1,2726$ , la différence en question est

$$1,2726 - 1,2723 = 3.$$

Donc, pour  $\log \text{Ch } u = 1,2811$ , on a

$$Mu = 1,2811 + \log 2 - 3 = 1,5918.$$

De même, on a, dans le voisinage de cette valeur,  $\log \text{Ch } u - \log \text{Sh } u = 6$ . Donc, pour cette valeur même,

$$\log \text{Sh } u = \log \text{Ch } u - 6 = 1,2805.$$

On aurait  $u$  en multipliant  $Mu$  par  $\frac{1}{M}$ , au moyen de la Table de conversion VIII.

23. Nous allons maintenant indiquer quelques exemples de l'application des fonctions hyperboliques.

I. Pour calculer la surface d'un sphéroïde aplati, engendré par la révolution de l'ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

autour de son petit axe  $2b$ , et dont l'excentricité est  $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ , on posera

$$\text{Sh } u = \frac{ae}{b^2} y,$$

et l'on aura la formule

$$\text{surface} = \frac{\pi b^2}{e} \left( u + \frac{1}{2} \text{Sh } 2u \right),$$

cette surface étant comprise entre l'équateur et un parallèle donné. Si l'on veut la surface totale du sphéroïde, on n'aura qu'à faire  $y = b$ , d'où

$$\text{Sh } u = \frac{ae}{b} = \frac{e}{\sqrt{1 - e^2}},$$

et à doubler le résultat.

S'il s'agit, par exemple, du sphéroïde terrestre, dont l'aplatissement

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - e^2} = \frac{1}{299,15},$$

on prendra alors

$$\text{Sh } u = \frac{\sqrt{\alpha(2 - \alpha)}}{1 - \alpha} = \frac{\sqrt{2\alpha(1 - \frac{1}{2}\alpha)}}{1 - \alpha},$$

valeur que l'on calculera aisément au moyen des logarithmes de soustraction

$\alpha \dots\dots\dots \bar{3},52411$	$u = 0,0819$
$2\alpha \dots\dots\dots \bar{3},82514$	$\frac{1}{2} \text{Sh } 2u = 0,0822$
$\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^{-1} \dots\dots\dots 0,00073$	<hr style="width: 100%;"/>
<hr style="width: 100%;"/>	$\text{somme} = 0,1641$
$2\alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \dots\dots\dots \bar{3},82441$	<hr style="width: 100%;"/>
$c = \sqrt{\alpha(2 - \alpha)} \dots\dots\dots \bar{2},91221$	$\log \dots\dots\dots \bar{1},2151$
<hr style="width: 100%;"/>	$\frac{1}{2c} \dots\dots\dots 0,7868$
$\frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} = \frac{1}{1 - \alpha} \dots\dots\dots 0,00145$	<hr style="width: 100%;"/>
<hr style="width: 100%;"/>	$0,0019$
$\text{Sh } u \dots\dots\dots \bar{2},91366$	<hr style="width: 100%;"/>
	$\text{nombre} = 1,0044$

Donc la surface totale du sphéroïde est à la surface  $4\pi b^2$  de la sphère ayant pour diamètre l'axe polaire, dans le rapport de  $1,0044$  à l'unité.

II. En supposant la résistance du milieu proportionnelle au carré de la vitesse, les temps de l'ascension et de la chute d'un mobile pesant, lancé verticalement, sont donnés par les formules

$$t_1 = \frac{k}{g} \text{arc tang } \frac{a}{k}, \quad t_2 = \frac{k}{g} \text{Arg Sh } \frac{a}{k},$$

$a$  étant la vitesse initiale,  $k$  un coefficient constant. Soient, par exemple,

$$a = 340 \text{ mètres}, \quad \log \frac{k}{g} = 1,0792, \quad \text{d'où} \quad \log \frac{a}{k} = 0,4607.$$

Voici le calcul des deux formules ( pages 45 et 44 ) :

$\log \frac{a}{k} = 0,4607$	$\text{arc tang } \frac{a}{k} \text{ (en quadr.)} = \bar{1},8964$	
$\text{arc tang } \frac{a}{k} = 0^a,7878$	$\frac{\pi}{2} \dots \dots \dots = 0,1961$	$\text{Arg Sh } \frac{a}{k} \dots \dots = 0,2511$
$\text{Arg Sh } \frac{a}{k} = 1,7825$	$\frac{k}{g} \dots \dots \dots = 1,0792$	$\frac{k}{g} \dots \dots \dots = 1,0792$
	$t_1 \dots \dots \dots = 1,1717$	$t_2 \dots \dots \dots = 1,3303$

Donc  $t_1 = 14^s, 85$ .  $t_2 = 21^s, 39$ .

III. Pour déterminer les éléments d'une chaînette, étant donnée la corde horizontale  $ab$  d'un arc et la flèche  $h$  de cet arc, on a l'équation (\*)

$$\frac{b}{h} = \frac{u}{\text{Ch } u - 1},$$

$u$  étant l'argument dont l'amplitude hyperbolique est égale à l'angle  $\varphi$ , que fait avec l'horizon la tangente à l'une des extrémités de l'arc.

Prenons les données de l'exemple traité par Gudermann,

$$b = 100, \quad h = 79,$$

d'où

$$\frac{b}{h} = 1,26\dots, \quad \log \frac{b}{h} = 0,10237.$$

Après quelques essais, qui se font très-rapidement en s'aidant de la règle à calcul, on trouve que  $u$  est compris entre

$$u_1 = 1,3434 \quad \text{et} \quad u_2 = 1,3760.$$

Or

$$\log \frac{u_1}{\text{Ch } u_1 - 1} = 0,10843, \quad \log \frac{u_2}{\text{Ch } u_2 - 1} = 0,09490,$$

$$\text{Différence} = + 606, \quad \text{Différence} = - 747.$$

Donc

$$u = 1,3434 + \frac{606}{606 + 747} \times 326 = 1,3580,$$

d'où

$$\varphi = \text{Amh } u = 0^a,6795 = 61^u 9' 18'',$$

valeur exacte à 2 ou 3 secondes près.

IV. L'anomalie vraie  $\nu$  d'une comète, dans le mouvement parabolique, est donnée par l'équation (\*\*)

$$\text{tang}^3 \frac{\nu}{2} + 3 \text{tang} \frac{\nu}{2} = \frac{3kt}{\sqrt{2}q^3},$$

où l'on a

$$\log \frac{3k}{\sqrt{2}} = \bar{2},5621877.$$

Soient donnés, par exemple,

$$\log q = \bar{1},76565, \quad t = 49^s, 2528, \quad \text{d'où} \quad \log \frac{3kt}{\sqrt{2}q^3} = 0,6061.$$

(\*) GUDERMANN, *Theorie der Potenzial-Functioren*, §§ 79 et suiv.

(\*\*) GAUSS, *Theoria motus corporum caelestium*, art. 20.

Les formules (I) pour la résolution de l'équation du troisième degré (page xxxii) donnent, en prenant  $\frac{p}{3} = 1$ ,  $\frac{q}{2} = - (0,3051)$ ,

$$\log \operatorname{Sh} u = 0,3051, \quad \text{d'où} \quad Mu = 0,6306, \quad \frac{1}{3} Mu = 0,2102,$$

$$\log \operatorname{Sh} \frac{1}{3} u = \bar{1},7017, \quad \log \operatorname{tang} \frac{\nu}{2} = \log \left( 2 \operatorname{Sh} \frac{u}{3} \right) = 0,0027,$$

$$\frac{\nu}{2} = 45^{\circ} 10', 8, \quad \nu = 90^{\circ} 21', 6,$$

valeur exacte à moins de  $\frac{1}{10}$  de minute près.

V. Le mouvement hyperbolique d'un astre dépend des formules (\*)

$$e \frac{u - u^{-1}}{2} - \log \operatorname{nat} u = \frac{kt}{b^{\frac{3}{2}}},$$

$$r \cos \nu = b \left( e - \frac{u + u^{-1}}{2} \right),$$

$$r \sin \nu = b \sqrt{e^2 - 1} \cdot \frac{u - u^{-1}}{2}.$$

En faisant d'abord  $e = \operatorname{Ch} \epsilon$ , on en conclut, à l'aide de nos Tables,  $\sqrt{e^2 - 1} = \operatorname{Sh} \epsilon$ .  
Posons maintenant

$$\log \operatorname{nat} u = z.$$

Les formules deviendront

$$(1) \quad e \operatorname{Sh} z - z = \frac{kt}{b^{\frac{3}{2}}},$$

$$(2) \quad \begin{cases} r \cos \nu = b(e - \operatorname{Ch} z), \\ r \sin \nu = b \sqrt{e^2 - 1} \cdot \operatorname{Sh} z \end{cases}$$

Si la valeur de  $z$  ne doit pas être trop considérable, il sera commode, pour faire les premiers essais qui conduisent à la résolution de l'équation (1), de mettre cette équation sous la forme

$$(3) \quad (e - 1) \operatorname{Sh} z + (\operatorname{Sh} z - z) = 0.$$

Dans l'exemple traité par Gauss (*Theoria motus*, art. 26), on a

$$\log \frac{kt}{b^{\frac{3}{2}}} = \bar{1},14815, \quad \log e = 0,10102,$$

d'où

$$\frac{kt}{b^{\frac{3}{2}}} = 0,1406, \quad e - 1 = 0,2619.$$

En négligeant d'abord  $\operatorname{Sh} z - z$ , on voit que la valeur de  $z$  doit se trouver vers la seconde moitié de la page 46. On trouve ensuite, par un très-petit nombre d'essais, que  $z$  est compris entre les arguments

$$0,4547 \quad \text{et} \quad 0,4634,$$

auxquels correspondent les valeurs de  $e \operatorname{Sh} z - z$ ,

$$0,1391, \quad \text{et} \quad 0,1425.$$

---

(\*) *Theoria motus*, etc., art. 21 et 22.

La règle de fausse position donne alors, en opérant comme dans l'exemple III,

$$z = 0,4585.$$

On achève enfin le calcul comme il suit :

$e = 1,2619$	$b. \dots\dots 0,6021$	$b. \dots\dots 0,6021$
$\text{Ch } z = 1,1070$	$e - \text{Ch } z. \quad \bar{1},1901$	$\sqrt{e^2 - 1} \dots \bar{1},8883$
$e - \text{Ch } z = 0,1549$	<hr style="width: 100%;"/>	$\text{Sh } z. \dots\dots \bar{1},6765$
	$r \cos \nu \dots \bar{1},7922$	$r \sin \nu \dots 0,1649$

d'où

$$\log \text{ tang } \nu = 0,3727, \quad \nu = 67^\circ 2' 40'', \quad \log r = 0,2008.$$

On pourrait pousser l'approximation plus loin, en se servant des Tables de Gudermann.

—•••—  
XV.

(Page 56.)

**Valeurs naturelles des fonctions circulaires, à 10 décimales, de centième en centième du quadrant.**

24. L'usage de cette Table ne diffère en rien de celui de la Table analogue qui termine les *T. à 5 D.* (Voyez INTRODUCTION, pages xxxii et suiv.)

—•••—  
XVI.

(Pages 57-59.)

**Tables de fonctions elliptiques.**

25. La première de ces Tables (page 57) fait connaître les fonctions du module pour toutes les valeurs de l'angle du module

$$\theta = \text{arc sin } k,$$

de centième en centième du quadrant. Les formules du bas de la page indiquent comment, au moyen des colonnes auxiliaires  $\alpha$  et  $\beta$ , on peut suppléer à l'interpolation directe, dans les cas où elle devient trop pénible.

EXEMPLES. — I. Pour  $\theta = 0^\circ, 2573$ , calculer  $\log q$  et  $\log q'$ .

On trouve, soit au moyen de la Table actuelle, soit à l'aide des Tables plus étendues XIII ou XIV,

$$\log k = \log \sin \theta = \bar{1},5945, \quad \text{d'où} \quad \log \frac{k^2}{16} = \bar{3},9850.$$

On a ensuite

$$\alpha = 339 + 28 \times 0,73 = 359.$$

Donc

$$\log q = \bar{3},9850 + \alpha = \bar{2},0209.$$

On a maintenant

$$\log \frac{1}{q} = 1,9791, \quad \log \log \frac{1}{q} = 0,29647,$$

d'où

$$\log \log \frac{1}{q'} = \log M^2 \pi^2 - \log \log \frac{1}{q} = \bar{1},97340,$$

$$\log \frac{1}{q'} = 0,9406, \quad \log q' = \bar{1},0594.$$

II. Pour  $v = 0^{\circ},9542$ , calculer  $\log K$ .

On cherchera  $\log K'$  pour l'angle complémentaire  $\theta = 0^{\circ},0458$ , pour lequel

$$\log \frac{4}{K'} = \log (4 \operatorname{cosec} \theta) = 1,7454.$$

On aura alors

$$\log \log \frac{4}{K'} = 0,2419$$

$$\log \frac{1}{M} = 0,3622$$

$$\beta = 0,0004$$

d'où

$$\log K = 0,6045$$

26. La seconde Table (page 58) fait connaître, pour les diverses valeurs de l'amplitude et de l'angle du module, les valeurs, tant naturelles que logarithmiques, des intégrales elliptiques de première et de seconde espèce.

Pour les petites valeurs de l'amplitude et du module, l'interpolation est plus facile en se servant des valeurs naturelles. C'est le contraire qui a lieu pour les grandes valeurs de ces deux arguments, surtout lorsqu'il s'agit des intégrales de première espèce. Aussi avons-nous, pour ces dernières, donné à la Table de leurs valeurs logarithmiques une plus grande extension, en la calculant pour chaque centième du quadrant à partir de la valeur  $0^{\circ},90$  des deux arguments  $\varphi$  et  $\theta$ .

Nos Tables étant à deux arguments, et les intervalles étant trop considérables pour qu'on puisse négliger les différences secondes, on fera les calculs d'interpolation comme il suit.

Soit  $u_{\varphi\theta}$  la valeur cherchée, correspondante aux arguments

$$\varphi = \varphi_0 + h, \quad \theta = \theta_0 + k.$$

Prenons dans la Table les valeurs

$$u_{\varphi_0\theta_0}, \quad u_{\varphi_0\theta_1}, \quad u_{\varphi_0\theta_2},$$

$$u_{\varphi_1\theta_0}, \quad u_{\varphi_1\theta_1},$$

$$u_{\varphi_2\theta_0}.$$

Désignons par  $\Delta'_{\varphi}$ ,  $\Delta''_{\varphi\varphi}$  les différences première et seconde, relatives à la variation de  $\varphi$  dans la première ligne verticale; par  $\Delta'_\theta$ ,  $\Delta''_{\theta\theta}$  les différences première et seconde, relatives à la variation de  $\theta$  dans la première ligne horizontale, et enfin par

$$\Delta''_{\varphi\theta} = \Delta_{\varphi} u_{\varphi_0\theta_1} - \Delta_{\varphi} u_{\varphi_0\theta_0} = \Delta_{\theta} u_{\varphi_1\theta_0} - \Delta_{\theta} u_{\varphi_0\theta_0} = u_{\varphi_1\theta_1} - u_{\varphi_1\theta_0} - u_{\varphi_0\theta_1} + u_{\varphi_0\theta_0}.$$

la différence seconde relative à la variation simultanée des deux arguments. La valeur de  $u_{\varphi\theta}$  sera

$$u_{\varphi\theta} = u_{\varphi_0\theta_0} + h \left( \Delta'_{\varphi} - \frac{1-h}{2} \Delta''_{\varphi\varphi} + k \Delta''_{\varphi\theta} \right) + k \left( \Delta'_\theta - \frac{1-k}{2} \Delta''_{\theta\theta} \right).$$

Pour résoudre le problème inverse de trouver l'un des arguments, connaissant l'autre et la valeur correspondante de la fonction, on se servira de la formule ci-dessus, que l'on résoudra par approximations successives.

EXEMPLES. — I. Calculer  $F(\varphi)$  pour  $\varphi = 0^{\circ},74444$ ,  $\theta = 0^{\circ},67778$ .

En prenant  $\varphi_0 = 0^{\circ},7$ ,  $\theta_0 = 0^{\circ},6$ , on formera le Tableau suivant des valeurs et

de leurs différences :

	1,2575	1,3118	1,3664	$\Delta'_\varphi$ ..... 2364	$u_{\varphi, \theta_0}$ ..... 1,2575
	1,4939	1,5886		$-\frac{1}{2}(1-h)\Delta''_{\varphi\varphi} - 49$	$\Delta'_\varphi$ corr. $\times h$ ..... 1168
	1,7481			$k\Delta''_{\varphi\theta}$ ..... 314	$\Delta'_\theta$ corr. $\times k$ ..... 422
Diff. 1 <sup>re</sup>	2364	543	546	$\Delta'_\varphi$ corrigé... 2629	$u_{\varphi\theta}$ ..... 1,4165
	2542	947		$\Delta'_\theta$ ..... 543	Les Tables de Legendre donnent $u_{\varphi\theta} = 1,4140.$
Diff. 2 <sup>me</sup>	$\Delta''_{\varphi\varphi} = 178$	$\Delta''_{\varphi\theta} = 404$	$\Delta''_{\theta\theta} = 3$	$-\frac{1}{2}(1-k)\Delta''_{\theta\theta} - 0$	
	$h = 0,4444$	$k = 0,7778$		$\Delta'_\theta$ corrigé... 543	

En calculant de même log F ( $\varphi$ ), on trouverait pour valeur 0,1509, au lieu de 0,1504, que l'on conclurait des Tables de Legendre.

II. Étant donnés  $\theta = 0^a,56209$ ,  $\log E(\varphi) = \bar{1},8065$ , trouver  $\varphi$ .  
Ici  $\varphi_0 = 0^a,4$ ,  $\theta_0 = 0^a,5$ ,  $k = 0,6209$  : il s'agit de trouver  $h$ .

Valeurs: $\bar{1},7844$	7799	7757	$\Delta'_\varphi$ ..... 896	$u_{\varphi\theta}$ ..... $\bar{1},8065$	
8740	8669		$k\Delta''_{\varphi\theta}$ ..... - 16	$-u_{\varphi, \theta_0}$ ..... $-\bar{1},7844$	
9448			$\delta_\varphi$ ..... 880	$-\Delta'_\theta$ corr. $\times k + 29$	
Diff. 1 <sup>re</sup>	896	- 45	- 42	$\Delta'_\theta$ ..... - 45	Reste = R..... 250
	798	- 71		$-\frac{1-k}{2}\Delta''_{\theta\theta}$ ..... 1	
Diff. 2 <sup>me</sup>	-188	- 26	+ 3	$\Delta'_\theta$ corr... - 46	$\frac{R}{\delta_\varphi} = 0,2841\dots$

L'inconnue  $h$  sera déterminée par l'équation

$$h = \frac{R}{\delta_\varphi} + \frac{h(1-h)}{2} \frac{\Delta''_{\varphi\varphi}}{\delta_\varphi},$$

qui donne pour première approximation  $h = \frac{R}{\delta_\varphi} = 0,2841$ , d'où

$$\frac{h(1-h)}{2} \cdot \frac{\Delta''_{\varphi\varphi}}{\delta_\varphi} = -0,28 \times 0,36 \times \frac{188}{880} = -0,101 \times 0,214 = -0,0216;$$

et par suite

$$h = 0,2841 - 0,0216 = 0,2625.$$

Une nouvelle approximation donnerait  $h = 0,2638$ , d'où

$$\varphi = 0^a,42638.$$

Les Tables de Legendre donneraient  $\varphi = 0^a,42571$ .

27. On interpolerait de la même manière les Tables de la page 59, quoique ces Tables aient en général plutôt pour but de montrer la marche de ces fonctions que de servir à leur calcul numérique. Ce calcul se fait d'ailleurs très-simplement à l'aide des séries très-convergentes qui représentent ces fonctions.

XVII.

(Pages 60-61.)

Tables de diverses transcendentes.

28. I. Table des intégrales eulériennes de seconde espèce.

Cette Table contient d'abord les valeurs logarithmiques à 5 décimales de la fonction

$$\Gamma(1+x) = \int_0^\infty e^{-\alpha} \alpha^x d\alpha,$$

pour les valeurs de  $x$  depuis 0,00 jusqu'à 1,00, ou, ce qui revient au même, les valeurs logarithmiques de la fonction

$$\Gamma(y) = \int_0^\infty e^{-\alpha} \alpha^{y-1} d\alpha,$$

pour  $y$  compris entre 1 et 2.

Au moyen de la formule

$$(1) \quad \Gamma(1+x) = x(x-1)\dots(x-n)\Gamma(1+x-n),$$

$n$  étant le plus grand entier contenu dans  $x$ , lorsque  $x$  est  $> 1$ , et au moyen de la formule

$$(2) \quad \Gamma(x) = \frac{1}{x} \Gamma(1+x),$$

lorsque  $x$  est compris entre 0 et l'unité, on pourra toujours ramener le calcul d'une valeur quelconque de la fonction  $\Gamma(x)$  au cas où son argument est compris entre les limites de la Table.

Ainsi, on a

$$\Gamma(4,82719) = 3,82719 \times 2,82719 \times 1,82719 \times \Gamma(1,82719),$$

$$3,82719 \dots \quad 0,58288$$

$$2,82719 \dots \quad 0,45136$$

$$1,82719 \dots \quad 0,26179$$

$$\Gamma(1,82719) \dots \quad 1,97261$$

$$\text{d'où} \quad \Gamma(4,82719) \dots \quad 1,26864$$

De même,

$$\Gamma(0,1) = \frac{1}{0,1} \Gamma(1,1) = (0,97834).$$

Pour

$$0 < x < 1,$$

$$(3) \quad \Gamma(1+x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi x}{\sin \pi x}, \quad \Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}.$$

En particulier,  $n$  étant entier, on a

$$(4) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} = (0,24857), \quad \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2^n} \sqrt{\pi}.$$

29. Lorsque  $x$  est entier,  $\Gamma(1+x)$  se change dans la factorielle

$$x! = 1.2.3\dots x.$$

Nous donnons les logarithmes à 8 décimales des valeurs de cette factorielle jusqu'à  $x = 100$ .



On peut, à l'aide de ces valeurs, calculer très-simplement diverses expressions qui se rencontrent dans le calcul des séries, telles que

$$1.3.5 \dots (2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n \times n!} = \frac{\Gamma(2n-1)}{2^n \Gamma(n-1)},$$

$$\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots 2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} = \frac{\Gamma(2n-1)}{2^{2n} [\Gamma(n-1)]^2},$$

etc.

C'est ainsi qu'on a formé le tableau suivant :

Logarithmes des coefficients  $\left[\frac{1}{2}\right]_n = \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots 2n}$  du développement de  $(1-x)^{-\frac{1}{2}}$ .

n	log $\left[\frac{1}{2}\right]_n$	n	log $\left[\frac{1}{2}\right]_n$	n	log $\left[\frac{1}{2}\right]_n$	n	log $\left[\frac{1}{2}\right]_n$	n	log $\left[\frac{1}{2}\right]_n$
1	1,6989 7000	6	1,3533 1202	11	1,2257 9525	16	1,1459 7270	21	1,0877 3057
2	1,5740 3127	7	1,3211 2734	12	1,2073 1185	17	1,1330 0772	22	1,0777 4635
3	1,4948 5002	8	1,2930 9862	13	1,1902 7851	18	1,1207 7326	23	1,0682 0104
4	1,4368 5807	9	1,2682 7503	14	1,1744 8424	19	1,1091 9139	24	1,0590 5766
5	1,3911 0058	10	1,2459 9864	15	1,1597 6098	20	1,0981 9601	25	1,0502 8373

Nous donnons à la suite de ces Tables les valeurs des coefficients des développements en séries de  $\log \Gamma(1+x)$ , et les logarithmes des 31 premiers nombres de Bernoulli, d'après les valeurs de ces nombres calculées par Ohm (*Journal de Crelle*, tome XX, page 11).

30. II. Table des valeurs du logarithme intégral

$$\text{li } x = \int_0^x \frac{dx}{\log x},$$

ou

$$\text{li } e^y = \int_{-\infty}^y \frac{e^y}{y} dy.$$

Nous avons extrait cette Table d'un Mémoire de Bretschneider, publié dans le *Zeitschrift für Mathematik und Physik*, tome VI, pages 127 et suiv.

L'argument de cette Table est  $\log x = y$ . La série qui donne la valeur de  $\text{li } e^y$  est la suivante

$$\text{li } e^y = C + \log y + \frac{y}{1} + \frac{1}{2} \frac{y^2}{2!} + \frac{1}{3} \frac{y^3}{3!} + \frac{1}{4} \frac{y^4}{4!} + \dots,$$

la constante C ayant pour valeur

$$C = 0,5772 1566 4901 5328 6060 \dots$$

Pour trouver le logarithme intégral d'un nombre  $e^{a+z}$ , correspondant à un argument  $a+z$  compris entre deux arguments  $a$  et  $a+1$  de la Table, on se servira de la formule

$$\text{li } e^{a+z} = \text{li } e^a + \log \left( 1 + \frac{z}{a} \right) + A_1 z + A_2 z^2 + A_3 z^3 + \dots,$$

les coefficients de cette série étant donnés par les relations

$$A_1 = \frac{1}{a} (e^a - 1), \quad (n+1)A_{n+1} = \frac{1}{a} \left( \frac{e^a}{1.2 \dots n} - nA_n \right).$$

Proposons-nous, par exemple, de calculer la valeur de  $\text{li } x$  pour  $x = 20000$ . Comme  $\log \text{ nat } x = 9,903487$  est compris entre 9 et 10, mais plus voisin de 10, nous prendrons

$$a = 10, \quad z = -0,096513, \quad \text{d'où } e^z = 22026,$$

et l'on en conclura, pour les valeurs des coefficients,

$$A_1 = 2202,5, \quad A_2 = 991,2, \quad A_3 = 301,0, \quad A_4 = 69,2, \dots$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \text{li } e^z &= 2492,23 \\ \log \text{ nat } \left(1 + \frac{z}{a}\right) &= -0,01 \\ A_1 z &= -212,57 \\ A_2 z^2 &= 9,23 \\ A_3 z^3 &= -0,27 \\ A_4 z^4 &= 0,01 \\ \hline \text{li } x &= 2288,62 \end{aligned}$$

On a ainsi une expression approchée du nombre des nombres premiers inférieurs à 20000, lequel est égal à 2260.

### 31. III. Table des valeurs de l'intégrale

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx.$$

Cette Table est extraite de la Table plus étendue que Kramp a publiée dans son *Analyse des réfractions astronomiques et terrestres*.

Nous y avons joint les valeurs logarithmiques des coefficients des séries qui peuvent servir à calculer cette transcendante pour des valeurs très-petites ou très-grandes de l'argument.

## XVIII.

(Pages 62-63.)

### Table des carrés, à 4 décimales, des nombres depuis 0,000 jusqu'à 1,200.

32. Cette Table est destinée à faciliter les calculs de la méthode des moindres carrés.

Elle peut servir de Table de multiplication, au moyen de la formule

$$ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2.$$

Ainsi, pour multiplier 0,1387 par 1,7135, on aura

$$\begin{aligned} \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 &= (0,9261)^2 = 0,8577 \\ \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 &= (0,7874)^2 = 0,6200 \\ \hline \text{d'où} \quad ab &= 0,2377 \end{aligned}$$

## XIX.

(Page 64.)

## Table de puissances.

33. I. *Puissances fractionnaires de 10, ou Table abrégée d'antilogarithmes à 10 décimales.*

Cette Table a été donnée par Long (\*) avec 9 décimales, et son usage est expliqué dans l'*Algèbre* de Lacroix, n° 243 (note).

Elle peut servir à trouver par de simples multiplications le nombre correspondant à un logarithme donné, et par de simples divisions le logarithme correspondant à un nombre donné.

Ainsi, si l'on représente par  $0,abcd\dots$  la partie décimale d'un logarithme, le nombre correspondant sera

$$10^{0,abcd\dots} = 10^{0,a} \cdot 10^{0,0b} \cdot 10^{0,00c} \cdot 10^{0,000d} \dots,$$

les facteurs de ce produit étant donnés par la Table.

Si le nombre est donné, en le divisant par le plus grand nombre de la Table qu'il contienne, et opérant de même sur les quotients successifs, on obtiendra les divers chiffres de la partie décimale de son logarithme.

II. Les autres tableaux de cette page n'ont besoin d'aucune explication.

(\*) *Philosophical Transactions*, 1724, n° 339.

## FORMULES RELATIVES AUX FONCTIONS HYPERBOLIQUES.

$$\begin{aligned} \text{Sh } u &= \frac{e^u - e^{-u}}{2}, & \text{Ch } u &= \frac{e^u + e^{-u}}{2}, & \text{Th } u &= \frac{\text{Sh } u}{\text{Ch } u} = \frac{e^u - e^{-u}}{e^u + e^{-u}}. \\ \text{Coséch } u &= \frac{1}{\text{Sh } u}, & \text{Séch } u &= \frac{1}{\text{Ch } u}, & \text{Coth } u &= \frac{1}{\text{Th } u}. \\ e^{2u} &= \text{Ch } u \pm \text{Sh } u, & (\text{Ch } u \pm \text{Sh } u)^n &= \text{Ch } nu \pm \text{Sh } nu. \\ \sin(iu) &= i \text{Sh } u, & \cos(iu) &= \text{Ch } u, & \text{tang}(iu) &= i \text{Th } u. \\ \text{Sh}(iu) &= i \sin u, & \text{Ch}(iu) &= \cos u, & \text{Th}(iu) &= i \text{tang } u. \\ \text{Sh } 0 &= 0, & \text{Ch } 0 &= 1, & \text{Th } 0 &= 0, \\ \text{Sh } \infty &= \infty, & \text{Ch } \infty &= \infty, & \text{Th } \infty &= 1. \\ \text{Sh}(-u) &= -\text{Sh } u, & \text{Ch}(-u) &= \text{Ch } u, & \text{Th}(-u) &= -\text{Th } u. \\ d \text{Sh } u &= \text{Ch } u \, du, & d \text{Ch } u &= \text{Sh } u \, du, & d \text{Th } u &= \frac{du}{\text{Ch}^2 u}. \\ d \cdot \text{Sh}^2 u &= d \cdot \text{Ch}^2 u = 2 \text{Sh } u \text{Ch } u \cdot du = \text{Sh } 2u \cdot du. \\ d \cdot \log \text{Sh } u &= \text{Coth } u \, du, & d \cdot \log \text{Ch } u &= \text{Th } u \, du, & d \cdot \log \text{Th } u &= \frac{2 \, du}{\text{Sh } 2u}. \end{aligned}$$

$$\text{Sh } u = \frac{u}{1} + \frac{u^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{u^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots$$

$$\text{Ch } u = 1 + \frac{u^2}{1 \cdot 2} + \frac{u^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{u^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots$$

$$\text{Arg Sh } x = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \log(x + \sqrt{x^2+1}) = \frac{x}{1} - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$\text{Arg Ch } x = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \log(x + \sqrt{x^2-1}).$$

$$\text{Arg Th } x = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x} = \frac{x}{1} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots, \quad [x < 1].$$

$$\text{Arg Coth } x = \text{Arg Th } \frac{1}{x} = \int_x^\infty \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2} \log \frac{x+1}{x-1} = \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5} + \dots, \quad [x > 1].$$

$$\text{Arg Sh } x = \text{Arg Ch } \sqrt{x^2+1} = \text{Arg Th } \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$\text{Arg Ch } x = \text{Arg Sh } \sqrt{x^2-1} = \text{Arg Th } \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} = 2 \text{Arg Ch } \sqrt{\frac{x+1}{2}} = 2 \text{Arg Sh } \sqrt{\frac{x-1}{2}}.$$

$$\text{Pour } u \text{ très-petit, } \begin{cases} \text{Sh } u = u \cdot (\text{Ch } u)^{\frac{1}{2}}, & \text{Th } u = u \cdot (\text{Ch } u)^{-\frac{3}{2}}, \\ u = \text{Sh } u \cdot (\text{Ch } u)^{-\frac{1}{2}} = \text{Th } u \cdot (\text{Ch } u)^{\frac{3}{2}}. \end{cases}$$

$$u = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\cos \varphi} = \log \text{tang} \left( \frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\text{Amh } u = \varphi = 2 \text{ arc tang } e^u - \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{Sh } u = \text{tang } \varphi, \quad \text{Ch } u = \text{séc } \varphi, \quad \text{Th } u = \sin \varphi.$$

$$\begin{aligned} \text{Ch}^2 u - \text{Sh}^2 u &= 1 \\ \text{Th} u &= \frac{\text{Sh} u}{\text{Ch} u} \\ \text{Coth} u &= \frac{\text{Ch} u}{\text{Sh} u} \\ \text{Th} u \text{ Coth} u &= 1. \\ \text{Ch} u \text{ Séch} u &= 1. \\ \text{Sh} u \text{ Coséch} u &= 1. \\ \text{Séch}^2 u &= 1 - \text{Th}^2 u. \\ \text{Coséch}^2 u &= \text{Coth}^2 u - 1. \\ \text{Sh} u &= \frac{\text{Th} u}{\sqrt{1 - \text{Th}^2 u}}. \\ \text{Ch} u &= \frac{1}{\sqrt{1 - \text{Th}^2 u}}. \\ \text{Th} u &= \frac{1}{\text{Coth} u} \\ &= \frac{\text{Sh} u}{\sqrt{1 + \text{Sh}^2 u}} \\ &= \frac{\sqrt{\text{Ch}^2 u - 1}}{\text{Ch} u}. \\ \text{Sh} 2u &= 2 \text{Sh} u \text{ Ch} u. \\ \text{Ch} 2u &= 2 \text{Ch}^2 u - 1 \\ &= \text{Ch}^2 u + \text{Sh}^2 u \\ &= 1 + 2 \text{Sh}^2 u. \\ \text{Th} 2u &= \frac{2 \text{Th} u}{1 + \text{Th}^2 u} \\ &= \frac{2}{\text{Coth} u + \text{Th} u}. \\ \text{Coth} 2u &= \frac{\text{Coth}^2 u + 1}{2 \text{Coth} u} \\ &= \frac{1}{2} \text{Coth} u + \frac{1}{2} \text{Th} u. \\ \frac{\text{Ch} u + \text{Sh} u}{\text{Ch} u - \text{Sh} u} &= \frac{1 + \text{Th} u}{1 - \text{Th} u} \\ &= \frac{\text{Coth} u + 1}{\text{Coth} u - 1} = e^{2u}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sh} (u \pm v) &= \text{Sh} u \text{ Ch} v \pm \text{Ch} u \text{ Sh} v. \\ \text{Ch} (u \pm v) &= \text{Ch} u \text{ Ch} v \pm \text{Sh} u \text{ Sh} v. \\ \text{Sh} u \text{ Ch} v &= \frac{1}{2} \text{Sh} (u + v) + \frac{1}{2} \text{Sh} (u - v). \\ \text{Ch} u \text{ Sh} v &= \frac{1}{2} \text{Sh} (u + v) - \frac{1}{2} \text{Sh} (u - v). \\ \text{Ch} u \text{ Ch} v &= \frac{1}{2} \text{Ch} (u + v) + \frac{1}{2} \text{Ch} (u - v). \\ \text{Sh} u \text{ Sh} v &= \frac{1}{2} \text{Ch} (u + v) - \frac{1}{2} \text{Ch} (u - v). \\ \text{Sh} u + \text{Sh} v &= 2 \text{Sh} \frac{1}{2} (u + v) \text{Ch} \frac{1}{2} (u - v). \\ \text{Sh} u - \text{Sh} v &= 2 \text{Ch} \frac{1}{2} (u + v) \text{Sh} \frac{1}{2} (u - v). \\ \text{Ch} u + \text{Ch} v &= 2 \text{Ch} \frac{1}{2} (u + v) \text{Ch} \frac{1}{2} (u - v). \\ \text{Ch} u - \text{Ch} v &= 2 \text{Sh} \frac{1}{2} (u + v) \text{Sh} \frac{1}{2} (u - v). \\ \frac{\text{Sh} u + \text{Sh} v}{\text{Sh} u - \text{Sh} v} &= \frac{\text{Th} \frac{1}{2} (u + v)}{\text{Th} \frac{1}{2} (u - v)}. \\ \frac{\text{Ch} u + \text{Ch} v}{\text{Ch} u - \text{Ch} v} &= \frac{1}{\text{Th} \frac{1}{2} (u + v) \text{Th} \frac{1}{2} (u - v)}. \\ \frac{\text{Sh} u \pm \text{Sh} v}{\text{Ch} u + \text{Ch} v} &= \frac{\text{Ch} u - \text{Ch} v}{\text{Sh} u \mp \text{Sh} v} = \text{Th} \frac{1}{2} (u \pm v). \\ \text{Th} (u \pm v) &= \frac{\text{Th} u \pm \text{Th} v}{1 \pm \text{Th} u \text{Th} v}. \\ \text{Coth} (u \pm v) &= \frac{\text{Coth} u \text{Coth} v \pm 1}{\text{Coth} v \pm \text{Coth} u}. \\ \text{Th} u \pm \text{Th} v &= \frac{\text{Sh} (u \pm v)}{\text{Ch} u \text{Ch} v}. \\ \text{Coth} u \pm \text{Coth} v &= \frac{\text{Sh} (u \pm v)}{\text{Sh} u \text{Sh} v}. \\ \text{Coth} u \pm \text{Th} v &= \frac{\text{Ch} (u \pm v)}{\text{Sh} u \text{Ch} v}. \\ \text{Sh}^2 u - \text{Sh}^2 v &= \text{Ch}^2 u - \text{Ch}^2 v = \text{Sh} (u + v) \text{Sh} (u - v). \\ \text{Ch}^2 u + \text{Sh}^2 v &= \text{Sh}^2 u + \text{Ch}^2 v = \text{Ch} (u + v) \text{Ch} (u - v). \\ \text{Ch} u + 1 &= 2 \text{Ch}^2 \frac{1}{2} u, \quad \text{Ch} u - 1 = 2 \text{Sh}^2 \frac{1}{2} u. \\ \text{Th} \frac{1}{2} u &= \frac{1}{\text{Coth} \frac{1}{2} u} = \frac{\text{Sh} u}{\text{Ch} u + 1} = \frac{\text{Ch} u - 1}{\text{Sh} u} = \sqrt{\frac{\text{Ch} u - 1}{\text{Ch} u + 1}}. \\ \text{Ch} u &= \frac{1 + \text{Th}^2 \frac{1}{2} u}{1 - \text{Th}^2 \frac{1}{2} u}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sh} 3u &= 4 \text{Sh}^3 u + 3 \text{Sh} u = \text{Sh} u (4 \text{Ch}^2 u - 1), \\ \text{Ch} 3u &= 4 \text{Ch}^3 u - 3 \text{Ch} u = \text{Ch} u (4 \text{Sh}^2 u + 1). \\ \text{Th} 3u &= \frac{\text{Th}^3 u + 3 \text{Th} u}{3 \text{Th}^2 u + 1}, \quad \text{Coth} 3u = \frac{\text{Coth} u + 3 \text{Th} u}{3 + \text{Th} u}. \\ \text{Sh} (n + 1) u &= 2 \text{Ch} u \cdot \text{Sh} nu - \text{Sh} (n - 1) u, \\ \text{Ch} (n + 1) u &= 2 \text{Ch} u \cdot \text{Ch} nu - \text{Ch} (n - 1) u. \end{aligned}$$

Des formules de la page xxxvii des *T.* à 5*D.* il est aisé d'en déduire d'autres relatives aux fonctions hyperboliques, en remplaçant  $\sin a$ ,  $\sin na$ ,  $\cos a$ ,  $\cos na$  par  $i \text{Sh} a$ ,  $i \text{Sh} na$ ,  $\text{Ch} a$ ,  $\text{Ch} na$ .

## Résolution des équations du second et du troisième degré.

$p$  positif ou négatif,  
 $q$  positif.

$$\text{I. } x^3 + px + q = 0, \quad \left(\frac{p^3}{4} > q\right).$$

$$\text{Th } u = \frac{2}{p} \sqrt{q},$$

$$x' = -\sqrt{q} \text{Coth } \frac{1}{2} u,$$

$$x'' = -\sqrt{q} \text{Th } \frac{1}{2} u.$$

$$\text{II. } x^3 + px + q = 0, \quad \left(\frac{p^3}{4} < q\right).$$

$$\text{Ch } u = \pm \frac{2}{p} \sqrt{q}, \quad (\pm p > 0),$$

$$\left. \begin{matrix} x' \\ x'' \end{matrix} \right\} = -\frac{p}{2} \pm i \sqrt{q} \cdot \text{Th } u.$$

$$\text{III. } x^3 + px - q = 0.$$

$$\text{Sh } u = \frac{2}{p} \sqrt{q},$$

$$x' = \sqrt{q} \cdot \text{Th } \frac{1}{2} u,$$

$$x'' = -\sqrt{q} \cdot \text{Coth } \frac{1}{2} u.$$

$p$  positif,  
 $q$  positif ou négatif.

$$\text{I. } x^3 - px + q = 0.$$

$$\text{Sh } u = -\frac{q}{2} \left(\frac{3}{p}\right)^{\frac{2}{3}},$$

$$x' = 2 \sqrt{\frac{p}{3}} \cdot \text{Sh } \frac{1}{2} u,$$

$$\left. \begin{matrix} x' \\ x'' \end{matrix} \right\} = -\frac{1}{2} x' \pm i \sqrt{p} \cdot \text{Ch } \frac{1}{2} u.$$

$$\text{II. } x^3 - px + q = 0, \quad \left(\frac{p^3}{27} > \frac{q^2}{4}\right).$$

$$\text{Ch } u = \mp \frac{q}{2} \left(\frac{3}{p}\right)^{\frac{2}{3}}, \quad (\mp q > 0),$$

$$x' = \pm 2 \sqrt{\frac{p}{3}} \cdot \text{Ch } \frac{1}{2} u,$$

$$\left. \begin{matrix} x' \\ x'' \end{matrix} \right\} = -\frac{1}{2} x' \pm i \sqrt{p} \cdot \text{Sh } \frac{1}{2} u.$$

$$\text{III. } x^3 - px + q = 0, \quad \left(\frac{p^3}{27} < \frac{q^2}{4}\right).$$

$$\text{cos } u = \frac{q}{2} \left(\frac{3}{p}\right)^{\frac{2}{3}},$$

$$x' = -2 \sqrt{\frac{p}{3}} \cdot \text{cos } \frac{1}{2} u,$$

$$\left. \begin{matrix} x' \\ x'' \end{matrix} \right\} = 2 \sqrt{\frac{p}{3}} \cdot \text{cos } \frac{1}{2} (\pi \pm u).$$

---



---

**FORMULES RELATIVES AUX FONCTIONS ELLIPTIQUES.**


---

—••••—

**§ I<sup>er</sup>.**
**Des fonctions  $\vartheta$ .**

Soit  $\rho$  un nombre positif, et posons

$$(1) \quad q = e^{-2\rho}, \quad \rho = \frac{1}{2} \log \text{nat.} \frac{1}{q}.$$

Les fonctions  $\vartheta$  sont définies par les équations (\*)

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \vartheta x = 1 - 2q \cos 2x + 2q^4 \cos 4x - 2q^9 \cos 6x + \dots, \\ \vartheta_1 x = 2q^{\frac{1}{2}} \sin x - 2q^{\frac{9}{2}} \sin 3x + 2q^{\frac{25}{2}} \sin 5x - \dots, \\ \vartheta_2 x = 2q^{\frac{1}{2}} \cos x + 2q^{\frac{9}{2}} \cos 3x + 2q^{\frac{25}{2}} \cos 5x + \dots, \\ \vartheta_3 x = 1 + 2q \cos 2x + 2q^4 \cos 4x + 2q^9 \cos 6x + \dots \end{array} \right.$$

Lorsque la constante  $q$  se trouve remplacée par une autre lettre,  $q'$  par exemple, on la mettra en évidence, et l'on écrira

$$\vartheta(x, q'), \quad \vartheta_1(x, q'), \quad \vartheta_2(x, q'), \quad \vartheta_3(x, q').$$

On a d'abord les relations

$$(3) \quad \vartheta(-x) = \vartheta x, \quad \vartheta_1(-x) = -\vartheta_1 x, \quad \vartheta_2(-x) = \vartheta_2 x, \quad \vartheta_3(-x) = \vartheta_3 x.$$

En faisant, pour abrégér,

$$q^{\frac{1}{2}} e^{-x^2} = g,$$

---

(\*) Pour comparer nos notations avec celles de JACOBI, si l'on pose (n° 11)

$$u = \frac{2K}{\pi} x, \quad \rho = \frac{\pi K'}{2K}, \quad q = e^{-\frac{\pi K'}{K}},$$

on aura

$$\Theta(u) = \vartheta x, \quad H(u) = \vartheta_1 x, \quad H_1(u) = \vartheta_2 x, \quad \Theta_1(u) = \vartheta_3 x,$$

et les relations (4) deviendront

$$g = q^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\pi u}{2K} i},$$

$$\begin{aligned} \Theta(u) &= \Theta_1(K-u) = ig H(u-K'i) = -ig H_1(u+K-K'i), \\ H(u) &= H_1(K-u) = ig \Theta(u-K'i) = ig \Theta_1(u+K-K'i), \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

On en tire (voyez § XI)

$$\Theta(0) = \Theta_1(K), \quad H(0) = H_1(K) = 0, \quad H_1(0) = H(K), \quad \Theta_1(0) = \Theta(K),$$

etc.

on a entre les quatre fonctions & les relations

$$(4) \quad \begin{cases} \mathfrak{S} x = \mathfrak{S}_3 \left( \frac{\pi}{2} - x \right) = ig \mathfrak{S}_1 (x - \rho i) = -ig \mathfrak{S}_2 \left( x + \frac{\pi}{2} - \rho i \right); \\ \mathfrak{S}_1 x = \mathfrak{S}_2 \left( \frac{\pi}{2} - x \right) = ig \mathfrak{S} (x - \rho i) = ig \mathfrak{S}_3 \left( x + \frac{\pi}{2} - \rho i \right); \\ \mathfrak{S}_2 x = \mathfrak{S}_1 \left( \frac{\pi}{2} - x \right) = g \mathfrak{S}_3 (x - \rho i) = g \mathfrak{S} \left( x + \frac{\pi}{2} - \rho i \right); \\ \mathfrak{S}_3 x = \mathfrak{S} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) = g \mathfrak{S}_2 (x - \rho i) = g \mathfrak{S}_1 \left( x + \frac{\pi}{2} - \rho i \right). \end{cases}$$

$$(5) \quad \begin{cases} \mathfrak{S} (0) = \mathfrak{S}_3 \left( \frac{\pi}{2} \right) = 1 - 2q + 2q^4 - 2q^9 + \dots, \\ \mathfrak{S}_1 (0) = \mathfrak{S}_2 \left( \frac{\pi}{2} \right) = 0, \\ \mathfrak{S}_2 (0) = \mathfrak{S}_1 \left( \frac{\pi}{2} \right) = 2q^{\frac{1}{2}} + 2q^{\frac{9}{2}} + 2q^{\frac{25}{2}} + \dots, \\ \mathfrak{S}_3 (0) = \mathfrak{S} \left( \frac{\pi}{2} \right) = 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + \dots \end{cases}$$

$$(6) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } \begin{cases} x = \alpha + m\pi + 2n\rho i, \\ X_n = q^{-n^2} e^{-2n\alpha i}, \end{cases} \\ \text{on a } \begin{cases} \mathfrak{S} x = (-1)^n X_n \mathfrak{S} \alpha, \\ \mathfrak{S}_1 x = (-1)^{m+n} X_n \mathfrak{S}_1 \alpha, \\ \mathfrak{S}_2 x = (-1)^m X_n \mathfrak{S}_2 \alpha, \\ \mathfrak{S}_3 x = X_n \mathfrak{S}_3 \alpha. \end{cases} \end{array} \right. \quad (7) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } \begin{cases} x = \alpha + m\pi + (2n+1)\rho i \\ X_n = q^{-(n+\frac{1}{2})^2} e^{-(2n+1)\alpha i}, \end{cases} \\ \text{on a } \begin{cases} \mathfrak{S} x = (-1)^{n+\frac{1}{2}} X_n \mathfrak{S}_1 \alpha, \\ \mathfrak{S}_1 x = (-1)^{m+n+\frac{1}{2}} X_n \mathfrak{S} \alpha, \\ \mathfrak{S}_2 x = (-1)^m X_n \mathfrak{S}_3 \alpha, \\ \mathfrak{S}_3 x = X_n \mathfrak{S}_2 \alpha. \end{cases} \end{array} \right.$$

§ II.

Soient

$$(8) \quad \rho' = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{1}{\rho}, \quad x' = x \sqrt{\frac{\rho'}{\rho}} = \frac{\pi x}{2\rho} = \frac{2\rho' x}{\pi},$$

d'où

$$(9) \quad \rho\rho' = \frac{\pi^2}{4}, \quad \frac{x'}{x} = \frac{\sqrt{\rho'}}{\sqrt{\rho}} = \frac{\pi}{2\rho} = \frac{2\rho'}{\pi} = \gamma,$$

$$(10) \quad q' = e^{-2\rho'}, \quad \rho' = \frac{1}{2} \log \text{nat. } \frac{1}{q'}.$$

En faisant, pour abrégé (\*),

$$V = \sqrt{\gamma} \cdot e^{\frac{x^2}{2\rho}} = \sqrt{\gamma} \cdot e^{\frac{x'^2}{2\rho'}} = \sqrt{\gamma} \cdot q'^{\frac{x^2}{\pi^2}} = \sqrt{\gamma} \cdot q'^{\frac{x'^2}{\pi^2}},$$

on aura

$$(11) \quad \begin{cases} \mathfrak{S} (xi) = V \cdot \mathfrak{S}_2 (x', q'), \\ \frac{1}{i} \mathfrak{S}_1 (xi) = V \cdot \mathfrak{S} (x', q'), \\ \mathfrak{S}_2 (xi) = V \cdot \mathfrak{S}_3 (x', q'), \\ \mathfrak{S}_3 (xi) = V \cdot \mathfrak{S}_1 (x', q'). \end{cases}$$

(\*) D'après la notation de JACOBI,

$$\rho' = \frac{\pi K}{2K'}, \quad q' = e^{-\frac{\pi K}{K'}}, \quad x' = \frac{\pi u}{2K'}, \quad \mathfrak{S} (x', q') = \Theta (u, K'), \quad \text{etc.}$$



Pour  $q$  voisin de l'unité,  $q'$  très-petit, on emploiera les formules

$$V' = \sqrt{\gamma} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\rho}} = \sqrt{\gamma} \cdot e^{-\frac{x'^2}{2\rho'}} = \sqrt{\gamma} \cdot q'^{-\frac{x^2}{2\rho}} = \sqrt{\gamma} \cdot q^{-\frac{x'^2}{2\rho}}.$$

$$(12) \quad \begin{cases} \mathfrak{S} x = V' (2q^{1/2} \text{Ch } x' + 2q^{3/2} \text{Ch } 3x' + 2q^{5/2} \text{Ch } 5x' + \dots), \\ \mathfrak{S}_1 x = V' (2q^{1/2} \text{Sh } x' - 2q^{3/2} \text{Sh } 3x' + 2q^{5/2} \text{Sh } 5x' - \dots), \\ \mathfrak{S}_2 x = V' (1 - 2q' \text{Ch } 2x' + 2q'^2 \text{Ch } 4x' - 2q'^3 \text{Ch } 6x' + \dots), \\ \mathfrak{S}_3 x = V' (1 + 2q' \text{Ch } 2x' + 2q'^2 \text{Ch } 4x' + 2q'^3 \text{Ch } 6x' + \dots); \end{cases}$$

$$(13) \quad \begin{cases} \mathfrak{S} (0) = \sqrt{\gamma} (2q^{1/2} + 2q^{3/2} + 2q^{5/2} + \dots), \\ \mathfrak{S}_1 (0) = \sqrt{\gamma} (1 - 2q' + 2q'^2 - 2q'^3 + \dots), \\ \mathfrak{S}_2 (0) = \sqrt{\gamma} (1 + 2q' + 2q'^2 + 2q'^3 + \dots). \end{cases}$$

§ III.

Soient, pour abrégé,

$$(14) \quad \Gamma = \sqrt{\gamma} \cdot e^{\frac{y^2 - x^2}{2\rho}} = \sqrt{\gamma} \cdot e^{\frac{y'^2 - x'^2}{2\rho'}}, \quad y' = y \sqrt{\frac{\rho}{\rho'}}$$

$$(15) \quad \begin{cases} \lambda' (x, yi, q) = 1 - 2q \cos 2x \text{Ch } 2y + 2q^2 \cos 4x \text{Ch } 4y - \dots, \\ \lambda'' (x, yi, q) = 2q \sin 2x \text{Sh } 2y - 2q^2 \sin 4x \text{Sh } 4y + \dots, \\ \lambda'_1 (x, yi, q) = 2q^{1/2} \sin x \text{Ch } y - 2q^{3/2} \sin 3x \text{Ch } 3y + \dots, \\ \lambda''_1 (x, yi, q) = 2q^{1/2} \cos x \text{Sh } y - 2q^{3/2} \cos 3x \text{Sh } 3y + \dots, \\ \lambda'_2 (x, yi, q) = 2q^{1/2} \cos x \text{Ch } y + 2q^{3/2} \cos 3x \text{Ch } 3y + \dots, \\ \lambda''_2 (x, yi, q) = 2q^{1/2} \sin x \text{Sh } y + 2q^{3/2} \sin 3x \text{Sh } 3y + \dots, \\ \lambda'_3 (x, yi, q) = 1 + 2q \cos 2x \text{Ch } 2y + 2q^2 \cos 4x \text{Ch } 4y + \dots, \\ \lambda''_3 (x, yi, q) = 2q \sin 2x \text{Sh } 2y + 2q^2 \sin 4x \text{Sh } 4y + \dots \end{cases}$$

On a

$$(16) \quad \begin{cases} \frac{\mathfrak{S} (x+yi) + \mathfrak{S} (x-yi)}{2} = \lambda' (x, yi, q) = \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_2 (y', x'i, q') + \Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_2 (y', x'i, q'), \\ \frac{\mathfrak{S} (x+yi) - \mathfrak{S} (x-yi)}{2i} = \lambda'' (x, yi, q) = -\Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_2 (y', x'i, q') + \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_2 (y', x'i, q'), \\ \frac{\mathfrak{S}_1 (x+yi) + \mathfrak{S}_1 (x-yi)}{2} = \lambda'_1 (x, yi, q) = \Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_1 (y', x'i, q') + \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_1 (y', x'i, q'), \\ \frac{\mathfrak{S}_1 (x+yi) - \mathfrak{S}_1 (x-yi)}{2i} = \lambda''_1 (x, yi, q) = \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_1 (y', x'i, q') - \Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_1 (y', x'i, q'), \\ \frac{\mathfrak{S}_2 (x-yi) + \mathfrak{S}_2 (x+yi)}{2} = \lambda'_2 (x, yi, q) = \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_2 (y', x'i, q') - \Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_2 (y', x'i, q'), \\ \frac{\mathfrak{S}_2 (x-yi) - \mathfrak{S}_2 (x+yi)}{2i} = \lambda''_2 (x, yi, q) = \Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_2 (y', x'i, q') + \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_2 (y', x'i, q'), \\ \frac{\mathfrak{S}_3 (x-yi) + \mathfrak{S}_3 (x+yi)}{2} = \lambda'_3 (x, yi, q) = \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_3 (y', x'i, q') + \Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_3 (y', x'i, q'), \\ \frac{\mathfrak{S}_3 (x-yi) - \mathfrak{S}_3 (x+yi)}{2i} = \lambda''_3 (x, yi, q) = \Gamma \sin \frac{x'y'}{\rho'} \lambda'_3 (y', x'i, q') - \Gamma \cos \frac{x'y'}{\rho'} \lambda''_3 (y', x'i, q'). \end{cases}$$

§ IV.

$$(17) \left\{ \begin{aligned} \log \frac{\mathfrak{S} x}{\mathfrak{S}_0} &= \frac{2 \sin^2 x}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{2 \sin^2 2x}{2 \text{Sh } 4\rho} + \frac{2 \sin^2 3x}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ \log \frac{\mathfrak{S}_1 x}{\mathfrak{S}_0} &= \log \sin x - \frac{2q \cos^2 x}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{2q^2 \sin^2 2x}{2 \text{Sh } 4\rho} - \frac{2q^3 \cos^2 3x}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ \log \frac{\mathfrak{S}_2 x}{\mathfrak{S}_0} &= \log \cos x - \frac{2q \sin^2 x}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{2q^2 \sin^2 2x}{2 \text{Sh } 4\rho} - \frac{2q^3 \sin^2 3x}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ \log \frac{\mathfrak{S}_3 x}{\mathfrak{S}_0} &= -\frac{2 \sin^2 x}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{2 \sin^2 2x}{2 \text{Sh } 4\rho} - \frac{2 \sin^2 3x}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots \end{aligned} \right.$$

$$(18) \left\{ \begin{aligned} \frac{1}{2} \log \frac{\mathfrak{S}(x+y)}{\mathfrak{S}(x-y)} &= \frac{\sin 2x \sin 2y}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{\sin 4x \sin 4y}{2 \text{Sh } 4\rho} + \frac{\sin 6x \sin 6y}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ \frac{1}{2} \log \frac{\mathfrak{S}_1(x+y)}{\mathfrak{S}_1(x-y)} &= \frac{1}{2} \log \frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} + \frac{q \sin 2x \sin 2y}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{q^2 \sin 4x \sin 4y}{2 \text{Sh } 4\rho} + \frac{q^3 \sin 6x \sin 6y}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ \frac{1}{2} \log \frac{\mathfrak{S}_2(x+y)}{\mathfrak{S}_2(x-y)} &= \frac{1}{2} \log \frac{\cos(x+y)}{\cos(x-y)} - \frac{q \sin 2x \sin 2y}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{q^2 \sin 4x \sin 4y}{2 \text{Sh } 4\rho} - \frac{q^3 \sin 6x \sin 6y}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ \frac{1}{2} \log \frac{\mathfrak{S}_3(x+y)}{\mathfrak{S}_3(x-y)} &= -\frac{\sin 2x \sin 2y}{\text{Sh } 2\rho} + \frac{\sin 4x \sin 4y}{2 \text{Sh } 4\rho} - \frac{\sin 6x \sin 6y}{3 \text{Sh } 6\rho} + \dots \end{aligned} \right.$$

$$(19) \left\{ \begin{aligned} \frac{1}{2i} \log \frac{\mathfrak{S}(x+yi)}{\mathfrak{S}(x-yi)} &= \text{arc tang } \frac{\lambda''(x, yi, q)}{\lambda'(x, yi, q)}, & [\text{Voyez form. (15).}] \\ \frac{1}{2i} \log \frac{\mathfrak{S}_1(yi-x)}{\mathfrak{S}_1(yi+x)} &= x + \text{arc tang } \frac{\lambda''[x, (\rho-y)i, q]}{\lambda'[x, (\rho-y)i, q]}, \\ \frac{1}{2i} \log \frac{\mathfrak{S}_2(x-yi)}{\mathfrak{S}_2(x+yi)} &= x - \text{arc tang } \frac{\lambda''_3[x, (\rho-y)i, q]}{\lambda'_3[x, (\rho-y)i, q]}, \\ \frac{1}{2i} \log \frac{\mathfrak{S}_3(x-yi)}{\mathfrak{S}_3(x+yi)} &= \text{arc tang } \frac{\lambda''_3(x, yi, q)}{\lambda'_3(x, yi, q)}. \end{aligned} \right.$$

§ V.

$$(20) \left\{ \begin{aligned} D_x \log \mathfrak{S} x &= \frac{2}{\mathfrak{S} x} (2q \sin 2x - 4q^2 \sin 4x + 6q^3 \sin 6x - + \dots) (*), \\ D_x \log \mathfrak{S}_1 x &= \frac{2}{\mathfrak{S}_1 x} (q^{\frac{1}{2}} \cos x - 3q^{\frac{3}{2}} \cos 3x + 5q^{\frac{5}{2}} \cos 5x - + \dots), \\ D_x \log \mathfrak{S}_2 x &= -\frac{2}{\mathfrak{S}_2 x} (q^{\frac{1}{2}} \sin x + 3q^{\frac{3}{2}} \sin 3x + 5q^{\frac{5}{2}} \sin 5x + \dots), \\ D_x \log \mathfrak{S}_3 x &= -\frac{2}{\mathfrak{S}_3 x} (2q \sin 2x + 4q^2 \sin 4x + 6q^3 \sin 6x + \dots). \end{aligned} \right.$$

$$(21) \left\{ \begin{aligned} D_x \log \mathfrak{S} x &= 2 \frac{\sin 2x}{\text{Sh } 2\rho} + 2 \frac{\sin 4x}{\text{Sh } 4\rho} + 2 \frac{\sin 6x}{\text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ D_x \log \mathfrak{S}_1 x &= \cot x + 2q \frac{\sin 2x}{\text{Sh } 2\rho} + 2q^2 \frac{\sin 4x}{\text{Sh } 4\rho} + 2q^3 \frac{\sin 6x}{\text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ D_x \log \mathfrak{S}_2 x &= -\text{tang } x - 2q \frac{\sin 2x}{\text{Sh } 2\rho} + 2q^2 \frac{\sin 4x}{\text{Sh } 4\rho} - 2q^3 \frac{\sin 6x}{\text{Sh } 6\rho} + \dots, \\ D_x \log \mathfrak{S}_3 x &= -2 \frac{\sin 2x}{\text{Sh } 2\rho} + 2 \frac{\sin 4x}{\text{Sh } 4\rho} - 2 \frac{\sin 6x}{\text{Sh } 6\rho} + \dots \end{aligned} \right.$$

(\*)  $D_x \log \mathfrak{S} x = \frac{2K}{\pi} \cdot D_u \log \Theta(u) = \frac{2K}{\pi} \cdot Z(u)$  (JACOBI).

$$(22) \left\{ \begin{aligned} D_x \log \mathfrak{S} x &= -\frac{2x'}{\pi} + \sqrt{\frac{\rho'}{\rho}} \left( \text{Th} x' + 2q' \frac{\text{Sh} 2x'}{\text{Sh} 2\rho'} - 2q'^2 \frac{\text{Sh} 4x'}{\text{Sh} 4\rho'} + \dots \right), \\ D_x \log \mathfrak{S}_1 x &= -\frac{2x'}{\pi} + \sqrt{\frac{\rho'}{\rho}} \left( \frac{1}{\text{Th} x'} - 2q' \frac{\text{Sh} 2x'}{\text{Sh} 2\rho'} - 2q'^2 \frac{\text{Sh} 4x'}{\text{Sh} 4\rho'} - \dots \right), \\ D_x \log \mathfrak{S}_2 x &= -\frac{2x'}{\pi} - 2\sqrt{\frac{\rho'}{\rho}} \left( \frac{\text{Sh} 2x'}{\text{Sh} 2\rho'} + \frac{\text{Sh} 4x'}{\text{Sh} 4\rho'} + \dots \right), \\ D_x \log \mathfrak{S}_3 x &= -\frac{2x'}{\pi} + 2\sqrt{\frac{\rho'}{\rho}} \left( \frac{\text{Sh} 2x'}{\text{Sh} 2\rho'} - \frac{\text{Sh} 4x'}{\text{Sh} 4\rho'} + \dots \right). \end{aligned} \right.$$

$$(23) \left\{ \begin{aligned} D_x \log \mathfrak{S} (xi) &= -\frac{2}{\mathfrak{S}(xi)} (2q \text{Sh} 2x - 4q^3 \text{Sh} 4x + 6q^5 \text{Sh} 6x - \dots), \\ D_x \log \mathfrak{S}_1 (xi) &= \frac{2i}{\mathfrak{S}_1(xi)} \left( q^{\frac{1}{2}} \text{Ch} x - 3q^{\frac{3}{2}} \text{Ch} 3x + 5q^{\frac{5}{2}} \text{Ch} 5x - \dots \right), \\ D_x \log \mathfrak{S}_2 (xi) &= \frac{2}{\mathfrak{S}_2(xi)} \left( q^{\frac{1}{2}} \text{Sh} x + 3q^{\frac{3}{2}} \text{Sh} 3x + 5q^{\frac{5}{2}} \text{Sh} 5x + \dots \right), \\ D_x \log \mathfrak{S}_3 (xi) &= \frac{2}{\mathfrak{S}_3(xi)} (2q \text{Sh} 2x + 4q^3 \text{Sh} 4x + 6q^5 \text{Sh} 6x + \dots). \end{aligned} \right.$$

$$(24) \left\{ \begin{aligned} D_x \log \mathfrak{S} (xi) &= -\text{Sh} 2x \left[ \frac{1}{\text{Sh}(\rho-x)\text{Sh}(\rho+x)} + \frac{1}{\text{Sh}(3\rho-x)\text{Sh}(3\rho+x)} + \dots \right], \\ D_x \log \mathfrak{S}_1 (xi) &= 1 + \text{Sh} 2(\rho-x) \left[ \frac{1}{\text{Sh} x \text{Sh}(2\rho-x)} + \frac{1}{\text{Sh}(2\rho+x)\text{Sh}(4\rho-x)} + \dots \right], \\ D_x \log \mathfrak{S}_2 (xi) &= 1 - \text{Sh} 2(\rho-x) \left[ \frac{1}{\text{Ch} x \text{Ch}(2\rho-x)} + \frac{1}{\text{Ch}(2\rho+x)\text{Ch}(4\rho-x)} + \dots \right], \\ D_x \log \mathfrak{S}_3 (xi) &= \text{Sh} 2x \left[ \frac{1}{\text{Ch}(\rho-x)\text{Ch}(\rho+x)} + \frac{1}{\text{Ch}(3\rho-x)\text{Ch}(3\rho+x)} + \dots \right]. \end{aligned} \right.$$

§ VI.

Des fonctions elliptiques.

Soient  $k$  le module positif et  $< 1$ ,  $k'$  le module complémentaire,  $\theta$  l'angle du module,  $\varphi$  l'amplitude de l'intégrale  $F(\varphi)$ .

$$(25) \quad k^2 + k'^2 = 1, \quad k = \sin \theta, \quad k' = \cos \theta.$$

$$(26) \quad \left\{ \begin{aligned} \Delta \varphi &= \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}, \\ u &= F(\varphi) = \arg \text{am } \varphi = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\Delta \varphi}, \quad \varphi = \text{am } u. \end{aligned} \right.$$

$$(27) \quad \left\{ \begin{aligned} \sin \text{am } u &= \text{sn } u = \sin \varphi, \\ \cos \text{am } u &= \text{cn } u = \cos \varphi, \\ \Delta \text{am } u &= \text{dn } u = \Delta \varphi, \\ \text{tang am } u &= \text{tn } u = \text{tang } \varphi. \end{aligned} \right. \quad (28) \quad \left\{ \begin{aligned} &\text{Pour } u \text{ réel,} \\ -1 &< \text{sn } u < +1, \\ -1 &< \text{cn } u < +1, \\ k' &< \text{dn } u < +1, \\ -\infty &< \text{tn } u < +\infty. \end{aligned} \right.$$

Si le module est représenté par un autre signe que la lettre  $k$ , on le met en

évidence, et l'on écrit, par exemple, le module étant  $\lambda$ ,

$$\Delta(\varphi, \lambda), \quad F(\varphi, \lambda), \quad \text{am}(u, \lambda), \quad \text{sn}(u, \lambda), \quad \text{etc.}$$

$$(29) \quad \left\{ \begin{aligned} K = F'(k) = F' = \arg \text{am} \frac{\pi}{2} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\Delta\varphi}, \\ K' = F'(k') = \arg \text{am} \left( \frac{\pi}{2}, k' \right) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\Delta(\varphi, k')}. \end{aligned} \right.$$



§ VII.

$$(30) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{d \cdot \text{am} u}{du} &= \text{dn} u, \\ \frac{d \cdot \text{sn} u}{du} &= \text{cn} u \text{ dn} u, \\ \frac{d \cdot \text{cn} u}{du} &= -\text{sn} u \text{ dn} u, \\ \frac{d \cdot \text{dn} u}{du} &= -k^2 \text{sn} u \text{ cn} u, \\ \frac{d \cdot \text{tn} u}{du} &= \frac{\text{dn} u}{\text{cn}^2 u}. \end{aligned} \right.$$

$$(31) \quad \left\{ \begin{aligned} \arg \text{am} t &= \int_0^t \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}}, \\ \arg \text{sn} t &= \int_0^t \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2} \sqrt{1 - k^2 t^2}}, \\ \arg \text{cn} t &= \int_1^t \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2} \sqrt{k'^2 + k^2 t^2}}, \\ \arg \text{dn} t &= \int_1^t \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2} \sqrt{t^2 - k'^2}}, \\ \arg \text{tn} t &= \int_0^t \frac{dt}{\sqrt{1 + t^2} \sqrt{1 + k'^2 t^2}}. \end{aligned} \right.$$

$$(32) \quad \left\{ \begin{aligned} \text{sn}^2 u + \text{cn}^2 u &= 1, \\ k^2 \text{sn}^2 u + \text{dn}^2 u &= 1, \\ \text{dn}^2 u - k^2 \text{cn}^2 u &= k'^2, \\ \text{tn} u &= \frac{\text{sn} u}{\text{cn} u}. \end{aligned} \right.$$

$$(33) \quad \left\{ \begin{aligned} \text{am}(-u) &= -\text{am} u, \\ \text{sn}(-u) &= -\text{sn} u, \\ \text{cn}(-u) &= \text{cn} u, \\ \text{dn}(-u) &= \text{dn} u, \\ \text{tn}(-u) &= -\text{tn} u. \end{aligned} \right.$$

$$(34) \quad \left\{ \begin{aligned} \text{am} 0 &= 0, & \text{am} K &= \frac{\pi}{2}, \\ \text{sn} 0 &= 0, & \text{sn} K &= 1, \\ \text{cn} 0 &= 1, & \text{cn} K &= 0, \\ \text{dn} 0 &= 1, & \text{dn} K &= k', \\ \text{tn} 0 &= 0, & \text{tn} K &= \infty. \end{aligned} \right.$$

$$(35) \quad \left\{ \begin{aligned} \text{Pour } k &= 0, & k' &= 1, & \theta &= 0, \\ K &= \frac{\pi}{2}, & K' &= \infty, \\ u &= \text{am} u = \varphi, \\ \text{sn} u &= \sin u, \\ \text{cn} u &= \cos u, \\ \text{dn} u &= 1, \\ \text{tn} u &= \text{tang} u. \end{aligned} \right.$$

$$(36) \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } k = 1, \quad k' = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \\ K = \infty, \quad K' = \frac{\pi}{2}, \\ u = \log \operatorname{tang} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right), \\ \varphi = \operatorname{am} (u, 1) = \operatorname{Am} h u = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tang} e^u - \frac{\pi}{2}, \\ \operatorname{sn} u = \operatorname{Th} u, \\ \operatorname{cn} u = \operatorname{dn} u = \frac{1}{\operatorname{Ch} u}, \\ \operatorname{tn} u = \operatorname{Sh} u. \end{array} \right.$$

§ VIII.

$$(37) \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{sn} (u + v) = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{cn} (u + v) = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{dn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} v}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{dn} (u + v) = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \\ \operatorname{tn} (u + v) = \frac{\operatorname{tn} u \operatorname{dn} v + \operatorname{tn} v \operatorname{dn} u}{1 - \operatorname{tn} u \operatorname{dn} v \cdot \operatorname{tn} v \operatorname{dn} u}, \\ \operatorname{am} (u + v) = \operatorname{arc} \operatorname{tang} (\operatorname{tn} u \operatorname{dn} v) + \operatorname{arc} \operatorname{tang} (\operatorname{tn} v \operatorname{dn} u). \end{array} \right.$$

$$(38) \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } u = a + 2mK + 2niK', \\ \operatorname{am} u = (m \pm n) \pi + (-1)^m \operatorname{am} a, \\ \operatorname{sn} u = (-1)^m \operatorname{sn} a, \quad \operatorname{dn} u = (-1)^n \operatorname{dn} a, \\ \operatorname{cn} u = (-1)^{m+n} \operatorname{cn} a, \quad \operatorname{tn} u = (-1)^n \operatorname{tn} a. \end{array} \right.$$

$$(39) \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour} \\ u = 2mK + 2niK', \quad (2m+1)K + 2niK', \quad 2mK + (2n+1)K', \quad (2m+1)K + (2n+1)K', \\ \operatorname{sn} u = 0, \quad (-1)^m, \quad \infty, \quad \frac{(-1)^m}{k}, \\ \operatorname{cn} u = (-1)^{m+n}, \quad 0, \quad \infty, \quad \frac{(-1)^{m+n} k'}{ik}, \\ \operatorname{dn} u = (-1)^n, \quad (-1)^n k', \quad \infty, \quad 0, \\ \operatorname{tn} u = 0, \quad \infty, \quad (-1)^n i, \quad \frac{(-1)^n i}{k'}. \end{array} \right.$$

§ IX.

Désignons par l'indice inférieur 1 les fonctions elliptiques relatives à l'argument  $K - u$ , complément de  $u$ .

$$(40) \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{am}_1 u = \operatorname{coam} u = \operatorname{am} (K - u), \\ \operatorname{sn}_1 u = \operatorname{sin} \operatorname{coam} u = \operatorname{sn} (K - u), \\ \operatorname{cn}_1 u = \operatorname{cos} \operatorname{coam} u = \operatorname{cn} (K - u), \\ \operatorname{dn}_1 u = \Delta \operatorname{coam} u = \operatorname{dn} (K - u), \\ \operatorname{tn}_1 u = \operatorname{tang} \operatorname{coam} u = \operatorname{tn} (K - u). \end{array} \right.$$

$$(41) \begin{cases} \operatorname{sn}_1 u = \frac{\operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, & \operatorname{cn}_1 u = \frac{k' \operatorname{sn} u}{\operatorname{dn} u}, & \operatorname{dn}_1 u = \frac{k'}{\operatorname{dn} u}, & \operatorname{tn}_1 u = \frac{1}{k' \operatorname{tn} u}, \\ \operatorname{am}_1 u = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arc tang} (k' \operatorname{tn} u). \end{cases}$$

$$(42) \quad \frac{\operatorname{sn}_1 u \operatorname{cn}_1 u}{\operatorname{dn}_1 u} = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u}{\operatorname{dn} u}, \quad \operatorname{dn}_1 u \operatorname{tn}_1 u = \frac{1}{\operatorname{dn} u \operatorname{tn} u}.$$

$$(43) \begin{cases} \operatorname{sn}_1(-u) = \operatorname{sn}_1 u, \\ \operatorname{cn}_1(-u) = -\operatorname{cn}_1 u, \\ \operatorname{dn}_1(-u) = \operatorname{dn}_1 u, \\ \operatorname{tn}_1(-u) = -\operatorname{tn}_1 u. \end{cases} \quad (44) \begin{cases} \operatorname{sn}_1 0 = \operatorname{sn} K = 1, \\ \operatorname{cn}_1 0 = \operatorname{cn} K = 0, \\ \operatorname{dn}_1 0 = \operatorname{dn} K = k', \\ \operatorname{tn}_1 0 = \operatorname{tn} K = \infty. \end{cases}$$

$$(45) \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } u = a + K, \\ \operatorname{sn} u = \operatorname{sn} a, \\ \operatorname{cn} u = -\operatorname{cn} a, \\ \operatorname{dn} u = \operatorname{dn} a, \\ \operatorname{tn} u = -\operatorname{tn} a, \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} a + iK', \\ \frac{1}{k' \operatorname{sn} a}, \\ -\frac{i \operatorname{dn} a}{k' \operatorname{sn} a} = -\frac{ik'}{k \operatorname{cn} a}, \\ -\frac{i}{\operatorname{tn} a}, \\ \frac{i}{\operatorname{dn} a}, \end{array} \quad \begin{array}{l} a + K + iK', \\ \frac{1}{k' \operatorname{sn} a}, \\ -\frac{i \operatorname{dn}_1 a}{k \operatorname{sn}_1 a} = -\frac{ik'}{k \operatorname{cn} a}, \\ \frac{i}{\operatorname{tn}_1 a} = ik' \operatorname{tn} a, \\ \frac{i}{\operatorname{dn}_1 a} = \frac{i \operatorname{dn} a}{k'}. \end{array}$$

## § X.

Désignons par un accent supérieur les fonctions elliptiques relatives au module complémentaire  $k'$ , et posons

$$(46) \begin{cases} \operatorname{am}' u = \operatorname{am}(u, k'), \\ \operatorname{sn}' u = \operatorname{sn}(u, k'), \\ \operatorname{cn}' u = \operatorname{cn}(u, k'), \\ \operatorname{dn}' u = \operatorname{dn}(u, k'), \\ \operatorname{tn}' u = \operatorname{tn}(u, k'). \end{cases} \quad (47) \begin{cases} \operatorname{am}'_1 u = \operatorname{am}(K' - u, k'), \\ \operatorname{sn}'_1 u = \operatorname{sn}(K' - u, k'), \\ \operatorname{cn}'_1 u = \operatorname{cn}(K' - u, k'), \\ \operatorname{dn}'_1 u = \operatorname{dn}(K' - u, k'), \\ \operatorname{tn}'_1 u = \operatorname{tn}(K' - u, k'). \end{cases}$$

On a

$$(48) \begin{cases} \operatorname{sn}(ui) = i \operatorname{tn}' u, \\ \operatorname{cn}(ui) = \frac{1}{\operatorname{cn}' u}, \\ \operatorname{dn}(ui) = \frac{\operatorname{dn}' u}{\operatorname{cn}' u} = \frac{1}{\operatorname{sn}'_1 u}, \\ \operatorname{tn}(ui) = i \operatorname{sn}' u. \end{cases} \quad (49) \begin{cases} \operatorname{sn} u = \frac{\operatorname{tn}'(ui)}{i}, \\ \operatorname{cn} u = \frac{1}{\operatorname{cn}'(ui)}, \\ \operatorname{dn} u = \frac{\operatorname{dn}'(ui)}{\operatorname{cn}'(ui)} = \frac{i}{\operatorname{sn}'_1(ui)}, \\ \operatorname{tn} u = \frac{\operatorname{sn}'(ui)}{i}. \end{cases}$$

$$(50) \begin{cases} \operatorname{sn}_1(ui) = \frac{1}{\operatorname{dn}' u} = \frac{\operatorname{dn}'_1 u}{k}, \\ \operatorname{cn}_1(ui) = \frac{ik' \operatorname{sn}' u}{\operatorname{dn}' u} = \frac{ik'}{k} \operatorname{cn}'_1 u, \\ \operatorname{dn}_1(ui) = \frac{k' \operatorname{cn}' u}{\operatorname{dn}' u} = k' \operatorname{sn}'_1 u, \\ \operatorname{tn}_1(ui) = \frac{1}{ik' \operatorname{sn}' u} = \frac{1}{ik'} \frac{\operatorname{dn}'_1 u}{\operatorname{cn}'_1 u}. \end{cases} \quad (51) \begin{cases} \operatorname{sn}_1 u = \frac{1}{\operatorname{dn}'(ui)} = \frac{\operatorname{dn}'_1(ui)}{k}, \\ \operatorname{cn}_1 u = \frac{k'}{ik'} \operatorname{cn}'_1(ui), \\ \operatorname{dn}_1 u = k' \operatorname{sn}'_1(ui), \\ \operatorname{tn}_1 u = \frac{i}{k' \operatorname{sn}'(ui)}. \end{cases}$$

§ XI.

Expression des fonctions elliptiques au moyen des fonctions  $\wp$ .

Posons

$$(52) \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{2K} u, & \rho = \frac{\pi}{2K} K', & q = e^{-2\rho} = e^{-\frac{\pi K'}{K}}, \\ x' = \frac{\pi}{2K'} u, & \rho' = \frac{\pi}{2K'} K, & q' = e^{-2\rho'} = e^{-\frac{\pi K}{K'}}. \end{cases}$$

On aura

$$(53) \quad \wp_0 = \sqrt{\frac{2k'K}{\pi}}, \quad \wp_{2,0} = \sqrt{\frac{2kK}{\pi}}, \quad \wp_{3,0} = \sqrt{\frac{2K}{\pi}}.$$

$$(54) \quad k = \left(\frac{\wp_{2,0}}{\wp_{3,0}}\right)^2, \quad k' = \left(\frac{\wp_0}{\wp_{3,0}}\right)^2.$$

$$(55) \quad K = \frac{\pi}{2} (\wp_{3,0})^2, \quad K' = \frac{\pi}{2} [\wp_0(\wp_0, q')]^2.$$

$$(56) \quad \begin{cases} \operatorname{sn} u = \frac{1}{\sqrt{k}} \cdot \frac{\wp_1 x}{\wp_3 x}, \\ \operatorname{cn} u = \sqrt{\frac{k'}{k}} \cdot \frac{\wp_2 x}{\wp_3 x}, \\ \operatorname{dn} u = \sqrt{k'} \cdot \frac{\wp_3 x}{\wp_3 x}, \\ \operatorname{tn} u = \frac{1}{\sqrt{k'}} \cdot \frac{\wp_1 x}{\wp_2 x}. \end{cases} \quad (57) (*) \quad \begin{cases} \operatorname{sn}_1 u = \frac{1}{\sqrt{k}} \cdot \frac{\wp_1 x}{\wp_2 x}, \\ \operatorname{cn}_1 u = \sqrt{\frac{k'}{k}} \cdot \frac{\wp_1 x}{\wp_2 x}, \\ \operatorname{dn}_1 u = \sqrt{k'} \cdot \frac{\wp_3 x}{\wp_2 x}, \\ \operatorname{tn}_1 u = \frac{1}{\sqrt{k'}} \cdot \frac{\wp_2 x}{\wp_1 x}. \end{cases}$$

§ XII.

$$(58) \quad \begin{cases} \operatorname{am} u = x + \frac{\sin 2x}{\operatorname{Ch} 2\rho} + \frac{1}{2} \frac{\sin 4x}{\operatorname{Ch} 4\rho} + \frac{1}{3} \frac{\sin 6x}{\operatorname{Ch} 6\rho} + \dots, \\ \frac{2kK}{\pi} \operatorname{sn} u = 2 \left( \frac{\sin x}{\operatorname{Sh} \rho} + \frac{\sin 3x}{\operatorname{Sh} 3\rho} + \frac{\sin 5x}{\operatorname{Sh} 5\rho} + \dots \right), \\ \frac{2k'K}{\pi} \operatorname{cn} u = 2 \left( \frac{\cos x}{\operatorname{Ch} \rho} + \frac{\cos 3x}{\operatorname{Ch} 3\rho} + \frac{\cos 5x}{\operatorname{Ch} 5\rho} + \dots \right), \\ \frac{2K}{\pi} \operatorname{dn} u = 1 + 2 \left( \frac{\cos 2x}{\operatorname{Ch} 2\rho} + \frac{\cos 4x}{\operatorname{Ch} 4\rho} + \frac{\cos 6x}{\operatorname{Ch} 6\rho} + \dots \right), \\ \frac{2k'K}{\pi} \operatorname{tn} u = \operatorname{tang} x - 2q \frac{\sin 2x}{\operatorname{Ch} 2\rho} + 2q^2 \frac{\sin 4x}{\operatorname{Ch} 4\rho} - 2q^3 \frac{\sin 6x}{\operatorname{Ch} 6\rho} + \dots, \\ \frac{2kK}{\pi} \operatorname{sn}_1 u = 2 \left( \frac{\cos x}{\operatorname{Sh} \rho} - \frac{\cos 3x}{\operatorname{Sh} 3\rho} + \frac{\cos 5x}{\operatorname{Sh} 5\rho} - + \dots \right), \\ \frac{2k'K}{\pi} \operatorname{cn}_1 u = 2 \left( \frac{\sin x}{\operatorname{Ch} \rho} - \frac{\sin 3x}{\operatorname{Ch} 3\rho} + \frac{\sin 5x}{\operatorname{Ch} 5\rho} - + \dots \right), \end{cases}$$

(\*)  $u$  se changeant en  $K - u$ ,  $x$  se change en  $\frac{\pi}{2} - x$ .

$$\begin{aligned}
 (58) \quad & \frac{2K}{\pi} \operatorname{dn} u = \frac{2k'K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{dn} u} = 1 - 2 \frac{\cos 2x}{\operatorname{Ch} 2\rho} + 2 \frac{\cos 4x}{\operatorname{Ch} 4\rho} - 2 \frac{\cos 6x}{\operatorname{Ch} 6\rho} + \dots, \\
 \text{suite.} \quad & \frac{2k'K}{\pi} \operatorname{tn} u = \frac{2K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{tn} u} = \cot x - 2q \frac{\sin 2x}{\operatorname{Ch} 2\rho} - 2q^3 \frac{\sin 4x}{\operatorname{Ch} 4\rho} - 2q^5 \frac{\sin 6x}{\operatorname{Ch} 6\rho} - \dots, \\
 & \frac{2K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{sn} u} = \frac{1}{\sin x} + 2q^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{\operatorname{Sh} \rho} + 2q^{\frac{3}{2}} \frac{\sin 3x}{\operatorname{Sh} 3\rho} + 2q^{\frac{5}{2}} \frac{\sin 5x}{\operatorname{Sh} 5\rho} + \dots, \\
 & \frac{2k'K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{cn} u} = \frac{1}{\cos x} - 2q^{\frac{1}{2}} \frac{\cos x}{\operatorname{Ch} \rho} + 2q^{\frac{3}{2}} \frac{\cos 3x}{\operatorname{Ch} 3\rho} - 2q^{\frac{5}{2}} \frac{\cos 5x}{\operatorname{Ch} 5\rho} + \dots, \\
 & \frac{2K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{sn}_1 u} = \frac{1}{\cos x} + 2q^{\frac{1}{2}} \frac{\cos x}{\operatorname{Sh} \rho} - 2q^{\frac{3}{2}} \frac{\cos 3x}{\operatorname{Sh} 3\rho} + 2q^{\frac{5}{2}} \frac{\cos 5x}{\operatorname{Sh} 5\rho} - \dots, \\
 & \frac{2k'K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{cn}_1 u} = \frac{1}{\sin x} - 2q^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{\operatorname{Ch} \rho} - 2q^{\frac{3}{2}} \frac{\sin 3x}{\operatorname{Ch} 3\rho} - 2q^{\frac{5}{2}} \frac{\sin 5x}{\operatorname{Ch} 5\rho} - \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (59) \quad & \operatorname{am} u = \frac{\pi}{2} - 2 \operatorname{arctange} e^{-x} + 2q^{\frac{1}{2}} \frac{\operatorname{Sh} x'}{\operatorname{Sh} \rho'} - \frac{2q^{\frac{3}{2}} \operatorname{Sh} 3x'}{3 \operatorname{Sh} 3\rho'} + \frac{2q^{\frac{5}{2}} \operatorname{Sh} 5x'}{5 \operatorname{Sh} 5\rho'} - \dots, \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \operatorname{sn} u = \operatorname{Th} x' - 2q' \frac{\operatorname{Sh} 2x'}{\operatorname{Sh} 2\rho'} + 2q'^2 \frac{\operatorname{Sh} 4x'}{\operatorname{Sh} 4\rho'} - 2q'^3 \frac{\operatorname{Sh} 6x'}{\operatorname{Sh} 6\rho'} + \dots, \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \operatorname{cn} u = \frac{1}{\operatorname{Ch} x'} - 2q'^{\frac{1}{2}} \frac{\operatorname{Ch} x'}{\operatorname{Ch} \rho'} + 2q'^{\frac{3}{2}} \frac{\operatorname{Ch} 3x'}{\operatorname{Ch} 3\rho'} - 2q'^{\frac{5}{2}} \frac{\operatorname{Ch} 5x'}{\operatorname{Ch} 5\rho'} + \dots, \\
 & \frac{2K'}{\pi} \operatorname{dn} u = \frac{1}{\operatorname{Ch} x'} + 2q'^{\frac{1}{2}} \frac{\operatorname{Ch} x'}{\operatorname{Sh} \rho'} - 2q'^{\frac{3}{2}} \frac{\operatorname{Ch} 3x'}{\operatorname{Sh} 3\rho'} + 2q'^{\frac{5}{2}} \frac{\operatorname{Ch} 5x'}{\operatorname{Sh} 5\rho'} - \dots, \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \operatorname{tn} u = 2 \left( \frac{\operatorname{Sh} x'}{\operatorname{Sh} \rho'} + \frac{\operatorname{Sh} 3x'}{\operatorname{Sh} 3\rho'} + \frac{\operatorname{Sh} 5x'}{\operatorname{Sh} 5\rho'} + \dots \right), \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \operatorname{sn}_1 u = 1 - 2 \frac{\operatorname{Ch} 2x'}{\operatorname{Ch} 2\rho'} + 2 \frac{\operatorname{Ch} 4x'}{\operatorname{Ch} 4\rho'} - 2 \frac{\operatorname{Ch} 6x'}{\operatorname{Ch} 6\rho'} + \dots, \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \operatorname{cn}_1 u = 2 \left( \frac{\operatorname{Sh} x'}{\operatorname{Ch} \rho'} - \frac{\operatorname{Sh} 3x'}{\operatorname{Ch} 3\rho'} + \frac{\operatorname{Sh} 5x'}{\operatorname{Ch} 5\rho'} - \dots \right), \\
 & \frac{2K'}{\pi} \operatorname{dn}_1 u = \frac{2k'K'}{\pi} \frac{1}{\operatorname{dn} u} = 2 \left( \frac{\operatorname{Ch} x'}{\operatorname{Sh} \rho'} - \frac{\operatorname{Ch} 3x'}{\operatorname{Sh} 3\rho'} + \frac{\operatorname{Ch} 5x'}{\operatorname{Sh} 5\rho'} - \dots \right), \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \operatorname{tn}_1 u = \frac{1}{\operatorname{Sh} x'} - 2q'^{\frac{1}{2}} \frac{\operatorname{Sh} x'}{\operatorname{Sh} \rho'} - 2q'^{\frac{3}{2}} \frac{\operatorname{Sh} 3x'}{\operatorname{Sh} 3\rho'} - 2q'^{\frac{5}{2}} \frac{\operatorname{Sh} 5x'}{\operatorname{Sh} 5\rho'} - \dots, \\
 & \frac{2K'}{\pi} \frac{1}{\operatorname{sn} u} = \frac{1}{\operatorname{Th} x'} + 2q' \frac{\operatorname{Sh} 2x'}{\operatorname{Ch} 2\rho'} + 2q'^2 \frac{\operatorname{Sh} 4x'}{\operatorname{Ch} 4\rho'} + 2q'^3 \frac{\operatorname{Sh} 6x'}{\operatorname{Ch} 6\rho'} + \dots, \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \frac{1}{\operatorname{cn} u} = 2 \left( \frac{\operatorname{Ch} x'}{\operatorname{Ch} \rho'} + \frac{\operatorname{Ch} 3x'}{\operatorname{Ch} 3\rho'} + \frac{\operatorname{Ch} 5x'}{\operatorname{Ch} 5\rho'} + \dots \right), \\
 & \frac{2K'}{\pi} \frac{1}{\operatorname{sn}_1 u} = 1 + 2 \left( \frac{\operatorname{Ch} 2x'}{\operatorname{Ch} 2\rho'} + \frac{\operatorname{Ch} 4x'}{\operatorname{Ch} 4\rho'} + \frac{\operatorname{Ch} 6x'}{\operatorname{Ch} 6\rho'} + \dots \right), \\
 & \frac{2k'K'}{\pi} \frac{1}{\operatorname{cn}_1 u} = \frac{1}{\operatorname{Sh} x'} + 2q'^{\frac{1}{2}} \frac{\operatorname{Sh} x'}{\operatorname{Ch} \rho'} + 2q'^{\frac{3}{2}} \frac{\operatorname{Sh} 3x'}{\operatorname{Ch} 3\rho'} + 2q'^{\frac{5}{2}} \frac{\operatorname{Sh} 5x'}{\operatorname{Ch} 5\rho'} + \dots
 \end{aligned}$$

$$(60) \quad \tan \frac{1}{2} (\operatorname{am} u - x) = \frac{2q^2 \operatorname{Sh} 2\rho \sin 2x - 2q^4 \operatorname{Sh} 4\rho \sin 4x + 2q^{12} \operatorname{Sh} 6\rho \sin 6x - \dots}{1 - 2q^2 \operatorname{Ch} 2\rho \cos 2x + 2q^4 \operatorname{Ch} 4\rho \cos 4x - 2q^{12} \operatorname{Ch} 6\rho \cos 6x + \dots}$$

## § XIII.

Calcul numérique des intégrales elliptiques de première espèce.

$$(61) \quad \Delta \varphi = \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = k' \sqrt{1 + \frac{k^2}{k'^2} \cos^2 \varphi} = \cos \varphi \sqrt{1 + k'^2 \tan^2 \varphi}.$$



1°  $k$  voisin de zéro.

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{G} &= \frac{1}{2} \frac{1 - \sqrt{k'}}{1 + \sqrt{k'}}, & \frac{\Delta\varphi}{\sqrt{k'}} &= \frac{1 + \xi}{1 - \xi}, & \xi &= \frac{\Delta\varphi - \sqrt{k'}}{\Delta\varphi + \sqrt{k'}}, \\
 q &= \mathfrak{G} + 2\mathfrak{G}^2 + 15\mathfrak{G}^3 + 150\mathfrak{G}^4 + \dots = \frac{k^2}{16} + \frac{k^4}{32} + \frac{21k^6}{1024} + \dots, \\
 \frac{2K}{\pi} &= (\mathfrak{S}_2 0)^2 = (1 + 2\mathfrak{G})^2 (1 + 4\mathfrak{G}^2 + 36\mathfrak{G}^4 + \dots), \\
 (62) \quad \rho &= \frac{1}{2} \log \text{nat} \frac{1}{q}, & K' &= \frac{2K}{\pi} \rho = \rho(1 + 2\mathfrak{G})^2 (1 + 4\mathfrak{G}^2 + \dots) = \rho(1 + 4q + \dots), \\
 \cos 2x &= \frac{\xi}{2\mathfrak{G}} [1 - 4\mathfrak{G}^2 (1 + 5\mathfrak{G}^2) \sin^2 2x].
 \end{aligned}$$

En résolvant cette équation (par approximations successives, lorsque  $\mathfrak{G}^2$  n'est pas négligeable), on a

$$F(\varphi) = \frac{K}{\pi} \cdot 2x.$$

2°  $k$  voisin de l'unité.

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{G}' &= \frac{1}{2} \frac{1 - \sqrt{k}}{1 + \sqrt{k}}, & \frac{\Delta\varphi}{\sqrt{k} \cdot \cos\varphi} &= \frac{1}{\sqrt{k}} \sqrt{1 + k'^2 \tan^2 \varphi} = \frac{1 + \xi'}{1 - \xi'}, & \xi' &= \frac{\Delta\varphi - \sqrt{k} \cdot \cos\varphi}{\Delta\varphi + \sqrt{k} \cdot \cos\varphi}, \\
 q' &= \mathfrak{G}' + 2\mathfrak{G}'^2 + 15\mathfrak{G}'^3 + \dots = \frac{k'^2}{16} + \frac{k'^4}{32} + \frac{21k'^6}{1024} + \dots, \\
 \frac{2K'}{\pi} &= [\mathfrak{S}_2(0, q')]^2 = (1 + 2\mathfrak{G}')^2 (1 + 4\mathfrak{G}'^2 + \dots), \\
 (63) \quad \rho' &= \frac{1}{2} \log \text{nat} \frac{1}{q'}, & K &= \frac{2K'}{\pi} \rho' = \rho'(1 + 2\mathfrak{G}')^2 (1 + 4\mathfrak{G}'^2 + \dots) = \rho'(1 + 4q' + \dots), \\
 \text{Ch } 2x' &= \frac{\xi'}{2\mathfrak{G}'} [1 + 4\mathfrak{G}'^2 (1 + 5\mathfrak{G}'^2) \text{Sh}^2 2x'].
 \end{aligned}$$

En résolvant cette équation (par approximations successives, lorsque  $\mathfrak{G}'^2$  n'est pas négligeable), on a

$$F(\varphi) = \frac{K'}{\pi} \cdot 2x'.$$

#### § XIV.

##### Intégrales elliptiques de seconde espèce.

$$(64) \quad \left\{ \begin{aligned} \text{el } \alpha &= E(\varphi) = \int_0^\alpha \text{dn}^2 u \cdot du = \int_0^\varphi \Delta\varphi \cdot d\varphi \quad (*), \\ E &= \text{el } K = E\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^K \text{dn}^2 u \cdot du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \Delta\varphi \cdot d\varphi \quad (**). \end{aligned} \right.$$

Si le module est représenté par un autre signe que la lettre  $k$ , on le met en

(\*) =  $E(u)$  (JACOBI).

(\*\*) =  $E'(k) = E'$  (LEGENDRE).

$$(65) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{el}(u, \lambda) = E(\varphi, \lambda) = \int_0^\varphi \Delta(\varphi, \lambda) \cdot d\varphi, \\ E(\lambda) = E\left(\frac{\pi}{2}, \lambda\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \Delta(\varphi, \lambda) \cdot d\varphi. \end{array} \right.$$

Pour le module complémentaire  $k'$ ,

$$(66) \quad E' = \text{el}(K', k') = E\left(\frac{\pi}{2}, k'\right) = \int_0^{K'} \text{dn}^2 u \cdot du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \Delta(\varphi, k') \cdot d\varphi.$$

$$(67) \quad \text{el}(-u) = -\text{el} u, \quad \text{el}(0) = 0.$$

$$(68) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } k = 0, \quad \text{el} u = u. \\ \text{Pour } k = 1, \quad \text{el} u = \sin u. \end{array} \right.$$

$$(69) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{E}{K} = 2 \left(\frac{\pi}{2K}\right)^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\text{Ch}^2 2\rho} + \frac{1}{\text{Ch}^2 4\rho} + \frac{1}{\text{Ch}^2 6\rho} + \dots\right) \\ = \frac{1+k'^2}{2} - 4 \left(\frac{\pi}{2K}\right)^2 \left(\frac{1}{\text{Sh}^2 2\rho} + \frac{1}{\text{Sh}^2 6\rho} + \frac{1}{\text{Sh}^2 10\rho} + \dots\right). \end{array} \right.$$

$$(70) \quad \frac{E}{K} + \frac{E'}{K'} = 1 + \frac{\pi}{2KK'}.$$

$$(71) \quad \text{el} u = \frac{E}{K} u + \frac{\pi}{2K} \cdot D_x \log \wp x \text{ (*)}.$$

$$(72) \quad \text{el}(u + v) = \text{el} u + \text{el} v - k^2 \text{sn} u \text{sn} v \text{sn}(u + v).$$

$$(73) \quad \text{el}_1 u = \text{el}(K - u) = E - \text{el} u + k^2 \text{sn} u \text{sn} u.$$

$$(74) \quad \text{el}(u + 2mK + 2niK') = \text{el} u + 2mE + 2ni(K' - E').$$

$$(75) \quad \frac{1}{i} \text{el}(ui) + \text{el}(u, k') = u + \frac{\text{tn}' u}{\text{dn}' u}.$$

$$(76) \quad \left\{ \begin{array}{l} k^2 \int_0^u \text{sn}^2 u \cdot du = k^2 \int_0^\varphi \frac{\sin^2 \varphi}{\Delta \varphi} d\varphi = u - \text{el} u, \\ k^2 \int_0^u \text{cn}^2 u \cdot du = k^2 \int_0^\varphi \frac{\cos^2 \varphi}{\Delta \varphi} d\varphi = \text{el} u - k^2 u. \end{array} \right.$$

(\*)  $\frac{\pi}{2K} D_x \log \wp x = D_u \log \Theta(u) = Z(u)$  (JACOBI).



§ XV.

Développements en séries des intégrales de première et de seconde espèce.

Soient, pour  $p$  entier,  $p! = 1.2.3\dots p$ ,

$$[n]_p = \frac{n(n+1)\dots(n+p-1)}{1.2\dots p}, \quad (n)_p = \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{1.2\dots p},$$

d'où

$$\left[ \frac{1}{2} \right]_p = \frac{1.3.5\dots(2p-1)}{2.4.6\dots 2p}, \quad \left( \frac{1}{2} \right)_p = \frac{(-1)^{p-1}}{2p-1} \left[ \frac{1}{2} \right]_p,$$

$$\frac{(n+p)_p}{(n+2p)_p} = \frac{[(n+p)!]^2}{n!(n+2p)!} = \frac{(n+1)(n+2)\dots(n+p)}{(n+p+1)(n+p+2)\dots(n+2p)},$$

(78)  $k = \sin \theta, \quad x = \frac{1-k'}{1+k'} = \operatorname{tang}^2 \frac{\theta}{2}.$

On a

(79) 
$$\left\{ \begin{aligned} \frac{2K}{\pi} &= 1 + \left[ \frac{1}{2} \right]_1 k^2 + \left[ \frac{1}{2} \right]_2 k^4 + \left[ \frac{1}{2} \right]_3 k^6 + \dots \\ &= \frac{2}{1+k'} \left\{ 1 + \left[ \frac{1}{2} \right]_1 x^2 + \left[ \frac{1}{2} \right]_2 x^4 + \left[ \frac{1}{2} \right]_3 x^6 + \dots \right\}, \\ \frac{2E}{\pi} &= 1 - \left[ \frac{1}{2} \right]_1 \frac{k^2}{1} - \left[ \frac{1}{2} \right]_2 \frac{k^4}{3} - \left[ \frac{1}{2} \right]_3 \frac{k^6}{5} - \dots \\ &= \frac{1+k'}{2} \left\{ 1 + \left[ \frac{1}{2} \right]_1 \frac{x^2}{1^2} + \left[ \frac{1}{2} \right]_2 \frac{x^4}{3^2} + \left[ \frac{1}{2} \right]_3 \frac{x^6}{5^2} + \dots \right\}. \end{aligned} \right.$$

(80) 
$$\left\{ \begin{aligned} F(\varphi) &= \frac{2K}{\pi} \varphi + A_1 \sin 2\varphi + A_3 \sin 4\varphi + A_5 \sin 6\varphi + \dots, \\ E(\varphi) &= \frac{2E}{\pi} \varphi + B_1 \sin 2\varphi + B_3 \sin 4\varphi + B_5 \sin 6\varphi + \dots, \\ A_p &= \frac{(-1)^p}{p} \cdot \sum_{n=0}^{n=\infty} \frac{(n+p)_p}{(n+2p)_p} \left[ \frac{1}{2} \right]_{n+p}^2 k^{2n+2p} \\ &= \frac{(-1)^p}{p} \cdot \frac{2}{1+k'} \cdot \sum_{n=0}^{n=\infty} \left[ \frac{1}{2} \right]_n \left[ \frac{1}{2} \right]_{n+p} x^{2n+p}, \\ B_p &= \frac{(-1)^{p-1}}{p} \cdot \sum_{n=0}^{n=\infty} \frac{(n+p)_p}{(n+2p)_p} \left[ \frac{1}{2} \right]_{n+p}^2 \frac{k^{2n+2p}}{2n+2p-1} \\ &= \frac{1}{p} \cdot \frac{1+k'}{2} \cdot \sum_{n=0}^{n=\infty} \left( \frac{1}{2} \right)_n \left( \frac{1}{2} \right)_{n+p} x^{2n+p}. \end{aligned} \right.$$



§ XVI.

$$(81) \left\{ \begin{array}{l} a_0 = \frac{2K}{\pi} - 1, \quad a_1 = a_0 - \left[ \frac{1}{2} \right]_1^2 k^2, \quad a_2 = a_1 - \left[ \frac{1}{2} \right]_2^2 k^4, \\ \quad \quad \quad a_3 = a_2 - \left[ \frac{1}{2} \right]_3^2 k^6, \dots; \\ b_0 = 1 - \frac{2E}{\pi}, \quad b_1 = b_0 - \left[ \frac{1}{2} \right]_1^2 \frac{k^2}{1}, \quad b_2 = b_1 - \left[ \frac{1}{2} \right]_2^2 \frac{k^4}{3}, \\ \quad \quad \quad b_3 = b_2 - \left[ \frac{1}{2} \right]_3^2 \frac{k^6}{5}, \dots \end{array} \right.$$

1°  $k$  voisin de zéro. — On calcule  $K$  et  $E$  par les formules (79).

$$(82) \left\{ \begin{array}{l} K' = \frac{2K}{\pi} \log \left( \frac{4}{k} \right) - 2 \left( \frac{a_0}{1.2} + \frac{a_1}{3.4} + \frac{a_2}{5.6} + \dots \right), \\ E' = \frac{2(K-E)}{\pi} \log \left( \frac{4}{k} \right) + 1 - 2 \left( \frac{b_0}{1.2} + \frac{b_1}{3.4} + \frac{b_2}{5.6} + \dots \right). \end{array} \right.$$

Pour  $\varphi$  voisin de zéro,

$$(83) \left\{ \begin{array}{l} F(\varphi) = \frac{2K}{\pi} \varphi - \sin \varphi \cos \varphi \left( a_0 + \frac{2}{3} a_1 \sin^2 \varphi + \frac{2.4}{3.5} a_2 \sin^4 \varphi + \dots \right), \\ E(\varphi) = \frac{2E}{\pi} \varphi + \sin \varphi \cos \varphi \left( b_0 + \frac{2}{3} b_1 \sin^2 \varphi + \frac{2.4}{3.5} b_2 \sin^4 \varphi + \dots \right). \end{array} \right.$$

Pour  $\varphi$  voisin de  $\frac{\pi}{2}$ , on calculera  $K - u$  au lieu de  $u$ , en remplaçant

$$\begin{array}{l} \sin \varphi = \operatorname{sn} u, \quad \cos \varphi = \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{tang} \varphi = \operatorname{tn} u \\ \text{par} \\ \sin \varphi_1 = \operatorname{sn}_1 u = \frac{\cos \varphi}{\Delta \varphi}, \quad \cos \varphi_1 = \operatorname{cn}_1 u = \frac{k' \sin \varphi}{\Delta \varphi}, \quad \operatorname{tang} \varphi_1 = \operatorname{tn}_1 u = \frac{\cot \varphi}{k'}. \end{array}$$

Ensuite on calculera  $e1(K - u) = E(\varphi_1)$ , et l'on en tirera

$$(84) \quad E(\varphi) = E - E(\varphi_1) + k^2 \sin \varphi \sin \varphi_1.$$

2°  $k$  voisin de l'unité. — En changeant  $k$  en  $k'$ ,  $a$  en  $a'$ ,  $b$  en  $b'$ , les formules (79), (81) et (82) donneront  $K'$ ,  $E'$ ,  $K$ ,  $E$ ; puis on aura, pour  $\varphi$  voisin de 0,

$$(85) \left\{ \begin{array}{l} F(\varphi) = \frac{2K'}{\pi} \log \operatorname{tang} \left( \frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \\ \quad - \frac{\operatorname{tang} \varphi}{\cos \varphi} \left( a'_0 - \frac{2}{3} a'_1 \operatorname{tang}^2 \varphi + \frac{2.4}{3.5} a'_2 \operatorname{tang}^4 \varphi - + \dots \right), \\ E(\varphi) = \frac{2E'}{\pi} \log \operatorname{tang} \left( \frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \\ \quad + \frac{\operatorname{tang} \varphi}{\cos \varphi} \left( b'_0 - \frac{2}{3} b'_1 \operatorname{tang}^2 \varphi + \frac{2.4}{3.5} b'_2 \operatorname{tang}^4 \varphi - + \dots \right). \end{array} \right.$$

Pour  $\varphi$  voisin de  $\frac{\pi}{2}$ , on agira comme dans le cas précédent.



## § XVII.

## Calcul des intégrales elliptiques au moyen de la transformation modulaire de Landen.

On calcule la suite des *nombre modulaires*

$$(86) \quad \begin{cases} m = 1, & m_1 = \frac{m+n}{2}, & m_2 = \frac{m_1+n_1}{2}, & m_3 = \frac{m_2+n_2}{2}, \dots, \\ n = k', & n_1 = \sqrt{mn}, & n_2 = \sqrt{m_1 n_1}, & n_3 = \sqrt{m_2 n_2}, \dots, \end{cases}$$

jusqu'à ce que l'on ait sensiblement

$$m_p = n_p,$$

et soit

$$(87) \quad \eta = \lim m_p = \lim n_p.$$

On aura d'abord

$$(88) \quad \begin{cases} K = \frac{\pi}{2\eta}, \\ q = \frac{k^2}{16k'} \left(\frac{n_1}{m_1}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{n_2}{m_2}\right)^{\frac{3}{4}} \left(\frac{n_3}{m_3}\right)^{\frac{3}{8}}, \dots, \\ K' = \frac{1}{2\eta \log \text{nat } q} = \frac{M}{2\eta \log \text{déc } q}. \end{cases} \quad (M = \text{mod. des log déc } q).$$

Soit maintenant

$$(89) \quad \begin{cases} \lambda = \frac{k}{4}, & \lambda_1 = \frac{\lambda^2}{m_1}, & \lambda_2 = \frac{\lambda_1^2}{m_2}, & \lambda_3 = \frac{\lambda_2^2}{m_3}, \dots, \\ \Delta = -\frac{1}{\eta} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2\varphi d\varphi}{\Delta\varphi} = \frac{1}{\lambda^2} (2\lambda_1^2 + 4\lambda_2^2 + 8\lambda_3^2 + \dots). \end{cases}$$

On a

$$(90) \quad \frac{E}{K} = \frac{1+k'^2}{2} - \frac{k^2}{2} \Delta.$$



## § XVIII.

Pour calculer l'intégrale de première espèce  $F(\varphi) = u$ , correspondante à une amplitude quelconque  $\varphi$ , soit

$$(91) \quad \begin{cases} \nabla = \sqrt{m^2 \cos^2 \varphi + n^2 \sin^2 \varphi}, \\ \nabla_1 = \sqrt{m_1^2 \cos^2 \varphi_1 + n_1^2 \sin^2 \varphi_1}, \\ \nabla_2 = \sqrt{m_2^2 \cos^2 \varphi_2 + n_2^2 \sin^2 \varphi_2}, \\ \text{etc.}, \end{cases}$$

$m, n, m_1, n_1, \dots$  étant les nombres modulaires du numéro précédent.

Posons, pour abrégier,

$$(92) \quad \frac{\nabla_p}{m_p} = \mu_p, \quad \frac{n_p}{\nabla_p} = \nu_p,$$

et calculons, à l'aide des logarithmes d'addition, la suite des nombres

$$(93) \quad \left\{ \begin{array}{l} \mu_1 = \sqrt{\frac{m\mu}{m_1}} \sqrt{\frac{1+\nu}{1+\mu}}, \quad \nu_1 = \sqrt{\frac{m\nu}{m_1}} \sqrt{\frac{1+\mu}{1+\nu}}, \\ \mu_2 = \sqrt{\frac{m_1\mu_1}{m_2}} \sqrt{\frac{1+\nu_1}{1+\mu_1}}, \quad \nu_2 = \sqrt{\frac{m_1\nu_1}{m_2}} \sqrt{\frac{1+\mu_1}{1+\nu_1}}, \\ \text{etc.,} \quad \text{etc.;} \end{array} \right.$$

à la limite on aura

$$(94) \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim \nabla_p = \lim m_p = \lim n_p = \eta, \\ \lim \mu_p = \lim \nu_p = 1. \end{array} \right.$$

Il viendra alors, en posant toujours  $\frac{\pi}{2K} u = \eta u = x$ ,

$$(95) \quad \text{tang } x = \text{tang } \eta u = \eta \cdot \mu_1 \mu_2 \mu_3 \dots \text{tang } \varphi.$$

Connaissant  $x$ , on aura

$$(96) \quad u = \frac{x}{\eta} = K \cdot \frac{2x}{\pi} = K \times \text{la valeur de } x \text{ en parties du quadrant.}$$

Les amplitudes successives  $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \dots$  sont liées par les équations

$$(97) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin \varphi_1 = 2 \frac{m_1}{m} \frac{\sin \varphi}{1+\mu}, \quad \cos \varphi_1 = \frac{2 \cos \varphi}{(1+\mu) \mu_1}, \quad \text{tang } \varphi_1 = \frac{m_1 \mu_1}{m} \text{tang } \varphi, \\ \sin \varphi_2 = 2 \frac{m_2}{m_1} \frac{\sin \varphi_1}{1+\mu_1}, \quad \cos \varphi_2 = \frac{2 \cos \varphi_1}{(1+\mu_1) \mu_2}, \quad \text{tang } \varphi_2 = \frac{m_2 \mu_2}{m_1} \text{tang } \varphi, \\ \text{etc.,} \quad \text{etc.,} \quad \text{etc.;} \end{array} \right.$$

d'où il résulte

$$(98) \quad \frac{d\varphi}{\nabla} = \frac{d\varphi_1}{\nabla_1} = \frac{d\varphi_2}{\nabla_2} = \dots$$

On trouve ensuite

$$(99) \quad \left\{ \begin{array}{l} E(\varphi) - \frac{E}{K} \cdot F(\varphi) = Z(u) \\ = 8 \left( \frac{\lambda^2}{m_1} \cos \varphi \sin \varphi_1 + \frac{2\lambda^2}{m_2} \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \frac{4\lambda^2}{m_3} \cos \varphi_2 \sin \varphi_3 + \dots \right) \\ \frac{\mathfrak{S}x}{\mathfrak{S}0} = \frac{\Theta(u)}{\Theta(0)} = \frac{2}{1+\mu} \left( \frac{2}{1+\mu_1} \right)^2 \left( \frac{2}{1+\mu_2} \right)^4 \left( \frac{2}{1+\mu_3} \right)^8 \dots \end{array} \right.$$



§ XIX.

Autrement, on détermine les amplitudes  $\varphi_0, \varphi_{00}, \varphi_{000}, \dots$  par les équations

$$(100) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{tang}(\varphi_0 - \varphi) = \frac{n}{m} \text{tang } \varphi, \\ \text{tang}(\varphi_{00} - \varphi_0) = \frac{n_1}{m_1} \text{tang } \varphi_0, \\ \text{tang}(\varphi_{000} - \varphi_{00}) = \frac{n_2}{m_2} \text{tang } \varphi_{00}, \\ \text{etc.} \end{array} \right.$$

Les angles  $\varphi, \frac{\varphi_0}{2}, \frac{\varphi_{00}}{4}, \frac{\varphi_{000}}{8}, \dots$  convergent vers la limite  $x = \eta u = \frac{\pi}{2K} F(\varphi)$ .

Ces angles satisfont à la relation

$$(101) \quad \frac{d\varphi}{\Delta\varphi} = \frac{1}{2} \frac{d\varphi_0}{\Delta\varphi_0} = \frac{1}{4} \frac{d\varphi_{00}}{\Delta\varphi_{00}} = \dots,$$

les modules qui entrent respectivement dans  $\Delta\varphi$ ,  $\Delta\varphi_0$ ,  $\Delta\varphi_{00}$ ,... étant donnés par les formules

$$(102) \quad k' = \frac{n}{m}, \quad k'_0 = \frac{n_1}{m_1}, \quad k'_{00} = \frac{n_2}{m_2}, \dots$$

On a ensuite

$$(103) \quad \begin{cases} Z(u) = 4(\lambda_1 \sin \varphi_0 + \lambda_2 \sin \varphi_{00} + \lambda_3 \sin \varphi_{000} + \dots), \\ \frac{\mathfrak{S}x}{\mathfrak{S}0} = \frac{\Theta(u)}{\Theta(0)} = \left(\frac{m}{\Delta\varphi}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{m_1}{\Delta\varphi_0}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{m_2}{\Delta\varphi_{00}}\right)^{\frac{1}{4}} \dots \\ \qquad \qquad \qquad = \sqrt[2]{\sec(2\varphi - \varphi_0)} \cdot \sqrt[4]{\sec(2\varphi_0 - \varphi_{00})} \cdot \sqrt[4]{\sec(2\varphi_{00} - \varphi_{000})} \dots \end{cases}$$

§ XX.

Intégrales elliptiques de troisième espèce. Paramètre =  $n$ .

$$(104) \quad \Pi(\varphi, n, k) = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{(1 + n \sin^2 \varphi) \cdot \Delta\varphi} = \int_0^u \frac{du}{1 + n \operatorname{sn}^2 u}.$$

$$(105) \quad \begin{cases} \int_0^u \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{1 + n \operatorname{sn}^2 u} = \frac{u}{n} - \frac{1}{n} \Pi(\varphi, n), \\ \int_0^u \frac{cn^2 u \, du}{1 + n \operatorname{sn}^2 u} = -\frac{u}{n} + \left(1 + \frac{1}{n}\right) \Pi(\varphi, n), \\ \int_0^u \frac{dn^2 u \, du}{1 + n \operatorname{sn}^2 u} = -\frac{k^2 u}{n} + \left(1 + \frac{k^2}{n}\right) \Pi(\varphi, n). \end{cases}$$

Considérons d'abord le cas du paramètre  $n$  réel.

- Quatre classes :
- 1°  $-\infty < n < -1$ ,
  - 2°  $-1 < n < -k^2$ ,
  - 3°  $-k^2 < n < 0$ ,
  - 4°  $0 < n < +\infty$ ,

1° et 3°, paramètre logarithmique; 2° et 4°, paramètre circulaire.

§ XXI.

$$1^\circ \quad -\infty < n < -1, \quad n = -\frac{1}{\operatorname{sn}^2 a}.$$

$$x = \frac{\pi}{2K} u, \quad a = \frac{\pi}{2K} a, \quad X = \frac{1}{2} \log \frac{\mathfrak{S}_1(x+a)}{\mathfrak{S}_1(x-a)},$$

$K - u = u_1, \quad K - a = a_1, \quad \text{d'où } \operatorname{sn} u_1 = \operatorname{sn} u, \text{ etc.}$

On peut toujours ramener l'argument  $a$  du paramètre à être  $< \frac{1}{2} K$ , et par suite  $\sigma$  à être  $< \frac{\pi}{4}$ , en prenant l'un ou l'autre des deux systèmes de formules

suyvants (A) ou (B) :

$$\begin{aligned}
 (106)(A) \quad & \left\{ \begin{aligned}
 \mathcal{C}(u, a) &= \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a \int_0^u \frac{du}{\operatorname{sn}^2 a - \operatorname{sn}^2 u} = \frac{\operatorname{dn} a}{\operatorname{tn} a} \Pi \left( \varphi, -\frac{1}{\operatorname{sn}^2 a} \right) \\
 &= -x \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_3 \alpha + X, \\
 \mathcal{S}(u, a) &= \frac{\operatorname{dn} a}{\operatorname{tn} a} \int_0^u \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}^2 a - \operatorname{sn}^2 u} = -x \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_1 \alpha + X, \\
 \mathcal{P}(u, a) &= \operatorname{tn} a \operatorname{dn} a \int_0^u \frac{\operatorname{cn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}^2 a - \operatorname{sn}^2 u} = -x \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_3 \alpha + X, \\
 \mathcal{D}(u, a) &= \frac{\operatorname{sn} a \operatorname{cn} a}{\operatorname{dn} a} \int_0^u \frac{\operatorname{dn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}^2 a - \operatorname{sn}^2 u} = -x \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_3 \alpha + X;
 \end{aligned} \right. \\
 (106)(B) \quad & \left\{ \begin{aligned}
 \mathcal{D}(u, a) &= \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a \int_u^K \frac{du}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 a} = \frac{\operatorname{sn}_1 a \operatorname{cn}_1 a}{\operatorname{dn}_1 a} \int_0^u \frac{\operatorname{dn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}_1^2 a - \operatorname{sn}_1^2 u} \\
 &= \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_3 \alpha + X, \\
 \mathcal{P}(u, a) &= \frac{\operatorname{dn} a}{\operatorname{tn} a} \int_u^K \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 a} = \operatorname{dn}_1 a \operatorname{tn}_1 a \int_0^u \frac{\operatorname{cn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}_1^2 a - \operatorname{sn}_1^2 u} \\
 &= \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_1 \alpha + X, \\
 \mathcal{S}(u, a) &= \operatorname{dn} a \operatorname{tn} a \int_u^K \frac{\operatorname{cn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 a} = \frac{\operatorname{dn}_1 a}{\operatorname{tn}_1 a} \int_0^u \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}_1^2 a - \operatorname{sn}_1^2 u} \\
 &= \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_3 \alpha + X, \\
 \mathcal{C}(u, a) &= \frac{\operatorname{sn} a \operatorname{cn} a}{\operatorname{dn} a} \int_u^K \frac{\operatorname{dn}^2 u \, du}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 a} = \operatorname{sn}_1 a \operatorname{cn}_1 a \operatorname{dn}_1 a \int_0^u \frac{du}{\operatorname{sn}_1^2 a - \operatorname{sn}_1^2 u} \\
 &= \frac{\operatorname{dn}_1 a}{\operatorname{tn}_1 a} \Pi \left( \operatorname{am}, u, -\frac{1}{\operatorname{sn}_1^2 a} \right) = \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \cdot D_\alpha \log \mathfrak{S}_3 \alpha + X.
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

## § XXII.

2

$$-1 < n < -k^2.$$

$$\begin{aligned}
 (107)(A) \quad & \left\{ \begin{aligned}
 \text{Pour} \quad & -1 < n < -k, \quad n = -\operatorname{dn}^2 a = -\frac{k^2}{\operatorname{dn}_1^2 a}, \\
 & \alpha_1 = \rho - \alpha, \quad X_1 = \frac{1}{2i} \log \frac{\mathfrak{S}_3(x - \alpha_1, i)}{\mathfrak{S}_3(x + \alpha_1, i)}, \\
 \mathcal{C}(u, a) &= \frac{k^2 \operatorname{sn}' a \operatorname{cn}' a}{\operatorname{dn}' a} \int_0^u \frac{du}{1 - \operatorname{dn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_{\alpha_1} \log \mathfrak{S}_3(\alpha_1, i) - X_1, \\
 \mathcal{S}(u, a) &= k^2 \operatorname{sn}' a \operatorname{cn}' a \operatorname{dn}' a \int_0^u \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{1 - \operatorname{dn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_{\alpha_1} \log \mathfrak{S}_3(\alpha_1, i) - X_1, \\
 \mathcal{P}(u, a) &= -\frac{\operatorname{dn}' a}{\operatorname{tn}' a} \int_0^u \frac{\operatorname{cn}^2 u \, du}{1 - \operatorname{dn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_{\alpha_1} \log \mathfrak{S}_3(\alpha_1, i) - X_1, \\
 \mathcal{D}(u, a) &= \operatorname{dn}' a \operatorname{tn}' a \int_0^u \frac{\operatorname{dn}^2 u \, du}{1 - \operatorname{dn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_{\alpha_1} \log \mathfrak{S}_3(\alpha_1, i) - X_1,
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & \text{Pour } -k < n < -k^2, \quad n = -\frac{k^2}{\operatorname{dn}'^2 a} = -\operatorname{dn}'^2 a, \\
 & \quad a' = K' - a, \quad X = \frac{1}{2i} \log \frac{\wp_3(x - ai)}{\wp_3(x + ai)}. \\
 (107) \text{ (B)} \quad & \mathcal{C}(u, a') = \frac{k^2 \operatorname{sn}' a \operatorname{cn}' a}{\operatorname{dn}' a} \int_0^u \frac{du}{1 - \operatorname{dn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp_2(\alpha i) - X, \\
 & \mathcal{S}(u, a') = k^2 \operatorname{sn}' a \operatorname{cn}' a \operatorname{dn}' a \int_0^u \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{1 - \operatorname{dn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp_3(\alpha i) - X, \\
 & \mathcal{P}(u, a') = -\frac{\operatorname{dn}' a}{\operatorname{tn}' u} \int_0^u \frac{\operatorname{cn}^2 u \, du}{1 - \operatorname{dn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp(\alpha i) - X, \\
 & \mathcal{D}(u, a') = \operatorname{dn}' a \operatorname{tn}' a \int_0^u \frac{\operatorname{dn}^2 u \, du}{1 - \operatorname{dn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp_1(\alpha i) - X
 \end{aligned}$$

Les formules (B) ne diffèrent des formules (A) que par le changement de  $a$  en  $a' = K' - a$ , et de  $\alpha$ , =  $\rho - \alpha$  en  $\alpha$ .

§ XXIII.

$$\begin{aligned}
 3^\circ \quad & -k^2 < n < 0, \quad n = -k^2 \operatorname{sn}^2 a, \quad X = \frac{1}{2} \log \frac{\wp(x + a)}{\wp(x - a)}. \\
 (108) \quad & \mathcal{P}(u, a) = \frac{\operatorname{dn} a}{\operatorname{tn} a} \int_0^u \frac{du}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp, \alpha - X, \\
 & \mathcal{S}(u, a) = k^2 \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a \int_0^u \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp \alpha - X (*), \\
 & \mathcal{C}(u, a) = \frac{k^2 \operatorname{sn} a \operatorname{cn} a}{\operatorname{dn} a} \int_0^u \frac{\operatorname{cn}^2 u \, du}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = -x \cdot D_\alpha \log \wp, \alpha + X, \\
 & \mathcal{D}(u, a) = \operatorname{dn} a \operatorname{tn} a \int_0^u \frac{\operatorname{dn}^2 u \, du}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u} = -x \cdot D_\alpha \log \wp, \alpha + X.
 \end{aligned}$$

§ XXIV.

$$\begin{aligned}
 4^\circ \quad & n > 0. \\
 & \text{Pour } 0 < n < k, \quad n = -k^2 \operatorname{sn}^2(ai) = k^2 \operatorname{tn}^2 a = \frac{1}{\operatorname{tn}'^2 a}, \\
 & \quad X = \frac{1}{2i} \log \frac{\wp(x + ai)}{\wp(x - ai)}. \\
 (109) \text{ (A)} \quad & \mathcal{P}(u, a) = \frac{\operatorname{dn}' a}{\operatorname{sn}' a \operatorname{cn}' a} \int_0^u \frac{du}{1 + k^2 \operatorname{tn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp_1(\alpha i) + X, \\
 & \mathcal{S}(u, a) = \frac{k^2 \operatorname{dn}' a \operatorname{tn}' a}{\operatorname{cn}'^2 a} \int_0^u \frac{\operatorname{sn}^2 u \, du}{1 + k^2 \operatorname{tn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = -x \cdot D_\alpha \log \wp(\alpha i) - X, \\
 & \mathcal{C}(u, a) = \frac{k^2 \operatorname{tn}' a}{\operatorname{dn}' a} \int_0^u \frac{\operatorname{cn}^2 u \, du}{1 + k^2 \operatorname{tn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp_3(\alpha i) + X, \\
 & \mathcal{D}(u, a) = \operatorname{dn}' a \operatorname{tn}' a \int_0^u \frac{\operatorname{dn}^2 u \, du}{1 + k^2 \operatorname{tn}'^2 a \operatorname{sn}^2 u} = x \cdot D_\alpha \log \wp_2(\alpha i) + X.
 \end{aligned}$$

(\*) =  $\Pi(u, a)$  (JACOBI).

(109) (B)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Pour } k < n < \infty, \quad n = -\frac{1}{\text{sn}^2(ai)} = \frac{1}{\text{tn}'a} = k^2 \text{tn}'^2 a, \\ \text{on changera partout, dans les formules (A), } a \text{ en } a'_1 = K' - a, \text{ et par} \\ \text{suite } \alpha \text{ en } \alpha_1 = p - \alpha. \end{array} \right.$

§ XXV.

(110)  $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{P}(u, a) - \mathfrak{S}(u, a) = \frac{dn a}{\text{tn} a} \cdot u, \quad \text{P}(u, a) + \text{S}(u, a) = \frac{dn' a}{\text{sn}' a \text{cn}' a} \cdot u, \\ \mathfrak{C}(u, a) + \mathfrak{S}(u, a) = k^2 \text{sn} a \text{sn}' a u, \quad \text{C}(u, a) + \text{S}(u, a) = \frac{k^2 \text{tn}' a}{dn' a} \cdot u, \\ \mathfrak{D}(u, a) + \mathfrak{S}(u, a) = dn a \text{tn} a u, \quad \text{D}(u, a) + \text{S}(u, a) = k'^2 \text{sn}' a \text{sn}' a u. \end{array} \right.$

(111)  $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{S}(u, ai) = i \cdot \text{S}(u, a), \\ \mathfrak{S}(ui, a) = i \cdot \text{S}(u, a), \end{array} \right\} \text{ pour P;}$   
 $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{S}(ui, a) = -i \cdot \text{S}(u, a, k'), \\ \mathfrak{S}(ui, a) = -i \cdot \text{S}(u, a, k'), \end{array} \right\} \text{ pour C et D;}$   
 $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{S}(u, a) = \mathfrak{S}(ui, ai, k'), \\ \text{S}(u, a) = \text{S}(ui, ai, k'), \end{array} \right\} \text{ pour P, C et D.}$

Pour avoir les formules analogues relatives aux autres intégrales P, C, D, changez les signes des seconds membres:

(112)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{S}(u, a) + \text{C}(u, a'_1) = \text{S}(K, a) = \text{C}(K, a'_1), \\ u_1 = K - u, \quad a'_1 = K' - a. \end{array} \right.$

(113)  $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{P}(u, K) = \mathfrak{S}(u, K) = \mathfrak{C}(u, K) = 0, \quad \mathfrak{D}(u, K) = \infty; \\ \text{P}(u, K') = \text{C}(u, K') = \text{D}(u, K') = \frac{\pi}{2}; \quad \text{S}(u, K') = \infty. \end{array} \right.$

(114)  $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{S}(K, a) = K \cdot \text{el} a - \text{E} \cdot a, \\ \text{S}(K, a) = (K - \text{E})a + K(\text{tn}' a \text{dn}' a - \text{el}' a). \end{array} \right.$

(115)  $\mathfrak{S}(a, u) - \mathfrak{S}(u, a) = a \cdot \text{el} u - u \cdot \text{el} a.$

§ XXVI.

Des intégrales de troisième espèce à paramètre imaginaires.

Soit le paramètre imaginaire  $n = \mu e^{\nu i}$ , et posons, pour abrégé,

(116)  $\left\{ \begin{array}{l} 2 \Pi_1 = \Pi(\varphi, \mu e^{\nu i}) + \Pi(\varphi, \mu e^{-\nu i}), \\ 2i \Pi_2 = \Pi(\varphi, \mu e^{\nu i}) - \Pi(\varphi, \mu e^{-\nu i}). \end{array} \right.$

$\Pi_1$ , et  $\Pi_2$ , seront donnés par les équations

(117)  $\left\{ \begin{array}{l} A_1 \Pi_1 + B_1 \Pi_2 = -\frac{1}{g_1} F(\varphi) - C_1 \Pi(\varphi, m_1) + \int_0^{\varphi} \frac{dz}{1 + h_1 z^2}, \\ A_2 \Pi_1 + B_2 \Pi_2 = -\frac{1}{g_2} F(\varphi) - C_2 \Pi(\varphi, m_2) + \int_0^{\varphi} \frac{dz}{1 + h_2 z^2}, \end{array} \right.$

$g_1$  et  $g_2$  étant les deux racines de l'équation

$$(118) \quad (\mu^2 + 2k^2\mu \cos \nu + k^2)g^2 + 2k^2\mu^2g = (\mu^2 + 2\mu \cos \nu + k^2)\mu^2,$$

et  $z_1, h_1, m_1, \dots, z_2, h_2, m_2, \dots$  étant les deux systèmes, correspondants à ces deux racines, des valeurs des quantités  $z, h, m, \dots$ , données par les équations

$$(119) \quad \left\{ \begin{aligned} z &= \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{(1 + g \sin^2 \varphi) \Delta \varphi}, \\ m &= -\frac{k^2}{\mu^2} g^2, \\ h &= -\frac{1}{k^2 k'^2} (k^2 + m) (k^4 + 2k^2\mu \cos \nu + \mu^2), \\ Cg(\mu^2 - 2m\mu \cos \nu + m^2) &= g[m^2 + (2 + g)m + (1 + 2m)k^2] - \mu^2, \\ A &= (1 - C)g - 1, \\ Bg\mu \sin \nu &= g^2 + (2 + \mu \cos \nu + m)g + \mu \cos \nu + Cg(\mu \cos \nu - m). \end{aligned} \right.$$

Les deux valeurs de  $g$  sont réelles et inégales tant que  $n = \mu e^{\nu i}$  est imaginaire. Soit  $g_1 < g_2$ . On a alors

$$-1 < m_1 < -k^2 < m_2 < 0, \quad h_1 > 0 > h_2.$$

Donc  $\Pi(\varphi, m_1)$  appartient à la 2<sup>e</sup> classe (P), et  $\Pi(\varphi, m_2)$  à la 3<sup>e</sup> classe (P). De plus,

$$(120) \quad \left\{ \begin{aligned} \int_0^{z_1} \frac{dz}{1 + h_1 z^2} &= \frac{1}{\sqrt{h_1}} \operatorname{arc tang} z_1 \sqrt{h_1} = \frac{1}{\sqrt{h_1}} \operatorname{arc tang} \frac{\sin \varphi \cos \varphi \cdot \sqrt{h_1}}{(1 + g_1 \sin^2 \varphi) \Delta \varphi}, \\ \int_0^{z_2} \frac{dz}{1 + h_2 z^2} &= \frac{1}{\sqrt{-h_2}} \operatorname{Arg Th} z_2 \sqrt{-h_2} = \frac{1}{\sqrt{-h_2}} \operatorname{Arg Th} \frac{\sin \varphi \cos \varphi \cdot \sqrt{-h_2}}{(1 + g_2 \sin^2 \varphi) \Delta \varphi} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{-h_2}} \log \frac{1 + z_2 \sqrt{-h_2}}{1 + z_2 \sqrt{-h_2}}. \end{aligned} \right.$$

Dans le cas particulier où  $\mu^2 + 2\mu \cos \nu + k^2 = 0$ , et par suite  $g_2 = 0$ , on a  $m_2 = 0, h_2 = -\mu^2$ , et la deuxième équation (117) se trouve remplacée par l'équation

$$(121) \quad A_2 \Pi_1 + B_2 \Pi_2 = -\frac{k^2}{\mu^2} F(\varphi) + \frac{1}{\mu} \operatorname{Arg Th} \frac{\mu \cos \varphi \sin \varphi}{\Delta \varphi}.$$

### § XXVII.

Réduction de la différentielle  $\frac{dy}{\sqrt{Ay^4 + By^3 + Cy^2 + Dy + E}}$  à la forme

$$\text{normale } \frac{1}{m} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} = \frac{1}{m} \frac{d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

Désignons par  $\pm R$  le polynôme en  $y$  sous le radical; on peut toujours supposer  $A = \pm 1$ . On distingue divers cas, selon la nature des racines de l'équation  $R=0$ .

#### I. Quatre racines réelles.

$$R = (y - a_1)(y - a_2)(y - a_3)(y - a_4), \quad (a_1 < a_2 < a_3 < a_4).$$

Poisons, pour abrégé,

$$a_{12} = a_2 - a_1, \quad a_{13} = a_3 - a_1, \quad a_{14} = a_4 - a_1, \text{ etc.}$$

On aura

$$\frac{dy}{\sqrt{\pm R}} = \frac{1}{m} \frac{d\varphi}{\Delta\varphi}.$$

$$1^{\circ} \text{ Signe supérieur : } \frac{dy}{\sqrt{+R}}.$$

(A). Transformation du premier ordre.

$$m' = \sqrt{a_{13}a_{24}}, \quad m'' = \sqrt{a_{12}a_{34}}, \quad m = \frac{m' + m''}{2}, \quad k = \frac{m' - m''}{m' + m''} (*).$$

$$(\alpha) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_4, \quad \pm \infty, \quad a_1 \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad 0, \quad +\frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$n' = \sqrt{a_{12}a_{13}}, \quad n'' = \sqrt{a_{21}a_{34}}, \quad n = \frac{n' + n''}{n' - n''},$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) = \frac{n'}{n''} \frac{y - a_4}{y - a_1}, \quad y = \frac{a_4 + a_1}{2} + \frac{a_4 - a_1}{2} \cdot \frac{n - \sin \varphi}{1 - n \sin \varphi}.$$

$$(\beta) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_2, \quad a_3 \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad +\frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$n' = \sqrt{a_{12}a_{21}}, \quad n'' = \sqrt{a_{13}a_{31}}, \quad n = \frac{n' - n''}{n' + n''},$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) = \frac{n''}{n'} \frac{y - a_2}{a_3 - y}, \quad y = \frac{a_3 + a_2}{2} + \frac{a_3 - a_2}{2} \cdot \frac{\sin \varphi - n}{1 - n \sin \varphi}.$$

(B). Transformation du second ordre.

$$m = \frac{1}{2} \sqrt{a_{13}a_{24}}, \quad k = \sqrt{\frac{a_{14}a_{23}}{a_{13}a_{24}}}, \quad k' = \sqrt{\frac{a_{12}a_{34}}{a_{13}a_{24}}}.$$

$$(\alpha) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_4, \quad \pm \infty, \quad a_1 \\ \varphi = 0, \quad \dots, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{a_{13}}{a_{14}} \cdot \frac{y - a_4}{y - a_3}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_{34}}{a_{14}} \cdot \frac{y - a_4}{y - a_3}, \quad y = \frac{a_4 a_{13} - a_3 a_{14} \sin^2 \varphi}{a_{13} - a_{14} \sin^2 \varphi}.$$

$$(\beta) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_2, \quad a_3 \\ \varphi = 0, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{a_{12}}{a_{23}} \cdot \frac{y - a_2}{y - a_1}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_{12}}{a_{23}} \cdot \frac{a_3 - y}{y - a_1}, \quad y = \frac{a_2 a_{12} - a_1 a_{23} \sin^2 \varphi}{a_{12} - a_{23} \sin^2 \varphi}.$$

---

(\*) On en tire  $\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) = \frac{m''}{m'}$ .

2° Signe inférieur :  $\frac{dy}{\sqrt{-R}}$ .

(A). Transformation du premier ordre.

$$m' = \sqrt{a_{13}a_{24}}, \quad m'' = \sqrt{a_{14}a_{23}}, \quad m = \frac{m' + m''}{2}, \quad k = \frac{m' - m''}{m' + m''}.$$

$$(\alpha) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_1, \quad a_2 \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad +\frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$n' = \sqrt{a_{13}a_{24}}, \quad n'' = \sqrt{a_{23}a_{34}}, \quad n = \frac{n'' - n'}{n'' + n'},$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) = \frac{n''}{n'} \cdot \frac{y - a_1}{a_2 - y}, \quad y = \frac{a_2 + a_1}{2} + \frac{a_2 - a_1}{2} \cdot \frac{\sin \varphi - n}{1 - n \sin \varphi}.$$

$$(\beta) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_3, \quad a_4 \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad +\frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$n' = \sqrt{a_{13}a_{23}}, \quad n'' = \sqrt{a_{14}a_{24}}, \quad n = \frac{n'' - n'}{n'' + n'},$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) = \frac{n''}{n'} \cdot \frac{y - a_3}{a_4 - y}, \quad y = \frac{a_4 + a_3}{2} + \frac{a_4 - a_3}{2} \cdot \frac{\sin \varphi - n}{1 - n \sin \varphi}.$$

(B). Transformation du second ordre.

$$m = \frac{1}{2} \sqrt{a_{13}a_{24}}, \quad k^2 = \frac{a_{12}a_{34}}{a_{13}a_{24}}, \quad k'^2 = \frac{a_{14}a_{23}}{a_{13}a_{24}}.$$

$$(\alpha) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_1, \quad a_2 \\ \varphi = 0, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{a_{24}}{a_{12}} \cdot \frac{y - a_1}{a_2 - y}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_{14}}{a_{12}} \cdot \frac{a_2 - y}{a_4 - y}, \quad y = \frac{a_1 a_{24} + a_2 a_{12} \sin^2 \varphi}{a_{24} + a_{12} \sin^2 \varphi}.$$

$$(\beta) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_3, \quad a_4 \\ \varphi = 0, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{a_{24}}{a_{34}} \cdot \frac{y - a_3}{y - a_2}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_{23}}{a_{34}} \cdot \frac{a_4 - y}{y - a_2}, \quad y = \frac{a_3 a_{24} - a_2 a_{34} \sin^2 \varphi}{a_{24} - a_{34} \sin^2 \varphi}.$$

II. Trois racines réelles.

$$R = (y - a_1)(y - a_2)(y - a_3), \quad (a_1 < a_2 < a_3),$$

$$\frac{dy}{\sqrt{\pm R}} = \frac{1}{m} \cdot \frac{d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

1° Signe supérieur :  $\frac{dy}{\sqrt{+R}}$ .

(A). Transformation du premier ordre.

$$m' = \sqrt{a_{12}}, \quad m'' = \sqrt{a_{23}}, \quad m = \frac{m' + m''}{2}, \quad k = \frac{m' - m''}{m' + m''}.$$

$$(\alpha) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_1, \quad a_2 \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad +\frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) = \frac{m'}{m''} \cdot \frac{a_2 - y}{y - a_1}, \quad y = \frac{a_2 + a_1}{2} + \frac{a_2 - a_1}{2} \cdot \frac{\sin \varphi + k}{1 + k \sin \varphi}.$$

$$(\beta) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_3, \quad \infty \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) = m' m'' \frac{1}{y - a_3}, \quad y = a_3 + m' m'' \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}.$$

(B). Transformation du second ordre.

$$k^2 = \frac{a_{12}}{a_{13}}, \quad k'^2 = \frac{a_{23}}{a_{13}}.$$

$$(\alpha) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_1, \quad a_2 \\ \varphi = 0, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{y - a_1}{a_{12}}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_2 - y}{a_{12}}, \quad y = a_1 + a_{12} \sin^2 \varphi.$$

$$(\beta) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_3, \quad \infty \\ \varphi = 0, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{y - a_3}{y - a_2}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_{23}}{y - a_2}, \quad y = \frac{a_3 - a_2 \sin^2 \varphi}{1 - \sin^2 \varphi}.$$

2° Signe inférieur :  $\frac{dy}{\sqrt{-R}}$ .

(A). Transformation du premier ordre.

$$m' = \sqrt{a_{12}}, \quad m'' = \sqrt{a_{13}}, \quad m = \frac{m' + m''}{2}, \quad k = \frac{m' - m''}{m' + m''}.$$

$$(\alpha) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = -\infty, \quad a_1 \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad +\frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) = \frac{1}{m' m''} (a_1 - y), \quad y = a_1 - m' m'' \frac{1 - \sin \varphi}{1 + \sin \varphi}.$$

$$(\beta) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_3, \quad a_2 \\ \varphi = -\frac{\pi}{2}, \quad +\frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\text{tang}^2 \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) = \frac{m''}{m'} \cdot \frac{a_3 - y}{y - a_2}, \quad y = \frac{a_3 + a_2}{2} + \frac{a_3 - a_2}{2} \cdot \frac{\sin \varphi - k}{1 + k \sin \varphi}.$$

(B). Transformation du second ordre.

$$k^2 = \frac{a_{23}}{a_{13}}, \quad k'^2 = \frac{a_{12}}{a_{13}}.$$

$$(x) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = -\infty, \quad a_1 \\ \varphi = 0, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{a_{13}}{a_3 - y}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_1 - y}{a_3 - y}, \quad y = a_3 - \frac{a_{13}}{\sin^2 \varphi}.$$

$$(b) \quad \text{Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_2, \quad a_3 \\ \varphi = 0, \quad \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}.$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{a_{13}}{a_{23}} \cdot \frac{y - a_2}{y - a_1}, \quad \cos^2 \varphi = \frac{a_{12}}{a_{23}} \cdot \frac{a_3 - y}{y - a_1}, \quad y = \frac{a_2 a_{13} - a_1 a_{23} \sin^2 \varphi}{a_{13} - a_{23} \sin^2 \varphi}.$$

III. Deux racines réelles et deux imaginaires.

$$R = (y - a_1)(y - a_2)[(y - b)^2 + c^2], \quad (a_1 < a_2, c > 0).$$

$$\text{tang } \theta_1 = \frac{a_1 - b}{c}, \quad \text{tang } \theta_2 = \frac{a_2 - b}{c}, \quad \theta = \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}, \quad \Theta = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2},$$

$$k = \sin \theta, \quad n = \text{tang } \theta \text{ tang } \Theta.$$

$$\text{tang}^2 \frac{\varphi}{2} = \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} \cdot \frac{a_2 - y}{y - a_1}, \quad y = \frac{a_2 + a_1}{2} - \frac{a_2 - a_1}{2} \cdot \frac{n - \cos \varphi}{1 - n \cos \varphi}.$$

$$1^\circ \text{ Signe supérieur : Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_2, \quad \pm \infty, \quad a_1 \\ \varphi = 0, \quad \text{arc cos } \frac{1}{n}, \quad \pi \end{array} \right\}.$$

$\theta_1$  obtus,  $\theta_2$  aigu,

$$\frac{dy}{\sqrt{+R}} = \frac{\sqrt{-\cos \theta_1 \cos \theta_2}}{c} \cdot \frac{d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

$$2^\circ \text{ Signe inférieur : Lim.} \left\{ \begin{array}{l} y = a_1, \quad a_2 \\ \varphi = 0, \quad \pi \end{array} \right\}.$$

$\theta_1$  et  $\theta_2$  aigus,

$$\frac{dy}{\sqrt{-R}} = \frac{\sqrt{\cos \theta_1 \cos \theta_2}}{c} \cdot \frac{d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

IV. Une racine réelle et deux imaginaires.

$$R = (y - a)[(y - b)^2 + c^2], \quad (c > 0).$$

$$\text{tang } \theta_1 = \frac{a - b}{c}, \quad k = \sin \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\theta_1}{2} \right),$$

$$\text{tang}^2 \frac{\varphi}{2} = \frac{\cos \theta_1}{c} (a - y), \quad y = a - \frac{c}{\cos \theta_1} \cdot \frac{1 - \cos \varphi}{1 + \cos \varphi}.$$

$$1^{\circ} \text{ Signe supérieur : Lim. } \left\{ \begin{array}{l} y = a, \quad +\infty \\ \varphi = \pi, \quad 0 \end{array} \right\}.$$

$\theta_1$  obtus,

$$\frac{dy}{\sqrt{+R}} = -\sqrt{\frac{-\cos\theta_1}{c}} \cdot \frac{d\varphi}{\Delta\varphi}.$$

$$2^{\circ} \text{ Signe inférieur : Lim. } \left\{ \begin{array}{l} y = -\infty, \quad a \\ \varphi = \pi, \quad 0 \end{array} \right\}.$$

$\theta_1$  aigu,

$$\frac{dy}{\sqrt{-R}} = -\sqrt{\frac{\cos\theta_1}{c}} \cdot \frac{d\varphi}{\Delta\varphi}.$$

#### V. Quatre racines imaginaires.

$$R = [(y - b_1)^2 + c_1^2] [(y - b_2)^2 + c_2^2], \quad (b_1 < b_2, c_1 \text{ et } c_2 \text{ positifs}).$$

$$\text{tang } \theta = \frac{c_2 + c_1}{b_2 - b_1}, \quad \text{tang } \theta_2 = \frac{c_2 - c_1}{b_2 - b_1}, \quad \text{tang}^2 \frac{\theta}{2} = \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2}, \quad k = \sin \theta,$$

$$\theta_1, \theta_2 \text{ et } \frac{1}{2}\theta \text{ aigus.} \quad \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \theta', \quad \frac{\theta_1 - \theta_2}{2} = \theta''.$$

$$\frac{dy}{\sqrt{R}} = \sqrt{\frac{\cos \theta}{c_1 c_2}} \cdot \frac{d\varphi}{\Delta\varphi}.$$

$$1^{\circ} \quad \text{Lim. } \left\{ \begin{array}{l} y = -\infty \quad b_2, \quad +\infty \\ \varphi = \frac{\pi}{2} - \theta', \quad -\theta', \quad \frac{\pi}{2} - \theta' \end{array} \right\}.$$

$$\text{tang}(\varphi + \theta') = \frac{y - b_2}{c_2}, \quad y = b_2 + c_2 \frac{\text{tang } \varphi + \text{tang } \theta'}{1 - \text{tang } \theta' \text{ tang } \varphi}.$$

$$2^{\circ} \quad \text{Lim. } \left\{ \begin{array}{l} y = -\infty, \quad b_1, \quad +\infty \\ \varphi = \theta'', \quad \frac{\pi}{2} - \theta'', \quad \theta'' \end{array} \right\}.$$

$$\text{tang}(\varphi + \theta'') = \frac{c_1}{b_1 - y}, \quad y = b_1 - c_1 \frac{1 - \text{tang } \theta'' \text{ tang } \varphi}{\text{tang } \theta'' + \text{tang } \varphi}.$$

### § XXVIII.

Réduction de la différentielle  $F(y, \sqrt{R}) dy$  aux différentielles elliptiques,  $F$  désignant une fonction rationnelle, et  $R$  un polynôme du troisième ou du quatrième degré en  $y$ .

On commencera, à l'aide d'une transformation connue, par mettre  $F(y, \sqrt{R}) dy$  sous la forme

$$\left[ \varphi(y) + \frac{\chi(y)}{\sqrt{R}} \right] dy,$$

$\varphi$  et  $\chi$  désignant des fonctions rationnelles.

Occupons-nous du second terme  $\frac{\chi(y) dy}{\sqrt{R}}$ .



La transformation du second ordre ramène immédiatement cette expression à la forme

$$f(\sin^2 \varphi) \frac{d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

La transformation du premier ordre la ramène à la forme

$$\psi(x) \frac{dx}{\Delta x},$$

$x$  étant une des trois quantités  $\sin \varphi$ ,  $\cos \varphi$ ,  $\operatorname{tang} \varphi$ . Par un artifice connu, on décomposera la fonction  $\psi(x)$  en deux autres, l'une paire, l'autre impaire. Celle-ci, multipliée par  $\frac{dx}{\Delta x}$ , donne lieu à une différentielle qui s'intègre par arcs de cercles et par logarithmes, en posant

$$\text{pour } x = \sin \varphi, \quad t = \cos \varphi, \quad \text{d'où } f(x^2) \frac{xd\varphi}{\Delta \varphi} = -F(t^2) \frac{dt}{\sqrt{k'^2 + k^2 t^2}};$$

$$\text{pour } x = \cos \varphi, \quad t = \sin \varphi, \quad \text{d'où } f(x^2) \frac{xd\varphi}{\Delta \varphi} = F(t^2) \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 t^2}};$$

$$\text{pour } x = \operatorname{tang} \varphi, \quad t = \cos \varphi, \quad \text{d'où } f(x^2) \frac{xd\varphi}{\Delta \varphi} = -F\left(\frac{1-t^2}{t^2}\right) \frac{dt}{t\sqrt{k'^2 + k^2 t^2}}.$$

La fonction paire de  $x$  peut toujours se mettre sous la forme  $f(\sin^2 \varphi)$ ,  $f$  désignant une fonction rationnelle. On est donc ramené, dans tous les cas, à une différentielle de la forme

$$f(\sin^2 \varphi) \frac{d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

Par la décomposition en fractions simples, cette fonction donnera lieu à des termes des formes suivantes :

$$\frac{A d\varphi}{\Delta \varphi}, \quad \frac{A d\varphi}{(1 + n \sin^2 \varphi) \Delta \varphi}, \quad \frac{A \sin^{2p} \varphi \cdot d\varphi}{\omega}, \quad \frac{A d\varphi}{(1 + n \sin^2 \varphi)^q \Delta \varphi}.$$

Dans les deux dernières, on peut réduire les exposants  $p$  et  $q$  à l'unité.

1° Soit

$$V_q = \int \frac{d\varphi}{(1 + n \sin^2 \varphi)^q \Delta \varphi}.$$

Par la formule de réduction

$$\begin{aligned} (2q - 2) \left( 1 + \frac{1+k^2}{n} + \frac{k^2}{n^2} \right) V_q - (2q - 3) \left[ 1 + \frac{2(1+k^2)}{n} + \frac{3k^2}{n^2} \right] V_{q-1} \\ + (2q - 4) \left( \frac{1+k^2}{n} + \frac{3k^2}{n^2} \right) V_{q-2} - (2q - 5) \frac{k^2}{n^2} V_{q-3} \\ = \frac{\sin \varphi \cos \varphi \Delta \varphi}{(1 + n \sin^2 \varphi)^{q-1}}, \end{aligned}$$

on abaissera l'exposant  $q$  jusqu'à la valeur 1, et l'intégrale proposée  $V_q$  dépendra alors des intégrales

$$V_1 = \int \frac{d\varphi}{(1 + n \sin^2 \varphi) \Delta \varphi} = \Pi(\varphi, n),$$

$$V_0 = \int \frac{d\varphi}{\Delta \varphi} = F(\varphi),$$

et des intégrales  $V_{-1}$ ,  $V_{-2}$ , qui se ramènent à des intégrales de la forme

$$\int \frac{\sin^{2p} \varphi \cdot d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

[ LX ]

INTRODUCTION.

2° Soit

$$X_p = \int \frac{\sin^{2p} \varphi \cdot d\varphi}{\Delta \varphi}.$$

La formule de réduction

$$(2p - 1) k^2 X_p - (2p - 2) (1 + k^2) X_{p-1} + (2p - 3) X_{p-2} = \sin^{2p-3} \varphi \cos \varphi \Delta \varphi$$

permettra d'abaisser  $p$  jusqu'à la valeur 1, ce qui fera dépendre  $X_p$  des intégrales

$$X_0 = \int \frac{d\varphi}{\Delta \varphi} = F(\varphi),$$

$$X_1 = \int \frac{\sin^2 \varphi \cdot d\varphi}{\Delta \varphi} = \frac{1}{k^2} F(\varphi) - \frac{1}{k^2} E(\varphi).$$

On ramènera donc ainsi l'intégrale proposée aux trois intégrales elliptiques

$$F(\varphi), \quad E(\varphi), \quad \Pi(\varphi, n).$$

APPLICATIONS NUMÉRIQUES  
DES  
FONCTIONS ELLIPTIQUES.

---

Nous allons maintenant développer la solution numérique de quelques questions de Géométrie et de Mécanique qui se ramènent aux fonctions elliptiques. On verra que nos petites Tables, lors même qu'elles ne fourniront pas une approximation suffisante, seront néanmoins d'un grand secours, en permettant d'ébaucher rapidement les calculs, et de passer aisément des premières valeurs approchées à des valeurs plus exactes.

I. — Aire de l'ellipsoïde.

Soient  $a, b, c$  les demi-axes d'un ellipsoïde, et

$$a < b < c.$$

Si l'on pose (\*)

$$k = \frac{c}{b} \sqrt{\frac{b^2 - a^2}{c^2 - a^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{a}{c},$$

l'aire totale de l'ellipsoïde sera donnée par la formule

$$S = 2\pi a^2 + 2\pi ab [\cot \varphi F(\varphi) + \tan \varphi E(\varphi)].$$

Appliquons cette formule au cas où l'on donne

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 3.$$

On trouve alors

$$k = \sqrt{\frac{27}{32}}, \quad k' = \sqrt{\frac{5}{32}}, \quad \theta = 0^\circ, 741292 = 66^\circ, 7163,$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{3}, \quad \tan \varphi = \sqrt{8}, \quad \varphi = 0^\circ, 783653 = 70^\circ, 5288.$$

Les petites Tables de la page 58 donnent, pour ces valeurs de  $\theta$  et de  $\varphi$ ,

$$\log F(\varphi) = 0,1992, \quad \log E(\varphi) = 0,0002,$$

---

(\*) LEGENDRE, *Traité des fonctions elliptiques*, t. I, p. 357.

d'où l'on conclut

$$S = 48,86.$$

Pour obtenir une valeur plus approchée, en se servant des formules (63), (69), (71), (23), on disposera le calcul comme il suit :

$\sqrt{k} \dots\dots\dots \bar{1},98155$	$\frac{\Delta\varphi}{\cos\varphi} = \frac{3}{2} \dots 0,17609$	$\frac{\pi}{2K'} \dots\dots \bar{1},981$
$\frac{1}{2\delta'} \text{ (Table IV)} \dots\dots 1,6730$	$\sqrt{k} \dots\dots \bar{1},98155$	$2q' \dots\dots \bar{2},327$
$\log \frac{1}{\delta'} = \log \frac{1}{q'} = 2M\rho' = 1,9740$	$\frac{1+\xi'}{1-\xi'} \dots\dots 0,19454$	$\text{Sh } 2x' \dots\dots 1,014$
$2\delta' \dots\dots\dots \bar{2},3270$	$\xi' \text{ (Table IV)} \dots \bar{1},3430$	$\frac{1}{\text{Sh } 2\rho'} \dots\dots \bar{2},327$
$1+2\delta' \text{ (Table III)} \dots 0,00913$	$\frac{1}{2\delta'} \dots\dots\dots 1,6730$	$\beta \dots\dots\dots \bar{3},649$
$\frac{2K'}{\pi} = (1+2\delta')^2 \dots 0,01826$	$\text{Ch } 2x' \dots\dots 1,0160$	$\frac{E}{K} u = 0,76537$
$2M\rho' \dots\dots\dots 0,29535$	$2x' = 3,0302 \dots 0,48147$	$-\frac{x'}{K} = -0,63925$
$\frac{1}{2M} \dots\dots\dots 0,06119$	$\frac{K'}{\pi} \dots\dots\dots \bar{1},71723$	$\frac{\pi}{2K'} \text{Th } x' = 0,87046$
$K \dots\dots\dots 0,37480$	$F(\varphi) = u \dots 0,19870$	$\beta = 0,00446$
$M^2\pi^2 \dots\dots\dots 0,26987$	$\frac{E}{K} \dots\dots\dots \bar{1},68517$	$E(\varphi) = eu = 1,00104$
$2M\rho = \frac{M^2\pi^2}{2M\rho'} \dots\dots \bar{1},97451$	$\frac{E}{K} u \dots\dots\dots \bar{1},88387$	$2\pi ab = 4\pi \dots 1,09921$
$2M\rho = 0,94300$	$-x' \dots\dots -0,18047$	$\cot\varphi \dots\dots \bar{1},54846$
$\frac{\pi}{K} \dots\dots\dots 0,1223$	$K \dots\dots\dots 0,37480$	$F(\varphi) \dots\dots 0,19870$
$\frac{1}{\text{Sh } 2\rho} \dots\dots\dots \bar{1},3637$	$-\frac{x'}{K} \dots\dots -\bar{1},80567$	$(1) \dots\dots\dots 0,84637$
$\frac{\pi}{K \cdot \text{Sh } 2\rho} = \alpha \dots\dots \bar{1},4860$	$\frac{\pi}{2K'} \dots\dots\dots \bar{1},98174$	$2\pi ab \tan\varphi \dots 1,55075$
$\alpha^2 \dots\dots\dots \bar{2},9720$	$\text{Th } x' \dots\dots\dots \bar{1},95801$	$E(\varphi) \dots\dots 0,00045$
$\frac{1+A'^2}{2} = \frac{37}{64} = 0,57812$	$\frac{\pi}{2K'} \text{Th } x' \dots \bar{1},93975$	$(2) \dots\dots\dots 1,55120$
$-\alpha^2 = -0,09376$		$2\pi a^2 = 2\pi = 6,283$
$\frac{E}{K} = 0,48436$		$(1) = 7,020$
		$(2) = 35,579$
		$S = 48,882$

On voit que la valeur donnée par nos petites Tables était déjà fort approchée.

## II. — Longueur de la ligne géodésique d'un sphéroïde de révolution.

Soient  $2a$  l'axe équatorial,  $2b$  l'axe polaire,  $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$  l'excentricité d'un sphéroïde aplati, dont le méridien est déterminé par les équations

$$x = a \cos \omega, \quad y = b \sin \omega.$$

La latitude  $\lambda$  sera donnée par l'une des formules

$$(1) \quad \operatorname{tang} \lambda = \frac{a}{b} \operatorname{tang} \omega, \quad \operatorname{tang}(\lambda - \omega) = \frac{\epsilon \sin \omega \cos \omega}{1 + \epsilon \sin^2 \omega},$$

$\epsilon$  étant l'*aplatissement mécanique*  $\frac{a-b}{b}$ .

Si l'on désigne par  $\psi$  l'*azimut* d'une ligne géodésique du sphéroïde, c'est-à-dire l'angle sous lequel cette ligne coupe le méridien, on aura la relation

$$(2) \quad \cos \omega \sin \psi = \cos \gamma,$$

$\gamma$  étant un angle constant pour chaque ligne géodésique.

En calculant maintenant l'angle auxiliaire  $\varphi$  par la formule

$$(3) \quad \cos \varphi \sin \gamma = \sin \omega,$$

la longueur d'un arc de ligne géodésique, comptée à partir du méridien que cette ligne coupe à angles droits, et pour lequel on a

$$\omega = \gamma, \quad \varphi = 0,$$

sera donnée par la formule (\*)

$$(4) \quad s = \frac{\epsilon e \sin \gamma}{k} \cdot E(\varphi),$$

et la différence des longitudes des deux extrémités de l'arc par la formule

$$(5) \quad L = \frac{k}{e \sin \gamma \cos \gamma} \Pi(\varphi, \operatorname{tang}^2 \gamma) - k e \cot \gamma \cdot F(\varphi),$$

le module  $k$  des intégrales elliptiques étant déterminé par les relations

$$(6) \quad k = \sin \theta, \quad \operatorname{tang} \theta = \frac{ae \sin \gamma}{b}.$$

Pour calculer la formule (5), posons

$$\operatorname{tang} \chi = \frac{\operatorname{tang} \gamma}{k}, \quad \frac{2K}{\pi} \alpha = F(\chi, k').$$

Si l'on applique la première formule (109), où l'on a

$$\frac{\Delta(\chi, k')}{\sin \chi \cos \chi} = \frac{k}{e \sin \gamma \cos \gamma},$$

---

(\*) LEGENDRE, *Traité des fonctions elliptiques*, t. 1, p. 361.

la formule (5) deviendra, en posant  $x = \frac{\pi}{2K} F(\varphi)$ ,

$$(7) \quad L = \left[ \frac{\pi}{2K} \cdot D_{\alpha} \log \mathfrak{S}_1(\alpha i) - ke \cot \gamma \right] \cdot F(\varphi) + \frac{1}{2i} \log \frac{\mathfrak{S}(x + \alpha i)}{\mathfrak{S}(x - \alpha i)}.$$

Considérons le sphéroïde terrestre, pour lequel on a

$$\log \frac{a}{b} = 0,0014542, \quad \log e = \bar{2},9122051, \quad \log \epsilon = \bar{3},52556,$$

et proposons-nous, par exemple, de calculer où aboutirait l'extrémité d'un arc de 5000 kilomètres, partant d'un point pour lequel  $\omega = \omega_1 = 45^\circ$ , ce qui correspond à la latitude  $\lambda_1 = 45^\circ 5' 45'', 33$ , et faisant en ce point un angle  $\psi_1 = 45^\circ$  avec la direction nord du méridien.

On conclut d'abord, de ces données,

$$\cos \gamma = \cos \omega_1 \sin \psi_1 = \frac{1}{2}, \quad \text{d'où} \quad \gamma = 60^\circ.$$

On obtiendra maintenant une première approximation du problème en négligeant l'aplatissement terrestre, ce qui donne, par la résolution d'un triangle sphérique dont on connaît l'angle  $\psi_1$  et les deux côtés  $\frac{\pi}{2} - \lambda_1$  et  $s = 45^\circ$ ,

$$\lambda_2 = 58^\circ 37' 37'', 66, \quad L_2 - L_1 = 73^\circ 49' 33'', 61.$$

Si l'on calcule, d'autre part, l'angle du méridien initial avec celui qui est coupé à angles droits par la ligne géodésique, considérée comme un arc de grand cercle, on trouve

$$\cos L = \frac{\tan \omega_1}{\tan \gamma} = \cot 60^\circ, \quad \text{d'où} \quad L = 54^\circ 16' < L_2 - L_1.$$

Donc le point le plus boréal de la ligne géodésique se trouve entre les deux extrémités de l'arc cherché, ce qui montre que cet arc est égal à la somme des distances  $s_1, s_2$  du point le plus boréal aux deux extrémités.

D'après cela, en désignant par les indices 1 et 2 les quantités relatives aux deux extrémités de notre arc, nous aurons, pour calculer  $\varphi_2$ , l'équation

$$(8) \quad s = \frac{ac \sin \gamma}{k} [E(\varphi_1) + E(\varphi_2)].$$

Ensuite on aura la différence des longitudes  $L_2 - L_1$ , en faisant la somme des valeurs du second membre de la formule (7) relatives aux valeurs  $\varphi_1$  et  $\varphi_2$  de l'amplitude  $\varphi$ .

Nous allons maintenant ébaucher les calculs de ces formules au moyen de nos petites Tables, ce qui aura pour avantage de préparer les approximations successives que peuvent exiger les calculs faits avec un plus grand nombre de figures au moyen des grandes Tables logarithmiques ou des Tables de Legendre.

On conclut des données du problème

$$\theta = 0^\circ,04511720 = 4^\circ,060548, \quad \log k = \bar{2},8500984, \quad \log k' = \bar{1},9989085, \\ \varphi_1 = 0^\circ,39182654 = 35^\circ,264389, \quad \chi = 0^\circ,97398786 = 87^\circ,658907.$$

On a ensuite

$s$ .....	3,69897	$F(\varphi_1)$ .....	1,7893	$D_\alpha \log S_1 \alpha i$ .....	0,0007	$\tan X_1$ .....	1,5509
$\frac{1}{a^2}$ .....	3,28315	$F(\varphi_2)$ .....	1,2288	$\frac{2}{\pi}(x_1 + x_2)$ .....	1,6981	$\tan X_2$ .....	1,2108
$\cos \epsilon \gamma$ .....	0,06247	$K$ .....	0,1967	(1).....	1,6988	(1).....	0°,4998
$k$ .....	2,85010	$\frac{2}{\pi}x_1$ .....	1,5926	$-\frac{ke \cot \gamma}{2K}$ .....	3,5237	(2).....	0,0017
Nombre	1,89469	$\frac{2}{\pi}x_2$ .....	1,0321	$\frac{2}{\pi}(x_1 + x_2)$ .....	0,0005	$X_1$ .....	0,2175
$-E(\varphi_1)$	= 0,7847	$1 + \frac{x_2}{x_1}$ .....	0,1055	(2).....	3,2223	$X_2$ .....	0,1025
$E(\varphi_2)$	= 0,1694	$\frac{2}{\pi}(x_1 + x_2)$ .....	1,6981	$q$ .....	4,4972	$L_1 - L_1$	= 0°,8181
$\varphi_2$	= 0°,1078	$F(x, k')$ .....	0,5429	$2Mx$ .....	3,0278		= 73°38'
$\cos \varphi_2$ .....	1,9937	$\pi$ .....	1,6378	$2x_1$	= 0°,7827	En faisant le calcul avec une	
$\sin \gamma$ .....	1,9375	$\frac{2K}{\pi}$ .....	1,9994	$2x_2$	= 0°,2153	plus grande approximation, on	
$\sin \omega_2$ .....	1,9312	$Mx$ .....	0,1801	$\sin 2x_1$ .....	1,9742	$E(\varphi_1)$	= 0,6152990
$\cos \omega_2$ .....	1,7170	$q$ .....	4,4972	$2q \operatorname{Sh} 2x$ .....	1,5250	$E(\varphi_2)$	= 0,1693748
$\delta$ .....	3,5256	$2M\rho = \log \operatorname{vulg} \frac{1}{q}$	= 3,5028	$\sin 2x_2$ .....	1,5209	$\varphi_2$	= 9°,704679
$6 \sin \omega_2 \cos \omega_2$ .....	3,1738	$M\alpha$	= 1,5139	$\cos 2x_1$ .....	1,5247	$\lambda_2$	= 58°41'39",1
$1 + 6 \sin^2 \omega_2$ .....	0,0011	$M(2\rho - \alpha)$	= 1,9889	$-2q \operatorname{Ch} 2x$ .....	-1,5250	$F(\varphi_1)$	= 0,6156604
$\tan(\lambda_2 - \omega_2)$ .....	3,1727	$M(2\rho - 2\alpha)$	= 0,4750	$\cos 2x_2$ .....	1,9746	$F(\varphi_2)$	= 0,1693826
$\lambda_2 - \omega_2$	= 0°,0009	$\operatorname{Sh}(2\rho - 2\alpha)$ .....	0,122	$2q \operatorname{Sh} 2x \sin 2x_1$ .....	1,4992	$2M\rho$	= 3,5028323
$\omega_2$	= 0,6510	$\operatorname{Cosé} \alpha$ .....	2,787	$(1-2q \operatorname{Ch} 2x \cos 2x_1)^{-1}$ .....	0,0517	$D_\alpha \log S_1 \alpha i$	= 1,001674
$\lambda_2$	= 0°,6519	$\operatorname{Cosé} \epsilon(2\rho - \alpha)$ .....	2,312	$2q \operatorname{Sh} 2x \sin 2x_2$ .....	1,0459	$X_1$	= 0°,2167237
	= 58°40'	$D_\alpha \log S_1 \alpha i - 1$ .....	3,221	$(1-2q \operatorname{Ch} 2x \cos 2x_2)^{-1}$ .....	0,1649	$X_2$	= 0,1020983
						$L_2 - L_1$	= 73°32'14",9

## III. — Mouvement de rotation d'un corps solide.

Prenons, pour dernier exemple, la mise en nombre des principales formules du Mémoire de Jacobi *Sur la rotation des corps* (\*); et supposons que le corps considéré soit un ellipsoïde homogène, dont les trois demi-axes aient pour longueurs

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 3.$$

Les trois moments d'inertie principaux seront

$$A = 20,8.\pi, \quad B = 16.\pi, \quad C = 8.\pi,$$

et la masse

$$M = 8\pi.$$

Supposons que les vitesses initiales de rotation autour des trois axes principaux soient

$$p = \frac{1}{4}, \quad q = \frac{1}{2}, \quad r = 1.$$

Les constantes  $h$  et  $l^2$  des forces vives et des aires auront pour valeurs

$$h = 13,3.\pi, \quad l^2 = 155,04.\pi^2,$$

d'où résulte

$$Ah - l^2 = 121,60.\pi^2, \quad Bh - l^2 = 57,76.\pi^2, \quad l^2 - Ch = 48,64.\pi^2.$$

On déterminera le module  $k = \sin \theta$  par la formule

$$\operatorname{tang} \theta = \sqrt{\frac{A-B}{A-C}} \sqrt{\frac{l^2 - Ch}{Bh - l^2}} = (\bar{1},74970),$$

d'où

$$\theta = 0^{\circ},32593.$$

Pour cette valeur de  $\theta$ , la Table de la page 57 donne

$$\log K = 0,2254, \quad \log K' = 0,3374, \quad \log \bar{q} = \bar{2},2342.$$

On calculera ensuite l'intégrale de première espèce

$$a = \int_{\beta}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\beta}{\Delta(\beta, k')} = K' - F(\beta, k'),$$

l'amplitude  $\beta$  étant déterminée par l'équation

$$\operatorname{tang} \beta = \sqrt{\frac{A(B-C)}{C(A-B)}} = (0,31841), \quad \text{d'où} \quad \beta = 0^{\circ},71490.$$

Au moyen de la Table de la page 58, on trouve

$$\log a' = \log(K' - a) = 0,1260, \quad \log a = \bar{1},9235,$$

d'où

$$b = \frac{2}{\pi} a' = \frac{a}{K'} = 0,3855.$$

Pour obtenir des valeurs plus approchées, on peut employer soit les formules (62) ou (63), soit la méthode des transformations modulaires § XVII. Les

(\*) *Journal de Crellé*, t. XXXIX, p. 293.



formules de ce dernier paragraphe donnent les valeurs logarithmiques suivantes :

$$\begin{aligned} m = 0,00000, \quad m_1 = \bar{1},87213, \quad m_2 = \bar{1},85880, \quad m_3 \left. \vphantom{m_3} \right\} = \frac{\pi}{2K'} = \bar{1},85870. \\ n = \bar{1},69011, \quad n_1 = \bar{1},84505, \quad n_2 = \bar{1},85859, \quad n_3 \left. \vphantom{n_3} \right\} \end{aligned}$$

On a ensuite

$$k'^2 \sin^2 \beta = \bar{1},79063, \quad \text{d'où (Table III)} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,41736,$$

$$\frac{\sqrt{m}}{m} = \mu = \bar{1},79132, \quad \frac{n}{\sqrt{m}} = \nu = \bar{1},89879,$$

puis, en opérant au moyen de la Table d'addition (p. 10),

$$\begin{aligned} \mu_1 = \bar{1},98173, \quad \mu_2 = \bar{1},99986, \quad \mu_3 \left. \vphantom{\mu_3} \right\} = 1, \\ \nu_1 = \bar{1},99120, \quad \nu_2 = \bar{1},99995, \quad \nu_3 \left. \vphantom{\nu_3} \right\} \end{aligned}$$

$$\text{tang} \frac{\pi}{2K'} (K' - a) = \cot \alpha' = \frac{\pi}{2K'} \cdot \mu_1 \mu_2 \mu_3 \cdot \text{tang} \beta = (0,15869),$$

$$\alpha' = \frac{\pi}{2} b = 0^s, 38620,$$

$$\frac{1}{q'} = \frac{16k}{k'^2} \left( \frac{m_1}{n_1} \right)^{\frac{3}{2}} \left( \frac{m_2}{n_2} \right)^{\frac{3}{4}} \left( \frac{m_3}{n_3} \right)^{\frac{3}{8}} \dots = (1,05418),$$

$$\log \frac{1}{q'} = 2M\rho = \frac{M^2 \pi^2}{\log \frac{1}{q'}} = 1,76583,$$

$$\frac{2K}{\pi} = \frac{K'}{\rho} = (0,02929),$$

$$\mathfrak{S}(0) = (\bar{1},98485), \quad \mathfrak{S}_2(0) = (\bar{1},85970), \quad \mathfrak{S}_3(0) = (0,01464).$$

$$M\alpha = \frac{K'}{K} \cdot M\alpha' = M\rho \cdot b = 0,34098.$$

$$n = \sqrt{\frac{(B-C)(A h - l^2)}{ABC}} = (\bar{1},78138),$$

$$x = \frac{\pi}{2K} \cdot n (t - t_0) = (\bar{1},75208) (t - t_0).$$

On calculera maintenant  $\mathfrak{S}_2(\alpha i)$  par l'une des formules

$$\mathfrak{S}_2(\alpha i) = 2q'^{\frac{1}{2}} \text{Ch} \alpha + 2q'^{\frac{3}{2}} \text{Ch} 3\alpha + \dots,$$

$$\mathfrak{S}_2(\alpha i) = e^{\frac{\alpha^2}{2\rho}} (1 - 2q' \cos 2\alpha' + 2q'^4 \cos 4\alpha' - \dots),$$

en remarquant que  $\log \text{vulg} e^{\frac{\alpha^2}{2\rho}} = \frac{(M\alpha)^2}{2M\rho}$ . On trouvera ainsi

$$\log \mathfrak{S}_2(\alpha i) = \bar{1},98209.$$

On pourrait calculer de même  $\mathfrak{S}(\alpha i)$ ,  $\mathfrak{S}_3(\alpha i)$ ,  $\mathfrak{S}_1(\alpha i)$ . Mais on opérera plus

directement en calculant les rapports

$$\frac{\vartheta(\alpha i)}{\vartheta_2(\alpha i)} = \sqrt{\frac{A(Bh-l^2)}{(A-B)l^2}}, \quad \frac{\vartheta_3(\alpha i)}{\vartheta_2(\alpha i)} = \sqrt{\frac{B(Ah-l^2)}{(A-B)l^2}}, \quad \frac{\vartheta_1(\alpha i)}{i\vartheta_2(\alpha i)} = \sqrt{\frac{C(Bh-l^2)}{(B-C)l^2}},$$

dont les valeurs logarithmiques sont

$$\bar{1},97885, \quad 0,05374, \quad \bar{1},81539.$$

Nous avons maintenant, pour calculer les diverses inconnues du problème, deux systèmes de formules, les unes sous forme fractionnaire, les autres sous forme entière. En adoptant les notations des formules (15), et posant, pour abrégé,

$$g = \vartheta(0) \vartheta_2(0) \vartheta_3(0), \quad f = n\sqrt{hk} \cdot \vartheta_2(0) = n \cdot \frac{\vartheta(0) \vartheta_2(0)}{\vartheta_3(0)},$$

$$\frac{\vartheta_3(0) \vartheta(\alpha i)}{g \vartheta_2(\alpha i)} = \mathfrak{A}, \quad \frac{\vartheta(0) \vartheta_3(\alpha i)}{g \vartheta_2(\alpha i)} = \mathfrak{B}, \quad \frac{\vartheta_2(0) \vartheta_1(\alpha i)}{g \vartheta_2(\alpha i)} = \mathfrak{C},$$

on aura, pour les valeurs des neuf cosinus des angles que font les axes principaux du corps avec trois axes fixes, dont deux sont situés dans le plan invariable et le troisième perpendiculaire à ce plan, et pour les vitesses de rotation  $\omega_x, \omega_y, \omega_z$  autour de ces trois axes (\*):

$$\alpha = -\frac{\vartheta_3(0)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda'_1(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= -\mathfrak{A} \cdot \text{Ch } \alpha \left[ \frac{2 \text{Sh } \rho \sin x}{\text{Sh}(\rho - \alpha) \text{Sh}(\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Sh } 3\rho \sin 3x}{\text{Sh}(3\rho - \alpha) \text{Sh}(3\rho + \alpha)} + \dots \right],$$

$$\alpha' = \frac{\vartheta_3(0)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda''_1(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= \mathfrak{A} \cdot \text{Sh } \alpha \left[ \frac{2 \text{Ch } \rho \cos x}{\text{Sh}(\rho - \alpha) \text{Sh}(\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Ch } 3\rho \cos 3x}{\text{Sh}(3\rho - \alpha) \text{Sh}(3\rho + \alpha)} + \dots \right],$$

$$\alpha'' = -\frac{\vartheta(\alpha i)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\vartheta_2 x}{\vartheta x} = -\mathfrak{A} \cdot 2 \left( \frac{\cos x}{\text{Ch } \rho} + \frac{\cos 3x}{\text{Ch } 3\rho} + \dots \right);$$

$$\beta = -\frac{\vartheta(0)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda'_2(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= -\mathfrak{B} \cdot \text{Ch } \alpha \left[ \frac{2 \text{Ch } \rho \cos x}{\text{Ch}(\rho - \alpha) \text{Ch}(\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Ch } 3\rho \cos 3x}{\text{Ch}(3\rho - \alpha) \text{Ch}(3\rho + \alpha)} + \dots \right],$$

$$\beta' = \frac{\vartheta(0)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda''_2(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= \mathfrak{B} \cdot \text{Sh } \alpha \left[ \frac{2 \text{Ch } \rho \sin x}{\text{Ch}(\rho - \alpha) \text{Ch}(\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Ch } 3\rho \sin 3x}{\text{Ch}(3\rho - \alpha) \text{Ch}(3\rho + \alpha)} + \dots \right];$$

$$\beta'' = \frac{\vartheta_3(\alpha i)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\vartheta_1 x}{\vartheta x} = \mathfrak{C} \cdot 2 \left( \frac{\sin x}{\text{Sh } \rho} + \frac{\sin 3x}{\text{Sh } 3\rho} + \dots \right);$$

(\*) Les développements des valeurs de  $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$  sont donnés d'une manière incorrecte dans le Mémoire de Jacobi, page 297, formules (3), (4), (5), (6). Dans les numérateurs de ces formules, au lieu de

$$\sqrt{q(1-q)}, \quad \sqrt{q^3(1-q^3)}, \dots, \quad \sqrt{q(1+q)}, \quad \sqrt{q^3(1+q^3)}, \dots,$$

il faut lire

$$(1-q), \quad (1-q^3), \dots, \quad (1+q), \quad (1+q^3), \dots$$

$$\gamma = \frac{\vartheta_2(0)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda''(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= e \cdot \text{Ch} \alpha \left[ \frac{2 \text{Sh} 2\rho \sin 2x}{\text{Sh}(2\rho - \alpha) \text{Sh}(2\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Sh} 4\rho \sin 4x}{\text{Sh}(4\rho - \alpha) \text{Sh}(4\rho + \alpha)} + \dots \right],$$

$$\gamma' = \frac{\vartheta_2(0)}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda'(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= e \left\{ \frac{1}{\text{Sh} \alpha} - \text{Sh} \alpha \left[ \frac{2 \text{Ch} 2\rho \cos 2x}{\text{Sh}(2\rho - \alpha) \text{Sh}(2\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Ch} 4\rho \cos 4x}{\text{Sh}(4\rho - \alpha) \text{Sh}(4\rho + \alpha)} + \dots \right] \right\},$$

$$\gamma'' = \frac{\vartheta_1(\alpha i)}{i \vartheta_3(\alpha i)} \cdot \frac{\vartheta_3 x}{\vartheta x} = e \left[ 1 + 2 \left( \frac{\cos 2x}{\text{Ch} 2\rho} + \frac{\cos 4x}{\text{Ch} 4\rho} + \dots \right) \right];$$

$$\omega_x = \frac{f}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda_3''(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= \frac{\pi}{2K} n \cdot \text{Sh} \alpha \left[ \frac{2 \text{Sh} 2\rho \sin 2x}{\text{Ch}(2\rho - \alpha) \text{Ch}(2\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Sh} 4\rho \sin 4x}{\text{Ch}(4\rho - \alpha) \text{Ch}(4\rho + \alpha)} + \dots \right],$$

$$\omega_y = -\frac{f}{\vartheta_2(\alpha i)} \cdot \frac{\lambda_3'(x, \alpha i)}{\vartheta x}$$

$$= -\frac{\pi}{2K} n \left\{ \frac{1}{\text{Ch} \alpha} + \text{Ch} \alpha \left[ \frac{2 \text{Ch} 2\rho \cos 2x}{\text{Ch}(2\rho - \alpha) \text{Ch}(2\rho + \alpha)} + \frac{2 \text{Ch} 4\rho \cos 4x}{\text{Ch}(4\rho - \alpha) \text{Ch}(4\rho + \alpha)} + \dots \right] \right\},$$

$$\omega_z = \frac{h}{l}.$$

Les vitesses de rotation autour des axes principaux sont

$$p = \frac{l}{A} \alpha'', \quad q = \frac{l}{B} \beta'', \quad r = \frac{l}{C} \gamma''.$$

Les angles  $\theta$ ,  $\varphi$ ,  $\psi'$ , qui déterminent à chaque instant les positions des axes principaux, par rapport aux axes fixes, sont donnés par les formules

$$\cos \theta = \gamma',$$

$$\text{tang} \varphi = -\frac{\vartheta(\alpha i)}{\vartheta_3(\alpha i)} \cdot \frac{\vartheta_3 x}{\vartheta_1 x} = -\frac{A_0}{\mathfrak{U}_0} \left( \cot x - 2q' \frac{\sin 2x}{\text{Ch} 2\rho} - 2q'' \frac{\sin 4x}{\text{Ch} 4\rho} - \dots \right),$$

$$\text{tang} \psi' = \frac{\gamma}{\gamma'} = \frac{\lambda''(x, \alpha i)}{\lambda'(x, \alpha i)}.$$

Enfin, la vitesse angulaire moyenne  $\Psi$  de la droite ( $x$ ) (Mémoire de Jacobi, p. 305) a pour valeur

$$\Psi = \frac{\pi}{2K} n \left[ \frac{C}{A-C} \cdot D_\alpha \log \vartheta_1(\alpha i) - \frac{A}{A-C} \cdot D_\alpha \log \vartheta(\alpha i) \right],$$

ce qui donne la partie non périodique de  $\psi' = \psi + \Psi(\epsilon - \epsilon_0)$ .

Voici, par exemple, le calcul numérique de  $\gamma$  :

$\frac{S_2(0)}{S_2(x)}$ .....	$\bar{1},8776$	$\ominus$ .....	$\bar{1},8159$	$\bar{1},938$ (*)
$2q$ .....	$\bar{2},5352$	$\text{Ch}x$ .....	$0,1220$	$0,602$
$\text{Sh}2\alpha$ .....	$0,3617$		$\bar{1},9379$	$-4M\rho$ .....
(1).....	$\bar{2},7745$		$1,7657$	(b).....
	$\bar{1},88$		$\frac{1}{\text{Sh}(2\rho-\alpha)}$ .....	$0,54$
$-2q'$ .....	$\bar{7},24$		$\frac{1}{\text{Sh}(2\rho+\alpha)}$ .....	$-6M\rho$ .....
$\text{Sh}4\alpha$ .....	$1,06$	(a).....	$\bar{2},1942$	(c).....
2).....	$-\bar{6},18$		$\bar{2},7746$	$0,5$
				$-8M\rho$ .....
				(d).....
				$\bar{7},3$

Donc

$$\gamma = \frac{(\bar{2},7745) \sin 2x - (\bar{6},18) \sin 4x + \dots}{1 - (\bar{2},5352) \cos 2x + (\bar{7},24) \cos 4x - \dots}$$

$$= (\bar{2},7746) \sin 2x + (\bar{3},008) \sin 4x + (\bar{5},24) \sin 6x + (\bar{7},3) \sin 8x + \dots$$

On trouvera de même

$$\gamma' = (\bar{1},8776) \frac{1 - (\bar{2},9345) \cos 2x + (\bar{6},30) \cos 4x - \dots}{1 - (\bar{2},5352) \cos 2x + (\bar{7},24) \cos 4x - \dots}$$

$$= (\bar{1},87722) - (\bar{2},5916) \cos 2x - (\bar{4},825) \cos 4x$$

$$- (\bar{5},06) \cos 6x - (\bar{7},1) \cos 8x - \dots$$

On en tire immédiatement

$$\text{tang} \psi' = \frac{(\bar{2},8969) \sin 2x - (\bar{6},30) \sin 4x + \dots}{1 - (\bar{2},9345) \cos 2x + (\bar{6},30) \cos 4x - \dots}$$

Ensuite, au moyen de la Table XIV, qui donne immédiatement les valeurs de

$\frac{1}{\text{Ch}2\rho} \cdot \frac{1}{\text{Cu}4\rho}$ , etc., on trouve

$$\gamma'' = \cos \theta = (\bar{1},81539) \frac{1 + (\bar{2},5352) \cos 2x + (\bar{7},24) \cos 4x + \dots}{1 - (\bar{2},5352) \cos 2x + (\bar{7},24) \cos 4x - \dots}$$

$$= (\bar{1},81590) + (\bar{2},6520) \cos 2x + (\bar{4},886) \cos 4x$$

$$+ (\bar{3},12) \cos 6x + (\bar{7},4) \cos 8x + \dots,$$

$$\text{tang} \varphi = -(\bar{1},92521) \frac{\cos x + (\bar{4},468) \cos 3x + \dots}{\sin x - (\bar{4},468) \sin 3x - \dots}$$

$$= -(\bar{1},92572) \cot x + (\bar{2},7618) \sin 2x + (\bar{4},996) \sin 4x$$

$$+ (\bar{5},23) \sin 6x + (\bar{7},5) \sin 8x + \dots$$

(\*) Pour une valeur assez grande de  $u$ , on a sensiblement

$$\log (2 \text{Sh} u) = \log (2 \text{Ch} u) = Mu,$$

d'où, pour  $n$  assez grand,

$$\log \frac{2 \text{Sh} n\rho}{\text{Sh}(n\rho-\alpha) \text{Sh}(n\rho+\alpha)} = Mn\rho - [M(n\rho-\alpha) - \log 2] - [M(n\rho+\alpha) - \log 2] = \log 4 - Mn\rho,$$


et de même pour les cosinus hyperboliques.

INTRODUCTION.

[ LXXI ]

Calculons enfin la vitesse angulaire  $\Psi$ , en déterminant  $D_\alpha \log \mathfrak{S}_1(\alpha i)$ ,  $D_\alpha \log \mathfrak{S}(\alpha i)$  par les formules (23) ou (24). On trouve, par les formules (23) :

$\frac{\pi n}{2k} \frac{C}{A-C} \dots$	$\bar{1},54797$	$-\frac{\pi n}{2k} \frac{A}{KA-C} \dots$	$-\bar{1},96294$	(1).....	0,53960
$\frac{i}{\mathfrak{S}_1(\alpha i)} \dots$	0,20252	$-\frac{i}{\mathfrak{S}(\alpha i)} \dots$	-0,03906	(2).....	0,15846
$2q^{\frac{1}{2}} \dots$	$\bar{1},85957$	$4q \dots$	$\bar{2},83621$	(3).....	- 191
	$\bar{1},61006$		$\bar{2},83821$	(4).....	- 1
Ch $2\alpha \dots$	0,12201	Sh $2\alpha \dots$	0,36172		$\Psi = 0,69614$
(1).....	$\bar{1},73207$	(2).....	1,19993		$\log \Psi = \bar{1},84270$
	$\bar{1},610$		$\bar{2},838$		
$-3q^2 \dots$	$-\bar{4},945$	$-2q^2 \dots$	$-\bar{5},003$		
Ch $3\alpha \dots$	0,726	Sh $4\alpha \dots$	1,062		
(3).....	$-\bar{3},281$	(4).....	$-\bar{6},903$		



# **TABLES NUMÉRIQUES.**

I. — LOGARITHMES VULGAIRES

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
0	»	000	301	477	602	699	778	845	903	954	
1	000	041	079	114	146	176	204	230	255	279	22
2	301	322	342	362	380	398	415	431	447	462	15
3	477	491	505	519	531	544	556	568	580	591	11
4	602	613	623	633	643	653	663	672	681	690	9
5	699	708	716	724	732	740	748	756	763	771	7
6	778	785	792	799	806	813	820	826	833	839	6
7	845	851	857	863	869	875	881	886	892	898	5
8	903	908	914	919	924	929	934	940	944	949	5
9	954	959	964	968	973	978	982	987	991	995	4
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	40
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	37
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	33
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	31
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	29
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	27
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	25
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	24
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	23
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	21
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	21
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	20
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	19
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	18
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	17
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	17
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	16
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	16
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	15
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	14
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	14
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	13
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	13
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	13
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	13
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	12
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	12
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	12
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	12
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	11
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	11
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	10
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	10
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	10
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	10
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	10
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	9
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	9
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	9
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	9

Nombres.	Log.	Nombres.	Log.	Nombres.	Log.
$e = 2,7183$	0,4343	$\pi = 3,1416$	0,4971	$R^0 = 57^0,30$	1,7581
$M = 0,4343$	1,6378	$\frac{2}{\pi} = 0,6366$	1,8039	$R' = 3437,7$	3,5363
$\frac{1}{M} = 2,3026$	0,3622	$g = 9,809$	0,9916	$R'' = 206263''$	5,3144



OU DÉCIMAUX.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	9
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	8
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	8
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	8
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	8
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	8
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	8
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	8
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	7
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	7
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	7
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	7
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	7
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	7
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	6
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	6
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	6
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	6
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	6
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	6
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	6
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	6
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	6
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	5
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	5
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	5
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	5
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	5
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	5
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	4

Nombres.	Log.	Arc.	Sin : Arc.	Tg : Arc.	Arc.	Sin : Arc.	Tg : Arc.
R		q			q		
1°=0,01745	2,2419	0,00	0,1961	0,1961	0,03	0,1960	8,1964
1' = 0,002909	4,4637	0,01	0,1961	0,1962	0,01	0,1958	0,1967
1" = 0,0004848	6,6856	0,02	0,1960	0,1963	0,05	0,1957	0,1970

I. (Suite.) — LOGARITHMES VULGAIRES

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
100	0000	0004	0009	0013	0017	0022	0026	0030	0035	0039	4
101	0043	0048	0052	0056	0060	0065	0069	0073	0077	0082	4
102	0086	0090	0095	0099	0103	0107	0111	0116	0120	0124	4
103	0128	0133	0137	0141	0145	0149	0154	0158	0162	0166	4
104	0170	0175	0179	0183	0187	0191	0195	0199	0204	0208	4
105	0212	0216	0220	0224	0228	0233	0237	0241	0245	0249	4
106	0253	0257	0261	0265	0269	0273	0278	0282	0286	0290	4
107	0294	0298	0302	0306	0310	0314	0318	0322	0326	0330	4
108	0334	0338	0342	0346	0350	0354	0358	0362	0366	0370	4
109	0374	0378	0382	0386	0390	0394	0398	0402	0406	0410	4
110	0414	0418	0422	0426	0430	0434	0438	0441	0445	0449	4
111	0453	0457	0461	0465	0469	0473	0477	0481	0484	0488	4
112	0492	0496	0500	0504	0508	0512	0515	0519	0523	0527	4
113	0531	0535	0538	0542	0546	0550	0554	0558	0561	0565	4
114	0569	0573	0577	0580	0584	0588	0592	0596	0599	0603	4
115	0607	0611	0615	0618	0622	0626	0630	0633	0637	0641	4
116	0645	0648	0652	0656	0660	0663	0667	0671	0674	0678	4
117	0682	0686	0689	0693	0697	0700	0704	0708	0711	0715	4
118	0719	0722	0726	0730	0734	0737	0741	0745	0748	0752	3
119	0755	0759	0763	0766	0770	0774	0777	0781	0785	0788	4
120	0792	0795	0799	0803	0806	0810	0813	0817	0821	0824	4
121	0828	0831	0835	0839	0842	0846	0849	0853	0856	0860	4
122	0864	0867	0871	0874	0878	0881	0885	0888	0892	0896	3
123	0899	0903	0906	0910	0913	0917	0920	0924	0927	0931	3
124	0934	0938	0941	0945	0948	0952	0955	0959	0962	0966	3
125	0969	0973	0976	0980	0983	0986	0989	0993	0997	1000	4
126	1004	1007	1011	1014	1017	1021	1024	1028	1031	1035	3
127	1038	1041	1045	1048	1052	1055	1059	1062	1065	1069	3
128	1072	1075	1079	1082	1086	1089	1092	1096	1099	1103	3
129	1106	1109	1113	1116	1119	1123	1126	1129	1133	1136	3
130	1139	1143	1146	1149	1153	1156	1159	1163	1166	1169	4
131	1173	1176	1179	1183	1186	1189	1193	1196	1199	1202	4
132	1206	1209	1212	1216	1219	1222	1225	1229	1232	1235	4
133	1239	1242	1245	1248	1252	1255	1258	1261	1265	1268	3
134	1271	1274	1278	1281	1284	1287	1290	1294	1297	1300	3
135	1303	1307	1310	1313	1316	1319	1323	1326	1329	1332	3
136	1335	1339	1342	1345	1348	1351	1355	1358	1361	1364	3
137	1367	1370	1374	1377	1380	1383	1386	1389	1392	1396	3
138	1399	1402	1405	1408	1411	1414	1418	1421	1424	1427	3
139	1430	1433	1436	1440	1443	1446	1449	1452	1455	1458	3
140	1461	1464	1467	1471	1474	1477	1480	1483	1486	1489	3
141	1492	1495	1498	1501	1504	1508	1511	1514	1517	1520	3
142	1523	1526	1529	1532	1535	1538	1541	1544	1547	1550	3
143	1553	1556	1559	1562	1565	1569	1572	1575	1578	1581	3
144	1584	1587	1590	1593	1596	1599	1602	1605	1608	1611	3
145	1614	1617	1620	1623	1626	1629	1632	1635	1638	1641	3
146	1644	1647	1649	1652	1655	1658	1661	1664	1667	1670	3
147	1673	1676	1679	1682	1685	1688	1691	1694	1697	1700	3
148	1703	1706	1708	1711	1714	1717	1720	1723	1726	1729	3
149	1732	1735	1738	1741	1744	1746	1749	1752	1755	1758	3

Nombres.	Log.	Nombres.	Log.	Nombres.	Log.
$e = 2,7183$	0,4343	$\pi = 3,1416$	0,4971	$R^0 = 57^0,30$	1,7581
$M = 0,4343$	$\bar{1},6378$	$\frac{2}{\pi} = 0,6366$	$\bar{1},8039$	$R' = 3437',7$	3,5363
$\frac{1}{M} = 2,3026$	0,3622	$g = 9,809$	0,9916	$R'' = 206265''$	5,3144

OU DÉCIMAUX.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
150	1761	1764	1767	1770	1772	1775	1778	1781	1784	1787	3
151	1790	1793	1796	1798	1801	1804	1807	1810	1813	1816	2
152	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836	1838	1841	1844	3
153	1847	1850	1853	1855	1858	1861	1864	1867	1870	1872	3
154	1875	1878	1881	1884	1886	1889	1892	1895	1898	1901	2
155	1903	1906	1909	1912	1915	1917	1920	1923	1926	1928	3
156	1931	1934	1937	1940	1942	1945	1948	1951	1953	1956	3
157	1959	1962	1965	1967	1970	1973	1976	1978	1981	1984	3
158	1987	1989	1992	1995	1998	2000	2003	2006	2009	2011	3
159	2014	2017	2019	2022	2025	2028	2030	2033	2036	2038	3
160	2041	2044	2047	2049	2052	2055	2057	2060	2063	2066	2
161	2068	2071	2074	2076	2079	2082	2084	2087	2090	2092	3
162	2095	2098	2101	2103	2106	2109	2111	2114	2117	2119	3
163	2122	2125	2127	2130	2133	2135	2138	2140	2143	2146	2
164	2148	2151	2154	2156	2159	2162	2164	2167	2170	2172	3
165	2175	2177	2180	2183	2185	2188	2191	2193	2196	2198	3
166	2201	2204	2206	2209	2212	2214	2217	2219	2222	2225	2
167	2227	2230	2232	2235	2238	2240	2243	2245	2248	2251	2
168	2253	2256	2258	2261	2263	2266	2269	2271	2274	2276	3
169	2279	2281	2284	2287	2289	2292	2294	2297	2299	2302	2
170	2304	2307	2310	2312	2315	2317	2320	2322	2325	2327	3
171	2330	2333	2335	2338	2340	2343	2345	2348	2350	2353	2
172	2355	2358	2360	2363	2365	2368	2370	2373	2375	2378	2
173	2380	2383	2385	2388	2390	2393	2395	2398	2400	2403	2
174	2405	2408	2410	2413	2415	2418	2420	2423	2425	2428	2
175	2430	2433	2435	2438	2440	2443	2445	2448	2450	2453	3
176	2455	2458	2460	2463	2465	2467	2470	2472	2475	2477	2
177	2480	2482	2485	2487	2490	2492	2494	2497	2499	2502	2
178	2504	2507	2509	2512	2514	2516	2519	2521	2524	2526	3
179	2529	2531	2533	2536	2538	2541	2543	2545	2548	2550	3
180	2553	2555	2558	2560	2562	2565	2567	2570	2572	2574	3
181	2577	2579	2582	2584	2586	2589	2591	2594	2596	2598	3
182	2601	2603	2605	2608	2610	2613	2615	2617	2620	2622	3
183	2625	2627	2629	2632	2634	2636	2639	2641	2643	2646	2
184	2648	2651	2653	2655	2658	2660	2662	2665	2667	2669	3
185	2672	2674	2676	2679	2681	2683	2686	2688	2690	2693	2
186	2695	2697	2700	2702	2704	2707	2709	2711	2714	2716	2
187	2718	2721	2723	2725	2728	2730	2732	2735	2737	2739	3
188	2742	2744	2746	2749	2751	2753	2755	2758	2760	2762	3
189	2765	2767	2769	2772	2774	2776	2778	2781	2783	2785	3
190	2788	2790	2792	2794	2797	2799	2801	2804	2806	2808	2
191	2810	2813	2815	2817	2819	2822	2824	2826	2828	2831	2
192	2833	2835	2838	2840	2842	2844	2847	2849	2851	2853	3
193	2856	2858	2860	2862	2865	2867	2869	2871	2874	2876	2
194	2878	2880	2882	2885	2887	2889	2891	2894	2896	2898	2
195	2900	2903	2905	2907	2909	2911	2914	2916	2918	2920	3
196	2923	2925	2927	2929	2931	2934	2936	2938	2940	2942	3
197	2945	2947	2949	2951	2953	2956	2958	2960	2962	2964	3
198	2967	2969	2971	2973	2975	2978	2980	2982	2984	2986	3
199	2989	2991	2993	2995	2997	2999	3002	3004	3006	3008	2

Nombres.	Log.	Arc.	Sin : Arc.	Tg : Arc.	Arc.	Sin : Arc.	Tg : Arc.
$1^{\circ} = 0,01745$	$\bar{2},2419$	$^q 0,00$	0,1961	0,1961	$^q 0,03$	0,1960	0,1964
$1' = 0,002909$	$\bar{4},4637$	0,01	0,1961	0,1962	0,04	0,1958	0,1967
$1'' = 0,0004848$	$\bar{6},6856$	0,02	0,1960	0,1963	0,05	0,1957	0,1970

## II. — ANTILOGARITHMES.

L.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
<b>00</b>	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	2
<b>01</b>	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	2
<b>02</b>	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	3
<b>03</b>	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	2
<b>04</b>	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	3
<b>05</b>	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	2
<b>06</b>	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	3
<b>07</b>	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	3
<b>08</b>	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	3
<b>09</b>	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	3
<b>10</b>	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	3
<b>11</b>	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	3
<b>12</b>	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	3
<b>13</b>	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	3
<b>14</b>	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	4
<b>15</b>	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	3
<b>16</b>	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	3
<b>17</b>	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	4
<b>18</b>	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	4
<b>19</b>	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	4
<b>20</b>	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	4
<b>21</b>	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	4
<b>22</b>	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	4
<b>23</b>	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1734	4
<b>24</b>	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	4
<b>25</b>	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	4
<b>26</b>	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	4
<b>27</b>	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	4
<b>28</b>	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	5
<b>29</b>	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	4
<b>30</b>	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	5
<b>31</b>	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	5
<b>32</b>	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	5
<b>33</b>	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	5
<b>34</b>	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	5
<b>35</b>	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	5
<b>36</b>	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	5
<b>37</b>	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	6
<b>38</b>	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	6
<b>39</b>	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	6
<b>40</b>	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	6
<b>41</b>	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	6
<b>42</b>	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	7
<b>43</b>	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	6
<b>44</b>	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	6
<b>45</b>	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	7
<b>46</b>	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	7
<b>47</b>	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	7
<b>48</b>	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	7
<b>49</b>	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	7
<b>50</b>	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	8
L.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.

ANTILOGARITHMES.

L.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	8
51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	7
52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	7
53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	8
54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	8
55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	9
56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	8
57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	9
58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882	8
59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972	9
60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	10
61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	10
62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256	10
63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	10
64	4365	4375	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457	10
65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	11
66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	10
67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775	11
68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	11
69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	12
70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	12
71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	12
72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	12
73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	12
74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	13
75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	5715	5728	5741	13
76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	13
77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	14
78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	14
79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295	15
80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6412	6427	6442	15
81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	15
82	6607	6622	6637	6652	6668	6683	6699	6714	6730	6745	16
83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	16
84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	16
85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7194	7211	7228	16
86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	17
87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	18
88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	17
89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	18
90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	18
91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299	19
92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	19
93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	20
94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	21
95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9057	9078	9099	21
96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311	22
97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9506	9528	22
98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	22
99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	23
00	10000	10023	10046	10069	10093	10116	10139	10162	10186	10209	24
L.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.

III. — LOGARITHMES D'ADDITION

Log (1 + x).

Log x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d
$\bar{5}$ ,	0,00 000	001	001	001	001	001	002	002	003	003	1
$\bar{4}$ ,	004	005	007	009	011	014	017	022	027	034	0
$\bar{3}$ , 0	0,00 043	044	045	047	048	049	050	051	052	053	2
1	055	056	057	059	060	061	063	064	066	067	2
2	069	070	072	074	075	077	079	081	083	085	2
3	087	089	091	093	095	097	099	102	104	106	3
4	109	111	114	117	119	122	125	128	131	134	3
$\bar{2}$ , 5	0,00 137	140	144	147	150	154	157	161	165	169	4
6	173	177	181	185	189	194	198	203	207	212	5
7	217	222	227	233	238	244	249	255	261	267	6
8	273	280	286	293	299	306	313	321	328	336	6
9	344	352	360	368	377	385	394	403	413	422	10
$\bar{1}$ , 0	0,0 0432	0442	0452	0463	0474	0485	0496	0507	0519	0531	12
1	0543	0556	0569	0582	0595	0609	0623	0638	0652	0667	12
2	0683	0699	0715	0731	0748	0766	0783	0801	0820	0839	12
3	0858	0878	0898	0919	0940	0962	0984	1006	1030	1053	12
4	1077	1102	1128	1153	1180	1207	1235	1263	1292	1322	20
$\bar{1}$ , 5	0,0 1352	1383	1415	1447	1480	1514	1549	1584	1621	1658	27
6	1695	1734	1774	1814	1856	1898	1941	1985	2030	2077	47
7	2124	2172	2221	2272	2323	2376	2430	2485	2541	2599	88
8	2657	2717	2779	2841	2905	2971	3037	3106	3175	3247	73
9	3320	3394	3470	3548	3627	3708	3790	3875	3961	4049	90
$\bar{1}$ , 00	0,0 4139	4148	4157	4167	4176	4185	4194	4203	4213	4222	9
01	4231	4240	4250	4259	4268	4278	4287	4297	4306	4315	10
02	4325	4334	4344	4353	4363	4373	4382	4392	4401	4411	10
03	4421	4430	4440	4450	4460	4469	4479	4489	4499	4509	10
04	4519	4528	4538	4548	4558	4568	4578	4588	4598	4608	10
$\bar{1}$ , 05	0,0 4618	4628	4639	4649	4659	4669	4679	4689	4700	4710	10
06	4720	4731	4741	4751	4762	4772	4782	4793	4803	4814	10
07	4824	4835	4845	4856	4867	4877	4888	4898	4909	4920	11
08	4931	4941	4952	4963	4974	4985	4995	5006	5017	5028	11
09	5039	5050	5061	5072	5083	5094	5105	5116	5127	5139	12
$\bar{1}$ , 10	0,0 5150	5161	5172	5183	5195	5206	5217	5229	5240	5251	12
11	5262	5274	5286	5297	5308	5320	5332	5343	5355	5366	12
12	5378	5390	5401	5413	5425	5436	5448	5460	5472	5484	12
13	5496	5508	5519	5531	5543	5555	5567	5579	5591	5603	12
14	5616	5628	5640	5652	5664	5677	5689	5701	5714	5726	12
$\bar{1}$ , 15	0,0 5738	5751	5763	5775	5788	5800	5813	5825	5838	5851	12
16	5863	5876	5889	5901	5914	5927	5939	5952	5965	5978	12
17	5991	6004	6017	6030	6043	6056	6069	6082	6095	6108	12
18	6121	6134	6147	6161	6174	6187	6200	6214	6227	6240	14
19	6254	6267	6281	6294	6308	6321	6335	6348	6362	6376	14
$\bar{1}$ , 20	0,0 6389	6403	6417	6430	6444	6458	6472	6486	6500	6513	14
21	6527	6541	6555	6569	6583	6597	6612	6626	6640	6654	14
22	6668	6683	6697	6711	6725	6740	6754	6769	6783	6798	14
23	6812	6827	6841	6856	6870	6885	6900	6914	6929	6944	14
24	6959	6973	6988	7003	7018	7033	7048	7063	7078	7093	15
$\bar{1}$ , 25	0,0 7108	7123	7138	7154	7169	7184	7199	7215	7230	7245	16
26	7261	7276	7291	7307	7322	7338	7354	7369	7385	7400	16
27	7416	7432	7448	7463	7479	7495	7511	7527	7543	7559	16
28	7575	7591	7607	7623	7639	7655	7671	7687	7704	7720	16
29	7736	7753	7769	7785	7802	7818	7835	7851	7868	7884	17
$\bar{1}$ , 30	0,0 7901	7918	7934	7951	7968	7985	8001	8018	8035	8052	17
31	8069	8086	8103	8120	8137	8154	8171	8188	8206	8223	17
32	8240	8257	8275	8292	8309	8327	8344	8362	8379	8397	17
33	8415	8432	8450	8468	8485	8503	8521	8539	8557	8574	18
34	8592	8610	8628	8646	8664	8683	8701	8719	8737	8755	18
$\bar{1}$ , 35	0,0 8774	8792	8810	8829	8847	8865	8884	8902	8921	8940	18
36	8958	8977	8996	9014	9033	9052	9071	9090	9108	9127	19
37	9146	9165	9184	9204	9223	9242	9261	9280	9299	9319	19
38	9338	9357	9377	9396	9416	9435	9455	9474	9494	9514	19
39	9533	9553	9573	9593	9612	9632	9652	9672	9692	9712	20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d

ET DE SOUSTRACTION.

$$\text{Log} \left( \frac{1}{1-x} \right).$$

Log x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d
<b>5,</b>	0,00 000	001	001	001	001	001	002	002	003	003	1
<b>4,</b>	004	005	007	009	011	014	017	022	027	035	2
<b>3, 0</b>	0,00 013	044	046	047	048	049	050	051	052	053	3
<b>1</b>	055	056	057	059	060	061	063	064	066	067	2
<b>2</b>	069	070	072	074	076	077	079	081	083	085	2
<b>3</b>	087	089	091	093	095	097	100	102	104	107	2
<b>4</b>	109	112	114	117	120	123	125	128	131	134	4
<b>5, 5</b>	0,00 138	141	144	147	151	154	158	162	165	169	4
<b>6</b>	173	177	181	186	190	194	199	204	208	213	5
<b>7</b>	218	223	229	234	239	245	251	256	262	269	6
<b>8</b>	275	281	288	295	302	309	316	323	331	338	6
<b>9</b>	346	354	363	371	380	389	398	407	417	426	10
<b>2, 0</b>	0,0 0476	0477	0457	0468	0479	0490	0502	0513	0525	0538	12
<b>1</b>	0550	0563	0576	0590	0604	0618	0632	0647	0662	0678	16
<b>2</b>	0694	0710	0727	0744	0761	0779	0798	0816	0836	0855	20
<b>3</b>	0875	0896	0917	0939	0961	0983	1006	1030	1054	1079	26
<b>4</b>	1105	1131	1158	1185	1213	1242	1271	1301	1332	1363	33
<b>5, 0</b>	0,0 1396	1429	1462	1497	1533	1569	1606	1644	1683	1723	41
<b>6</b>	1764	1806	1849	1893	1938	1985	2032	2080	2130	2181	52
<b>7</b>	2233	2286	2341	2397	2455	2514	2574	2636	2699	2764	66
<b>8</b>	2830	2899	2969	3040	3114	3189	3266	3345	3426	3509	83
<b>9</b>	3594	3682	3771	3863	3958	4054	4153	4255	4359	4466	110
<b>1, 00</b>	0,0 4576	4587	4598	4609	4620	4632	4643	4654	4666	4677	11
<b>01</b>	4688	4700	4711	4723	4734	4746	4757	4769	4780	4792	12
<b>02</b>	4804	4815	4827	4839	4851	4863	4874	4886	4898	4910	12
<b>03</b>	4922	4934	4946	4958	4970	4983	4995	5007	5019	5032	13
<b>04</b>	5044	5056	5069	5081	5093	5106	5118	5131	5143	5156	13
<b>1, 05</b>	0,0 5169	5181	5194	5207	5219	5232	5245	5258	5271	5284	18
<b>06</b>	5307	5310	5323	5336	5349	5362	5375	5388	5401	5415	13
<b>07</b>	5428	5441	5455	5468	5482	5495	5509	5522	5536	5549	14
<b>08</b>	5563	5577	5590	5604	5618	5632	5646	5659	5673	5687	14
<b>09</b>	5701	5715	5730	5744	5758	5772	5786	5800	5815	5829	16
<b>1, 10</b>	0,0 5844	5858	5872	5887	5901	5916	5931	5945	5960	5975	14
<b>11</b>	5989	6004	6019	6034	6049	6064	6079	6094	6109	6124	13
<b>12</b>	6129	6155	6170	6185	6200	6216	6231	6247	6262	6278	16
<b>13</b>	6293	6309	6324	6340	6356	6372	6387	6403	6419	6435	17
<b>14</b>	6451	6467	6483	6499	6516	6532	6548	6564	6581	6597	17
<b>1, 15</b>	0,0 6614	6630	6647	6663	6680	6696	6713	6730	6747	6763	17
<b>16</b>	6780	6797	6814	6831	6848	6865	6882	6900	6917	6934	17
<b>17</b>	6951	6969	6986	7004	7021	7039	7056	7074	7092	7110	17
<b>18</b>	7127	7145	7163	7181	7199	7217	7235	7253	7272	7290	18
<b>19</b>	7308	7327	7345	7363	7382	7401	7419	7438	7456	7475	19
<b>1, 20</b>	0,0 7494	7513	7532	7551	7570	7589	7608	7627	7646	7666	19
<b>21</b>	7685	7704	7724	7743	7763	7782	7802	7822	7842	7861	20
<b>22</b>	7881	7901	7921	7941	7961	7981	8002	8022	8042	8063	20
<b>23</b>	8083	8103	8124	8145	8165	8186	8207	8228	8248	8269	21
<b>24</b>	8290	8311	8333	8354	8375	8396	8418	8439	8461	8482	22
<b>1, 25</b>	0,0 8504	8525	8547	8569	8591	8613	8635	8657	8679	8701	22
<b>26</b>	8723	8745	8768	8790	8813	8835	8858	8880	8902	8926	23
<b>27</b>	8949	8972	8995	9018	9041	9064	9087	9110	9134	9157	24
<b>28</b>	9181	9204	9228	9252	9275	9299	9323	9347	9371	9395	25
<b>29</b>	9420	9444	9468	9493	9517	9542	9566	9591	9616	9640	26
<b>1, 30</b>	0,0 9665	9690	9715	9740	9766	9791	9816	9842	9867	9893	25
<b>31</b>	9918	9944	9970	9995	10021	10047	10073	10100	10126	10152	26
<b>32</b>	0,1 0178	0205	0231	0258	0285	0312	0338	0365	0392	0419	27
<b>33</b>	0446	0474	0501	0528	0556	0583	0611	0639	0667	0694	27
<b>34</b>	0722	0750	0779	0807	0835	0864	0892	0921	0949	0978	28
<b>1, 35</b>	0,1 1007	1036	1065	1094	1123	1152	1181	1211	1240	1270	29
<b>36</b>	1299	1329	1359	1389	1419	1449	1479	1510	1540	1571	29
<b>37</b>	1601	1632	1663	1693	1724	1755	1786	1818	1849	1880	30
<b>38</b>	1912	1944	1975	2007	2039	2071	2103	2135	2168	2200	32
<b>39</b>	2232	2265	2298	2330	2363	2396	2429	2463	2496	2529	34

III. (Suite.) — LOGARITHMES D'ADDITION

Log(1 + x).

Log x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d	
<b>1,40</b>	0,0	9732	9752	9773	9793	9813	9833	9853	9874	9894	9914	21
<b>41</b>		9935	9955	9976	9996	10017	10038	10058	10079	10100	10120	21
<b>42</b>	0,1	0141	0162	0183	0204	0225	0246	0267	0288	0309	0330	21
<b>43</b>		0351	0373	0394	0415	0437	0458	0479	0501	0522	0544	21
<b>44</b>		0565	0587	0609	0630	0652	0674	0696	0718	0739	0761	22
<b>1,45</b>	0,1	0783	0805	0827	0849	0872	0894	0916	0938	0960	0983	22
<b>46</b>		1005	1028	1050	1073	1095	1118	1140	1163	1185	1208	22
<b>47</b>		1231	1254	1277	1300	1323	1345	1368	1392	1415	1438	23
<b>48</b>		1461	1484	1507	1531	1554	1577	1601	1624	1648	1671	23
<b>49</b>		1695	1719	1742	1766	1790	1814	1837	1861	1885	1909	24
<b>1,50</b>	0,1	1933	1957	1981	2005	2030	2054	2078	2102	2127	2151	24
<b>51</b>		2175	2200	2224	2249	2274	2298	2323	2348	2372	2397	25
<b>52</b>		2422	2447	2472	2497	2522	2547	2572	2597	2622	2648	25
<b>53</b>		2673	2698	2724	2749	2775	2800	2826	2851	2877	2903	25
<b>54</b>		2928	2954	2980	3006	3032	3058	3084	3110	3136	3162	26
<b>1,55</b>	0,1	3188	3214	3240	3267	3293	3319	3346	3372	3399	3425	27
<b>56</b>		3452	3479	3505	3532	3559	3586	3613	3640	3667	3694	27
<b>57</b>		3721	3748	3775	3802	3829	3857	3884	3911	3939	3966	28
<b>58</b>		3994	4021	4049	4077	4104	4132	4160	4188	4216	4244	28
<b>59</b>		4272	4300	4328	4356	4384	4412	4441	4469	4497	4526	28
<b>1,60</b>	0,1	4554	4583	4611	4640	4668	4697	4726	4755	4783	4812	29
<b>61</b>		4841	4870	4899	4928	4957	4986	5016	5045	5074	5104	29
<b>62</b>		5133	5162	5192	5221	5251	5281	5310	5340	5370	5400	30
<b>63</b>		5430	5460	5489	5520	5550	5580	5610	5640	5670	5701	30
<b>64</b>		5731	5761	5792	5822	5853	5884	5914	5945	5976	6007	30
<b>1,65</b>	0,1	6037	6068	6099	6130	6161	6192	6224	6255	6286	6317	31
<b>66</b>		6349	6380	6411	6443	6474	6506	6538	6569	6601	6633	31
<b>67</b>		6665	6697	6729	6761	6793	6825	6857	6889	6921	6954	31
<b>68</b>		6986	7018	7051	7083	7116	7148	7181	7214	7247	7279	32
<b>69</b>		7312	7345	7378	7411	7444	7477	7510	7544	7577	7610	32
<b>1,70</b>	0,1	7643	7677	7710	7744	7777	7811	7845	7878	7912	7946	33
<b>71</b>		7980	8014	8048	8082	8116	8150	8184	8218	8253	8287	33
<b>72</b>		8322	8356	8390	8425	8460	8494	8529	8564	8599	8633	33
<b>73</b>		8668	8703	8738	8773	8808	8844	8879	8914	8949	8985	33
<b>74</b>		9020	9056	9091	9127	9163	9198	9234	9270	9306	9342	34
<b>1,75</b>	0,1	9378	9414	9450	9486	9522	9558	9595	9631	9667	9704	34
<b>76</b>		9740	9777	9813	9850	9887	9923	9960	9997	10034	10071	37
<b>77</b>	0,2	0108	0145	0182	0220	0257	0294	0331	0369	0406	0444	37
<b>78</b>		0481	0519	0557	0594	0632	0670	0708	0746	0784	0822	38
<b>79</b>		0860	0898	0937	0975	1013	1052	1090	1128	1167	1206	38
<b>1,80</b>	0,2	1244	1283	1322	1361	1399	1438	1477	1516	1556	1595	39
<b>81</b>		1634	1673	1712	1752	1791	1831	1870	1910	1949	1989	40
<b>82</b>		2029	2069	2109	2149	2189	2229	2269	2309	2349	2389	41
<b>83</b>		2430	2470	2510	2551	2591	2632	2673	2713	2754	2795	41
<b>84</b>		2836	2877	2918	2959	3000	3041	3082	3123	3165	3206	42
<b>1,85</b>	0,2	3247	3289	3330	3372	3414	3455	3497	3539	3581	3623	42
<b>86</b>		3665	3707	3749	3791	3833	3875	3918	3960	4003	4045	43
<b>87</b>		4088	4130	4173	4216	4258	4301	4344	4387	4430	4473	43
<b>88</b>		4516	4559	4603	4646	4689	4733	4776	4819	4863	4907	43
<b>89</b>		4950	4994	5038	5082	5126	5170	5214	5258	5302	5346	44
<b>1,90</b>	0,2	5390	5434	5479	5523	5568	5612	5657	5701	5746	5791	45
<b>91</b>		5836	5881	5926	5970	6016	6061	6106	6151	6196	6242	46
<b>92</b>		6287	6332	6378	6423	6469	6515	6560	6606	6652	6698	46
<b>93</b>		6744	6790	6836	6882	6928	6974	7021	7067	7114	7160	47
<b>94</b>		7207	7253	7300	7346	7393	7440	7487	7534	7581	7628	47
<b>1,95</b>	0,2	7675	7722	7769	7817	7864	7911	7959	8006	8054	8101	48
<b>96</b>		8149	8197	8245	8292	8340	8388	8436	8484	8532	8581	48
<b>97</b>		8629	8677	8726	8774	8822	8871	8920	8968	9017	9066	49
<b>98</b>		9115	9163	9212	9261	9310	9359	9409	9458	9507	9556	49
<b>99</b>		9606	9655	9705	9754	9804	9854	9903	9953	10003	10053	50



ET DE SOUSTRACTION.

$$\text{Log} \left( \frac{1}{1-x} \right).$$

Log x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d	
<b>1.40</b>	0,1	2503	2596	2630	2664	2698	2732	2766	2800	2834	2869	84
<b>41</b>		2903	2938	2973	3008	3043	3078	3113	3148	3184	3219	86
<b>42</b>		3255	3291	3326	3362	3398	3435	3471	3507	3544	3581	88
<b>43</b>		3617	3654	3691	3728	3766	3803	3840	3878	3916	3954	88
<b>44</b>		3992	4030	4068	4106	4145	4183	4222	4261	4300	4339	89
<b>1.45</b>	0,1	4378	4417	4457	4496	4536	4576	4616	4656	4696	4736	41
<b>46</b>		4777	4817	4858	4899	4940	4981	5022	5064	5105	5147	42
<b>47</b>		5189	5230	5273	5315	5357	5400	5442	5485	5528	5571	43
<b>48</b>		5614	5657	5701	5745	5788	5832	5876	5921	5965	6009	46
<b>49</b>		6054	6099	6144	6189	6234	6280	6325	6371	6417	6463	46
<b>1.50</b>	0,1	6509	6555	6602	6648	6695	6742	6789	6836	6884	6931	48
<b>51</b>		6979	7027	7075	7123	7172	7220	7269	7318	7367	7416	80
<b>52</b>		7466	7515	7565	7615	7665	7716	7766	7817	7867	7918	82
<b>53</b>		7970	8021	8072	8124	8176	8228	8280	8333	8385	8438	83
<b>54</b>		8491	8544	8598	8651	8705	8759	8813	8867	8922	8977	84
<b>1.55</b>	0,1	9031	9087	9142	9197	9253	9309	9365	9421	9478	9534	87
<b>56</b>	0,1	9591	9648	9706	9763	9821	9879	9937	9996	10054	10113	89
<b>57</b>	0,2	0172	0231	0291	0350	0410	0470	0531	0591	0652	0713	61
<b>58</b>		0774	0836	0897	0959	1021	1084	1146	1209	1272	1336	63
<b>59</b>		1399	1463	1527	1591	1656	1721	1786	1851	1916	1982	66
<b>1.60</b>	0,2	2048	2114	2181	2248	2315	2382	2450	2517	2585	2654	68
<b>61</b>		2722	2791	2860	2930	3000	3069	3140	3210	3281	3352	71
<b>62</b>		3423	3495	3567	3639	3712	3784	3857	3931	4004	4078	75
<b>63</b>		4153	4227	4302	4377	4453	4528	4604	4681	4758	4835	77
<b>64</b>		4912	4989	5067	5146	5224	5303	5382	5462	5542	5622	81
<b>1.65</b>	0,2	5703	5784	5865	5946	6028	6111	6193	6276	6359	6443	84
<b>66</b>		6527	6611	6696	6781	6867	6953	7039	7125	7212	7300	87
<b>67</b>		7387	7475	7564	7653	7742	7831	7921	8012	8103	8194	91
<b>68</b>		8285	8377	8470	8563	8656	8750	8844	8938	9033	9128	91
<b>69</b>	0,2	9224	9320	9417	9514	9612	9710	9808	9907	10006	10106	100
<b>1.70</b>	0,3	0206	0307	0408	0510	0612	0714	0818	0921	1025	1130	108
<b>71</b>		1235	1340	1446	1553	1660	1767	1876	1984	2093	2203	110
<b>72</b>		2313	2424	2535	2647	2759	2872	2985	3099	3214	3330	116
<b>73</b>		3445	3561	3678	3795	3914	4032	4151	4271	4392	4513	121
<b>74</b>		4634	4757	4880	5003	5127	5252	5378	5504	5631	5758	128
<b>1.75</b>	0,3	5886	6015	6145	6275	6406	6537	6670	6803	6936	7071	135
<b>76</b>		7206	7342	7479	7616	7754	7893	8033	8173	8314	8456	143
<b>77</b>	0,3	8599	8743	8887	9033	9179	9326	9473	9622	9771	9922	151
<b>78</b>	0,4	0073	0225	0378	0532	0686	0842	0999	1156	1315	1474	160
<b>79</b>		1634	1796	1958	2121	2285	2451	2617	2784	2953	3122	170
<b>1.80</b>	0,4	3292	3464	3636	3810	3985	4161	4338	4516	4695	4876	181
<b>81</b>		5057	5240	5424	5609	5796	5983	6172	6362	6554	6747	191
<b>82</b>		6941	7136	7333	7531	7730	7931	8133	8337	8542	8749	208
<b>83</b>	0,4	8957	9166	9377	9590	9804	10019	10236	10455	10675	10897	224
<b>84</b>	0,5	1121	1346	1573	1802	2033	2265	2499	2735	2973	3212	262
<b>1.85</b>	0,5	3454	3697	3942	4190	4439	4690	4943	5199	5456	5716	262
<b>86</b>		5978	6242	6508	6776	7047	7320	7596	7874	8154	8437	288
<b>87</b>	0,5	8722	9010	9300	9593	9889	10188	10489	10793	11100	11410	312
<b>88</b>	0,6	1722	2028	2337	2649	3004	3322	3663	3998	4336	4678	348
<b>89</b>		5023	5372	5721	6080	6440	6804	7171	7543	7919	8298	383
<b>1.90</b>	0,6	8683	9071	9464	9861	10263	10670	11081	11497	11918	12345	431
<b>91</b>	0,7	2776	3213	3656	4104	4558	5017	5483	5955	6433	6917	491
<b>92</b>		7408	7906	8411	8921	9442	9968	10503	11045	11595	12154	568
<b>93</b>	0,8	2722	3298	3883	4478	5082	5697	6321	6956	7602	8260	669
<b>94</b>		8929	9610	10303	11010	11730	12463	13211	13974	14752	15546	811
<b>1.95</b>	0,	9636	9719	9803	9890	9978	10069	10161	10256	10354	10453	103
<b>96</b>	1,	0556	0661	0769	0880	0994	1111	1232	1357	1485	1618	138
<b>97</b>		1756	1898	2046	2199	2357	2523	2695	2875	3063	3260	207
<b>98</b>		3467	3685	3915	4158	4416	4692	4986	5303	5646	6019	309
<b>1.99</b>		6428	6880	7387	7962	8626	9113	9737	10222	10738	11283	409
<b>1.999</b>		2,638	2,684	2,735	2,793	2,860	2,939	3,036	3,161	3,337	3,638	491
<b>1.9999</b>		3,638	3,684	3,735	3,793	3,860	3,939	4,036	4,161	4,337	4,638	598



$$y = \frac{1+x}{1-x}, \quad x = \frac{y-1}{y+1}$$

Log. x.	Log. y.											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d	
1.40	0,2	2295	2340	2403	2457	2511	2565	2619	2674	2729	2783	55
41		2818	2843	2919	3004	3060	3115	3171	3227	3283	3340	56
42		3396	3453	3509	3560	3623	3681	3738	3795	3853	3911	58
43		3999	4027	4085	4144	4202	4261	4320	4379	4438	4497	60
44		4557	4617	4676	4736	4797	4857	4917	4978	5039	5100	61
1.45	0,2	5161	5222	5284	5346	5407	5469	5531	5594	5656	5719	63
46		5782	5845	5908	5971	6035	6098	6162	6226	6291	6355	65
47		6420	6484	6549	6614	6680	6745	6811	6877	6943	7009	66
48		7075	7142	7208	7275	7342	7410	7477	7545	7613	7681	68
49		7749	7817	7886	7955	8024	8093	8162	8232	8302	8372	70
1.50	0,2	8442	8512	8583	8654	8725	8796	8867	8939	9011	9083	72
51		9155	9227	9300	9372	9446	9519	9592	9666	9740	9814	74
52	0,2	9888	9962	0037	0112	0187	0263	0338	0414	0490	0566	77
53	0,3	0643	0719	0796	0873	0951	1028	1106	1184	1262	1341	78
54		1419	1498	1578	1657	1737	1816	1897	1977	2058	2138	81
1.55	0,3	2219	2301	2382	2464	2546	2628	2711	2794	2877	2960	83
56		3043	3127	3211	3296	3380	3465	3550	3635	3721	3807	86
57		3893	3979	4066	4152	4240	4327	4415	4503	4591	4679	89
58		4768	4857	4946	5036	5126	5216	5306	5397	5488	5579	92
59		5671	5763	5855	5947	6040	6133	6226	6320	6413	6508	94
1.60	0,3	6622	6697	6792	6887	6983	7079	7175	7272	7369	7466	96
61		7564	7661	7760	7858	7957	8056	8155	8255	8355	8456	100
62		8556	8657	8759	8861	8963	9065	9168	9271	9374	9478	103
63	0,3	9584	9687	9792	9897	0002	0108	0214	0321	0428	0535	105
64	0,4	0643	0751	0859	0968	1077	1187	1297	1407	1518	1629	111
1.65	0,4	1740	1852	1964	2077	2190	2303	2417	2531	2645	2760	116
66		2876	2991	3108	3224	3341	3459	3576	3695	3813	3932	120
67		4052	4172	4292	4413	4534	4656	4778	4901	5024	5147	124
68		5271	5396	5521	5646	5772	5898	6025	6152	6280	6408	128
69		6536	6665	6795	6925	7056	7187	7318	7450	7583	7716	134
1.70	0,4	7830	7984	8118	8254	8399	8526	8667	8800	8937	9076	139
71	0,4	9215	9345	9494	9635	9776	9918	0060	0203	0346	0490	148
72	0,5	0635	0780	0925	1072	1219	1366	1514	1663	1813	1963	180
73		2113	2264	2416	2569	2722	2876	3030	3185	3341	3498	187
74		3655	3813	3971	4130	4290	4451	4612	4774	4937	5100	164
1.75	0,5	5264	5429	5594	5761	5928	6096	6264	6434	6604	6775	171
76		6946	7119	7292	7466	7641	7817	7993	8170	8349	8528	179
77	0,5	8707	8888	9070	9252	9435	9620	9805	9991	0178	0365	189
78	0,6	0554	0744	0935	1126	1319	1512	1707	1902	2098	2296	195
79		2491	2694	2894	3096	3298	3502	3707	3913	4120	4328	209
1.80	0,6	4537	4747	4958	5171	5384	5599	5815	6032	6251	6470	221
81		6691	6913	7137	7361	7587	7814	8043	8272	8503	8736	234
82	0,6	8970	9205	9442	9679	9919	0160	0402	0646	0891	1138	248
83	0,7	1386	1636	1887	2140	2395	2651	2909	3168	3429	3692	265
84		3957	4223	4491	4761	5032	5306	5581	5858	6137	6418	283
1.85	0,7	6701	6986	7273	7562	7852	8145	8441	8738	9037	9339	303
86	0,7	9642	9948	0257	0567	0880	1196	1514	1834	2157	2482	328
87	0,8	1810	3140	3473	3809	4148	4489	4833	5180	5530	5883	353
88		6238	6597	6959	7324	7693	8064	8439	8818	9199	9583	388
89		9973	0366	0762	1161	1566	1973	2383	2801	3220	3644	429
1.90	0,9	4073	4505	4943	5384	5831	6282	6738	7199	7665	8136	476
91		8612	9094	9581	0074	0573	1078	1589	2106	2629	3159	536
92	1,0	3695	4238	4788	5346	5911	6483	7063	7651	8247	8852	611
93		9466	0088	0719	1360	2011	2671	3342	4023	4716	5420	715
94	1,1	6135	6863	7603	8356	9123	9903	0695	1508	2333	3174	838
1.95	1,	2403	2491	2580	2671	2765	2860	2957	3057	3159	3264	107
96		3371	3480	3593	3709	3828	3950	4076	4205	4339	4476	143
97		4619	4766	4918	5076	5240	5410	5587	5772	5965	6167	211
98		6379	6601	6836	7084	7347	7628	7927	8249	8597	8971	414
99		9388	9846	0357	0937	1607	2398	3368	4617	6378	9388	
1.999		2,939	2,985	3,036	3,094	3,161	3,240	3,337	3,462	3,638	3,939	
1.9999		3,939	3,985	4,036	4,094	4,161	4,240	4,337	4,462	4,638	4,939	

V. — TABLE ABRÉGÉE POUR LE CALCUL

		1,0			1,000			1,000 0			1,000 000		
		0			000			0000 0			0000 000		
99	9956 3519 4597 550	409	9769	2423 491	4	2973	8851 434	429	9494 088	4	2995	152	
98	9912 2607 5692 495	406	0234 0114 073	4	2510 0180 206	425	6065 068	4	2360 857				
97	9867 7173 4266 245	402	0662 7574 711	4	2106 1465 634	421	2636 043	4	2126 563				
96	9822 7123 3039 568	398	1055 4148 350	4	1672 2707 716	416	9207 014	4	1692 268				
95	9777 2360 5288 848	394	1411 9176 137	4	1238 3906 453	412	5777 981	4	1227 974				
94	9731 2785 3599 699	390	1732 1997 412	4	0804 5061 842	408	2348 943	4	0823 679				
93	9684 8294 8553 935	386	2016 1949 703	4	0370 6173 883	403	8919 901	4	0389 385				
92	9637 8782 7345 555	382	2263 8368 718	3	9936 7242 575	399	5490 854	3	9955 090				
91	9590 4139 2321 094	378	2475 0588 342	3	9502 8617 918	395	2061 803	3	9520 796				
90	9542 4250 9139 325	374	2649 7940 624	3	9068 9249 910	390	8632 748	3	9086 502				
89	9493 9000 6644 913	370	2787 9755 775	3	8635 0188 551	386	5203 689	3	8652 207				
88	9444 8267 2150 169	366	2889 5362 161	3	8201 1083 840	382	1774 625	3	8217 913				
87	9395 1925 2618 619	362	2954 4086 295	3	7767 1935 775	377	8345 557	3	7783 618				
86	9344 9845 1243 568	358	2982 5252 828	3	7333 2744 357	373	4916 484	3	7349 324				
85	9294 1892 5714 293	354	2973 8184 548	3	6899 3509 583	369	1487 407	3	6915 029				
84	9242 7928 6061 882	350	2928 2202 368	3	6465 4231 454	364	8058 326	3	6480 735				
83	9190 7809 2376 074	346	2845 6625 320	3	6031 4909 969	360	4629 241	3	6046 441				
82	9138 1385 2383 717	342	2726 0720 551	3	5597 5545 125	356	1200 151	3	5612 146				
81	9084 8501 8878 650	338	2569 3933 310	3	5163 6136 924	351	7771 056	3	5177 852				
80	9030 8998 6991 944	334	2375 5486 950	3	4729 6685 364	347	4341 958	3	4713 557				
79	8976 2709 1290 441	330	2144 4682 911	3	4295 7190 443	343	0912 855	3	4309 263				
78	8920 9160 2690 480	326	1876 0850 720	3	3861 7652 161	338	7833 748	3	3874 968				
77	8864 9072 5172 482	322	1570 3207 982	3	3427 8070 518	334	4054 636	3	3440 674				
76	8808 1359 2280 791	318	1227 1330 370	3	2993 8445 512	330	0625 520	3	3006 379				
75	8750 6126 3391 709	314	0846 4251 624	3	2559 8777 143	325	7196 400	3	2572 085				
74	8692 3171 9730 976	310	0428 1363 537	3	2125 9065 409	321	3767 275	3	2137 799				
73	8633 2286 0120 456	305	9972 1915 951	3	1691 9310 310	317	0338 146	3	1703 496				
72	8573 3249 6431 268	301	9478 5356 751	3	1257 9511 845	312	6909 013	3	1269 202				
71	8512 5834 8719 075	297	8947 0831 856	3	0823 9670 012	308	3479 875	3	0834 997				
70	8450 9804 0014 257	293	8377 7685 210	3	0389 9784 812	304	0050 733	3	0400 613				
69	8388 4909 0737 255	289	7770 5208 778	2	9955 9856 244	299	6621 587	2	9966 318				
68	8325 0891 2706 236	285	7125 2691 538	2	9521 9884 305	295	3192 436	2	9532 024				
67	8260 7480 2700 826	281	6441 9124 470	2	9087 9808 997	290	9763 281	2	9097 729				
66	8195 4393 5541 869	277	5720 4600 553	2	8653 9810 317	286	6334 122	2	8663 435				
65	8129 1335 6642 856	273	4960 7774 757	2	8219 9708 264	282	2904 958	2	8229 140				
64	8061 7997 3983 887	269	4162 7959 029	2	7785 9562 839	277	9475 790	2	7794 846				
63	7993 4054 9153 582	265	3326 4523 297	2	7351 9374 040	273	6046 617	2	7360 551				
62	7923 9168 9498 254	261	2451 6745 450	2	6917 9141 866	269	2617 441	2	6926 257				
61	7853 2983 5010 767	257	1538 3901 341	2	6483 8866 316	264	9188 260	2	6491 963				
60	7781 5125 0383 644	253	0586 5264 770	2	6049 8547 390	260	5759 074	2	6057 668				
59	7708 5201 1612 144	248	9596 0107 485	2	5615 8185 087	256	2329 884	2	5623 374				
58	7634 2799 3562 937	244	8566 7699 167	2	5181 7779 405	251	8900 690	2	5189 079				
57	7558 7485 5672 491	240	7498 7307 426	2	4747 7330 344	247	5471 492	2	4751 785				
56	7481 8802 7006 200	236	6391 8197 793	2	4313 6837 902	243	2042 289	2	4320 490				
55	7403 6268 9194 244	232	5245 9633 711	2	3879 6302 083	238	8613 082	2	3886 196				
54	7323 9375 9822 969	228	4061 0876 528	2	3445 5722 878	234	5183 870	2	3451 901				
53	7242 7586 9600 789	224	2837 1185 487	2	3011 5100 292	230	1754 654	2	3017 607				
52	7160 0334 3634 799	220	1573 9817 720	2	2577 4434 323	225	8325 434	2	2583 312				
51	7075 7017 6097 936	216	0271 6028 242	2	2143 3724 969	221	4896 210	2	2149 018				
50	6989 7000 4336 019	211	8929 9069 938	2	1709 2972 230	217	1466 981	2	1714 724				

Les deux premiers chiffres significatifs de  $\frac{1}{n}$

n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n								
99	10	82	12	71	14	62	16	55	18	50	20	45	22	41	24	38	26	35	28	33	30
90	11	76	13	66	15	58	17	52	19	47	21	43	23	40	25	37	27	34	29	32	31



VI. — LOGARITHMES NATURELS

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
1,0	0,0000	0100	0198	0296	0392	0488	0583	0677	0770	0862	91
1,1	0953	1044	1133	1222	1310	1398	1484	1570	1655	1740	83
1,2	1823	1906	1989	2070	2151	2231	2311	2390	2469	2546	78
1,3	2624	2700	2776	2852	2927	3001	3075	3148	3221	3293	72
1,4	3365	3436	3507	3577	3646	3716	3784	3853	3920	3988	67
1,5	0,4055	4121	4187	4253	4318	4383	4447	4511	4574	4637	63
1,6	4700	4762	4824	4886	4947	5008	5068	5128	5188	5247	59
1,7	5306	5365	5423	5481	5539	5596	5653	5710	5766	5822	56
1,8	5878	5933	5988	6043	6098	6152	6206	6259	6313	6366	53
1,9	6419	6471	6523	6575	6627	6678	6729	6780	6831	6881	50
2,0	0,6931	6981	7031	7080	7129	7178	7227	7275	7324	7372	47
2,1	7419	7467	7514	7561	7608	7655	7701	7747	7793	7839	46
2,2	7885	7930	7975	8020	8065	8109	8154	8198	8242	8286	43
2,3	8329	8372	8416	8459	8502	8544	8587	8629	8671	8713	42
2,4	8755	8796	8838	8879	8920	8961	9002	9042	9083	9123	40
2,5	0,9163	9203	9243	9282	9322	9361	9400	9439	9478	9517	38
2,6	9555	9594	9632	9670	9708	9746	9783	9821	9858	9895	38
2,7	0,9933	9969	*0006	*0043	*0080	*0116	*0152	*0188	*0225	*0260	36
2,8	1,0296	0332	0367	0403	0438	0473	0508	0543	0578	0613	34
2,9	0647	0682	0716	0750	0784	0818	0852	0886	0919	0953	33
3,0	1,0986	1019	1053	1086	1119	1151	1184	1217	1249	1282	32
3,1	1314	1346	1378	1410	1442	1474	1506	1537	1569	1600	32
3,2	1632	1663	1694	1725	1756	1787	1817	1848	1878	1909	30
3,3	1939	1969	2000	2030	2060	2090	2119	2149	2179	2208	30
3,4	2238	2267	2296	2326	2355	2384	2413	2442	2470	2499	29
3,5	1,2528	2556	2585	2613	2641	2669	2698	2726	2754	2782	27
3,6	2809	2837	2865	2892	2920	2947	2975	3002	3029	3056	27
3,7	3083	3110	3137	3164	3191	3218	3244	3271	3297	3324	26
3,8	3350	3376	3403	3429	3455	3481	3507	3533	3558	3584	26
3,9	3610	3635	3661	3686	3712	3737	3762	3788	3813	3838	25
4,0	1,3863	3888	3913	3938	3962	3987	4012	4036	4061	4085	25
4,1	4110	4134	4159	4183	4207	4231	4255	4279	4303	4327	24
4,2	4351	4375	4398	4422	4446	4469	4493	4516	4540	4563	23
4,3	4586	4609	4633	4656	4679	4702	4725	4748	4770	4793	23
4,4	4816	4839	4861	4884	4907	4929	4951	4974	4996	5019	22
4,5	1,5041	5063	5085	5107	5129	5151	5173	5195	5217	5239	22
4,6	5261	5282	5304	5326	5347	5369	5390	5412	5433	5454	22
4,7	5476	5497	5518	5539	5560	5581	5602	5623	5644	5665	21
4,8	5686	5707	5728	5748	5769	5790	5810	5831	5851	5872	20
4,9	5892	5913	5933	5953	5974	5994	6014	6034	6054	6074	20
5,0	1,6094	6114	6134	6154	6174	6194	6214	6233	6253	6273	19
5,1	6292	6312	6332	6351	6371	6390	6409	6429	6448	6467	20
5,2	6487	6506	6525	6544	6563	6582	6601	6620	6639	6658	19
5,3	6677	6696	6715	6734	6752	6771	6790	6808	6827	6845	19
5,4	6864	6882	6901	6919	6938	6956	6974	6993	7011	7029	18
N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.

Caractéristiques fractionnaires, ou logarithmes de 10<sup>n</sup>.

n	+	-	n	+	-	n	+	-
1	2,3026	3,6974	6	13,8155	14,1845	11	25,3284	26,6716
2	4,6052	5,3948	7	16,1181	17,8819	12	27,6310	28,3690
3	6,9078	7,0922	8	18,4207	19,5793	13	29,9336	30,0664
4	9,2103	10,7897	9	20,7233	21,2767	14	32,2362	33,7638
5	11,5129	12,4871	10	23,0259	24,9741	15	34,5388	35,4612

OU HYPERBOLIQUES.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.
5,5	1,7047	7066	7084	7102	7120	7138	7156	7174	7192	7210	18
5,6	7228	7246	7263	7281	7299	7317	7334	7352	7370	7387	18
5,7	7405	7422	7440	7457	7475	7492	7509	7527	7544	7561	18
5,8	7579	7596	7613	7630	7647	7664	7681	7699	7716	7733	17
5,9	7750	7766	7783	7800	7817	7834	7851	7867	7884	7901	17
6,0	1,7918	7934	7951	7967	7984	8001	8017	8034	8050	8066	17
6,1	8083	8099	8116	8132	8148	8165	8181	8197	8213	8229	16
6,2	8245	8262	8278	8294	8310	8326	8342	8358	8374	8390	15
6,3	8405	8421	8437	8453	8469	8485	8500	8516	8532	8547	16
6,4	8563	8579	8594	8610	8625	8641	8656	8672	8687	8703	15
6,5	1,8718	8733	8749	8764	8779	8795	8810	8825	8840	8856	15
6,6	8871	8886	8901	8916	8931	8946	8961	8976	8991	9006	15
6,7	9021	9036	9051	9066	9081	9095	9110	9125	9140	9155	14
6,8	9169	9184	9199	9213	9228	9242	9257	9272	9286	9301	14
6,9	9315	9330	9344	9359	9373	9387	9402	9416	9430	9445	14
7,0	1,9459	9473	9488	9502	9516	9530	9544	9559	9573	9587	14
7,1	9601	9615	9629	9643	9657	9671	9685	9699	9713	9727	14
7,2	9741	9755	9769	9782	9796	9810	9824	9838	9851	9865	14
7,3	1,9879	9892	9906	9920	9933	9947	9961	9974	9988	0001	14
7,4	2,0015	0028	0042	0055	0069	0082	0096	0109	0122	0136	13
7,5	2,0149	0162	0176	0189	0202	0215	0229	0242	0255	0268	13
7,6	0281	0295	0308	0321	0334	0347	0360	0373	0386	0399	13
7,7	0412	0425	0438	0451	0464	0477	0490	0503	0516	0528	13
7,8	0541	0554	0567	0580	0592	0605	0618	0631	0643	0656	13
7,9	0669	0681	0694	0707	0719	0732	0744	0757	0769	0782	12
8,0	2,0794	0807	0819	0832	0844	0857	0869	0882	0894	0906	13
8,1	0919	0931	0943	0956	0968	0980	0992	1005	1017	1029	12
8,2	1041	1054	1066	1078	1090	1102	1114	1126	1138	1150	13
8,3	1163	1175	1187	1199	1211	1223	1235	1247	1258	1270	12
8,4	1282	1294	1306	1318	1330	1342	1353	1365	1377	1389	12
8,5	2,1401	1412	1424	1436	1448	1459	1471	1483	1494	1506	12
8,6	1518	1529	1541	1552	1564	1576	1587	1599	1610	1622	11
8,7	1633	1645	1656	1668	1679	1691	1702	1713	1725	1736	12
8,8	1748	1759	1770	1782	1793	1804	1815	1827	1838	1849	12
8,9	1861	1872	1883	1894	1905	1917	1928	1939	1950	1961	11
9,0	2,1972	1983	1994	2006	2017	2028	2039	2050	2061	2072	11
9,1	2083	2094	2105	2116	2127	2138	2148	2159	2170	2181	11
9,2	2192	2203	2214	2225	2235	2246	2257	2268	2279	2289	11
9,3	2300	2311	2322	2332	2343	2354	2364	2375	2386	2396	11
9,4	2407	2418	2428	2439	2450	2460	2471	2481	2492	2502	11
9,5	2,2513	2523	2534	2544	2555	2565	2576	2586	2597	2607	11
9,6	2618	2628	2638	2649	2659	2670	2680	2690	2701	2711	10
9,7	2721	2732	2742	2752	2762	2773	2783	2793	2803	2814	10
9,8	2824	2834	2844	2854	2865	2875	2885	2895	2905	2915	10
9,9	2925	2935	2946	2956	2966	2976	2986	2996	3006	3016	10
N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d.

Nombres usuels avec leurs logarithmes naturels.

Nombres.	Log.	Nombres.	Log.
Rapp. de la circ. au diam. = $\pi$ .	1,1447	Pesanteur $g = 9,8088$ .	2,2833
Rayon en minutes = $3438'$ .	8,1426	$\sqrt{2g} = 4,4292$ .	1,4882
Rayon en secondes = $206265''$ .	12,2369	$\frac{\pi}{1000} = 0,0031$ .	0,0031
Log. vulg. $e = M = 0,4343$ .	7,1660	$\sqrt{g}$	
Log. nat. $10 = \frac{1}{M} = 2,3026$ .	0,8340	Pend. à sec. = $\frac{g}{\pi^2} = 0,9938$ .	7,9938
		$e^e = 15,1513$ .	2,7183

VII. — TABLE ABRÉGÉE POUR LE CALCUL DES LOGARITHMES NATURELS A 20 DÉCIMALES.

<b>9</b>	2,1972 2457 7336 2193 8279	<b>1,0' 9</b>	0,0000 0899 9959 5002 4300
<b>8</b>	2,0794 4154 1679 8359 2825	<b>1,0' 8</b>	799 9968 0001 7067
<b>7</b>	1,9129 1014 9055 3133 0511	<b>1,0' 7</b>	699 9975 5001 1433
<b>6</b>	1,7917 5946 9228 0550 0081	<b>1,0' 6</b>	599 9982 0000 7200
<b>5</b>	1,6091 3791 2434 1003 7460	<b>1,0' 5</b>	499 9987 5000 4167
<b>4</b>	1,3862 9436 1119 8906 1883	<b>1,0' 4</b>	399 9992 0000 2133
<b>3</b>	1,0986 1228 8668 1096 9140	<b>1,0' 3</b>	299 9995 5000 0900
<b>2</b>	0,6931 4718 0559 9453 0942	<b>1,0' 2</b>	199 9998 0000 0267
		<b>1,0' 1</b>	099 9999 5000 0033
<b>1,9</b>	0,6418 5388 6172 3947 7599	<b>1,0' 9</b>	0,0000 0089 9999 5950 0024
<b>1,8</b>	5877 8666 4902 1190 0819	<b>1,0' 8</b>	79 9999 6800 0317
<b>1,7</b>	5306 2825 1062 1703 9623	<b>1,0' 7</b>	69 9999 7550 0011
<b>1,6</b>	4700 0362 9145 7355 5365	<b>1,0' 6</b>	59 9999 8200 0007
<b>1,5</b>	4054 6510 8108 1643 8198	<b>1,0' 5</b>	49 9999 8750 0004
<b>1,4</b>	3364 7221 6621 2129 3050	<b>1,0' 4</b>	39 9999 9200 0002
<b>1,3</b>	2623 6426 4467 4910 5204	<b>1,0' 3</b>	29 9999 9550 0001
<b>1,2</b>	1823 2155 6793 9346 2621	<b>1,0' 2</b>	19 9999 9800 0000
<b>1,1</b>	0933 1017 9804 3248 6004	<b>1,0' 1</b>	09 9999 9950 0000
<b>1,09</b>	0,0861 7769 6241 0523 3234	<b>1,0' 9</b>	0,0000 0008 9999 9959 5000
<b>1,08</b>	769 6104 1136 1283 2498	<b>1,0' 8</b>	7 9999 9968 0000
<b>1,07</b>	676 5864 8473 8148 0527	<b>1,0' 7</b>	6 9999 9975 5000
<b>1,06</b>	582 0890 8123 9757 7553	<b>1,0' 6</b>	5 9999 9982 0000
<b>1,05</b>	487 9016 4169 4320 0307	<b>1,0' 5</b>	4 9999 9987 5000
<b>1,04</b>	392 2071 3153 2812 9627	<b>1,0' 4</b>	3 9999 9992 0000
<b>1,03</b>	295 5880 2241 5444 0273	<b>1,0' 3</b>	2 9999 9995 5000
<b>1,02</b>	198 0262 7296 1797 1303	<b>1,0' 2</b>	1 9999 9998 0000
<b>1,01</b>	099 5033 0853 1680 8285	<b>1,0' 1</b>	0 9999 9999 5000
<b>1,009</b>	0,0089 5974 1371 4719 0444	<b>1,0' 9</b>	0,0000 0010 8999 9999 5950
<b>1,008</b>	79 6816 9649 1768 7351	<b>1,0' 8</b>	799 9999 6800
<b>1,007</b>	69 7561 3736 4252 4210	<b>1,0' 7</b>	699 9999 7550
<b>1,006</b>	59 8207 1677 5474 6378	<b>1,0' 6</b>	599 9999 8200
<b>1,005</b>	49 8754 1511 0390 7361	<b>1,0' 5</b>	499 9999 8750
<b>1,004</b>	39 9202 1269 5374 5300	<b>1,0' 4</b>	399 9999 9200
<b>1,003</b>	29 9650 8979 7984 7881	<b>1,0' 3</b>	299 9999 9650
<b>1,002</b>	19 9800 2662 6730 5602	<b>1,0' 2</b>	199 9999 9800
<b>1,001</b>	09 9950 0333 0835 3317	<b>1,0' 1</b>	099 9999 9950
<b>1,0' 9</b>	0,0008 9959 5742 8360 9301	<b>1,0' 9</b>	0,0000 0000 0899 9999 9960
<b>1,0' 8</b>	7 9968 0170 5643 3216	<b>1,0' 8</b>	799 9999 9968
<b>1,0' 7</b>	6 9975 5114 2733 4193	<b>1,0' 7</b>	699 9999 9976
<b>1,0' 6</b>	5 9982 0071 9676 1554	<b>1,0' 6</b>	599 9999 9982
<b>1,0' 5</b>	4 9987 5041 6510 4791	<b>1,0' 5</b>	499 9999 9986
<b>1,0' 4</b>	3 9992 0021 3269 3537	<b>1,0' 4</b>	399 9999 9992
<b>1,0' 3</b>	2 9995 5008 9979 7549	<b>1,0' 3</b>	299 9999 9996
<b>1,0' 2</b>	1 9998 0002 6662 6673	<b>1,0' 2</b>	199 9999 9998
<b>1,0' 1</b>	0 9999 5000 3333 0834	<b>1,0' 1</b>	100 0000 0000
<b>1,0' 9</b>	0,0000 8999 5950 2429 8360	<b>1,0' 9</b>	0,0000 0000 0079 0000 0000
<b>1,0' 8</b>	7999 6800 1706 5643	<b>1,0' 8</b>	89 0000 0000
<b>1,0' 7</b>	6999 7550 1143 2733	<b>1,0' 7</b>	79 0000 0000
<b>1,0' 6</b>	5999 8200 0719 9676	<b>1,0' 6</b>	69 0000 0000
<b>1,0' 5</b>	4999 8750 0416 6510	<b>1,0' 5</b>	59 0000 0000
<b>1,0' 4</b>	3999 9200 0213 3269	<b>1,0' 4</b>	49 0000 0000
<b>1,0' 3</b>	2999 9650 0089 9980	<b>1,0' 3</b>	39 0000 0000
<b>1,0' 2</b>	1999 9800 0026 6663	<b>1,0' 2</b>	29 0000 0000
<b>1,0' 1</b>	0999 9950 0003 3333	<b>1,0' 1</b>	19 0000 0000

n	Log 10 <sup>n</sup> .	n	Log 10 <sup>n</sup> .
<b>1</b>	2,3025 8509 2994 0456 8402	<b>11</b>	25,3284 3602 2934 5055 2420
<b>2</b>	4,6051 7018 5988 0913 6804	<b>12</b>	27,6310 2111 5928 5482 0822
<b>3</b>	6,9077 5527 8982 1370 5205	<b>13</b>	29,9336 0620 8922 5938 9223
<b>4</b>	9,2103 4037 1976 1827 3607	<b>14</b>	32,2361 9130 1916 6395 7625
<b>5</b>	11,5129 2546 4970 2284 2009	<b>15</b>	34,5387 7639 4910 6852 6027
<b>6</b>	13,8155 1055 7964 2741 0411	<b>16</b>	36,8413 6148 7904 7309 4429
<b>7</b>	16,1180 9565 0958 3197 8813	<b>17</b>	39,1439 4658 0898 7766 2831
<b>8</b>	18,4206 8074 3952 3654 7214	<b>18</b>	41,4465 3167 3892 8223 1232
<b>9</b>	20,7232 6583 6946 4111 5616	<b>19</b>	43,7491 1676 6886 8679 9614
<b>10</b>	23,0258 5092 9940 4568 4018	<b>20</b>	46,0517 0185 9880 9136 8036





IX. — VALEURS NATURELLES

Arc.		Sinus	Coséc	Tang	Cotang.	Séc.	Cos.			
R o,	0 <sup>h</sup> m	o, o, o'	∞	o,	∞	1,0000	1,0000	0° 90'	5 <sup>h</sup>	R
o,	o,	o,	∞	o,	∞	1,0000	1,0000	0° 90'	m	R
0000	0	0000	∞	0000	∞	1,0000	1,0000	0° 90'	60	1,5708
0044	1	0044	229,1838	0044	229,1817	0000	0000	45	59	5664
0087	2	0087	114,5930	0087	114,5887	0000	0000	30	58	5621
0131	3	0131	76,3966	0131	76,3900	0001	0,9999	15	57	5577
0175	4	0175	57,2987	0175	57,2900	1,0002	0,9998	0 89	56	1,5533
0218	5	0218	45,8403	0218	45,8394	0002	9998	45	55	5490
0262	6	0262	38,2016	0262	38,1885	0003	9997	30	54	5446
0305	7	0305	32,7455	0306	32,7303	0005	9995	15	53	5403
0349	8	0349	28,6537	0349	28,6363	1,0006	0,9994	0 84	52	1,5359
0393	9	0393	25,4713	0393	25,4517	0008	9992	45	51	5315
0436	10	0436	22,9256	0437	22,9038	0010	9990	30	50	5272
0480	11	0480	20,8428	0480	20,8188	0012	9988	15	49	5228
0524	12	0524	19,1073	0524	19,0811	1,0014	0,9986	0 87	48	1,5184
0567	13	0567	17,6389	0568	17,6106	0016	9984	45	47	5141
0611	14	0611	16,3804	0612	16,3499	0019	9981	30	46	5097
0654	15	0654	15,2898	0655	15,2571	0021	9979	15	45	5053
0698	16	0698	14,3356	0699	14,3007	1,0024	0,9976	0 86	44	1,5010
0742	17	0742	13,4937	0743	13,4566	0028	9973	45	43	4966
0785	18	0785	12,7455	0787	12,7062	0031	9969	30	42	4923
0829	19	0828	12,0761	0831	12,0346	0034	9966	15	41	4879
0873	20	0872	11,4737	0875	11,4301	1,0038	0,9962	0 85	40	1,4835
0916	21	0915	10,9288	0919	10,8829	0042	9958	45	39	4792
0960	22	0958	10,4334	0963	10,3854	0046	9954	30	38	4748
1004	23	1002	9,9842	1007	9,9310	0051	9950	15	37	4704
1047	24	1045	9,5608	1051	9,5144	1,0055	0,9945	0 84	36	1,4661
1091	25	1089	9,1855	1055	9,1399	0060	9941	45	35	4617
1134	26	1131	8,8337	1139	8,7769	0065	9936	30	34	4573
1178	27	1175	8,5079	1184	8,4490	0070	9931	15	33	4530
1222	28	1219	8,2055	1228	8,1443	1,0075	0,9925	0 83	32	1,4486
1265	29	1262	7,9240	1272	7,8606	0081	9920	45	31	4443
1309	30	1305	7,6613	1317	7,5958	0086	9914	30	30	4399
1353	31	1349	7,4156	1361	7,3479	0092	9909	15	29	4355
1396	32	1392	7,1853	1405	7,1154	1,0098	0,9903	0 82	28	1,4312
1440	33	1435	6,9690	1450	6,8969	0105	9897	45	27	4268
1484	34	1478	6,7655	1455	6,6912	0111	9890	30	26	4224
1527	35	1521	6,5736	1530	6,4971	0118	9884	15	25	4181
1571	36	1564	6,3925	1584	6,3138	1,0125	0,9877	0 81	24	1,4137
1614	37	1607	6,2211	1629	6,1402	0132	9870	45	23	4094
1658	38	1650	6,0589	1673	5,9758	0139	9863	30	22	4050
1702	39	1693	5,9049	1718	5,8197	0147	9856	15	21	4006
1745	40	1736	5,7588	1763	5,6713	1,0154	0,9848	0 80	20	1,3963
1789	41	1779	5,6198	1808	5,5301	0162	9840	45	19	3919
1833	42	1822	5,4874	1853	5,3955	0170	9833	30	18	3875
1876	43	1865	5,3612	1899	5,2672	0179	9825	15	17	3832
1920	44	1908	5,2408	1944	5,1440	1,0187	0,9816	0 79	16	1,3788
1963	45	1951	5,1258	1989	5,0273	0196	9808	45	15	3744
2007	46	1994	5,0159	2035	4,9152	0205	9799	30	14	3701
2051	47	2036	4,9106	2080	4,8077	0214	9790	15	13	3657
2094	48	2079	4,8097	2126	4,7046	1,0223	0,9781	0 78	12	1,3614
2138	49	2122	4,7130	2171	4,6057	0233	9772	45	11	3570
2182	50	2164	4,6202	2217	4,5107	0243	9763	30	10	3526
2225	51	2207	4,5311	2263	4,4194	0253	9753	15	9	3483
2269	52	2250	4,4454	2309	4,3315	1,0263	0,9744	0 77	8	1,3434
2313	53	2292	4,3630	2355	4,2468	0273	9734	45	7	3395
2356	54	2334	4,2837	2401	4,1653	0284	9724	30	6	3352
2400	55	2377	4,2072	2447	4,0867	0295	9713	15	5	3308
2443	56	2419	4,1336	2493	4,0108	1,0306	9703	0 76	4	1,3265
2487	57	2462	4,0625	2540	3,9375	0317	9692	45	3	3221
2531	58	2504	3,9939	2586	3,8667	0329	9681	30	2	3177
2574	59	2546	3,9277	2633	3,7983	0341	9670	15	1	3134
2618	60	2588	3,8637	2679	3,7321	1,0353	9659	0 75	0	1,3090
o,	m	o,	o,	o,	o,	o,	o,	'	n	R
R	0 <sup>h</sup>	o, o'		o,					5 <sup>h</sup>	R
		Cos.	Séc.	Cotg.	Tang.	Coséc.	Sinus.			Arc.

DES FONCTIONS CIRCULAIRES.

Arc.		Sinus	Coséc	Tang	Cotang.	Séc.	Cos.		
R	h	o,		o,			o,	4 <sup>h</sup>	R
o,	m	°		°			°	m	
2618	0	15 0	2588	3,8637	2679	3,7321	1,0353	60	1,3090
2662	1	15	2630	8018	2736	6680	0365	59	3046
2705	2	30	2672	7420	2773	6659	0377	58	3003
2749	3	45	2714	6840	2820	5457	0390	57	2959
2793	4	16 0	2756	3,6280	2867	3,4874	1,0403	56	1,2915
2836	5	15	2798	5736	2915	4308	0416	55	2872
2880	6	30	2840	5209	2962	3759	0429	54	2828
2923	7	45	2882	4699	3010	3226	0443	53	2785
2967	8	17 0	2924	3,4203	3057	3,2709	1,0457	52	1,2741
3011	9	15	2965	3722	3103	2205	0471	51	2697
3054	10	30	3007	3255	3153	1716	0485	50	2654
3098	11	45	3049	2801	3201	1240	0500	49	2610
3142	12	18 0	3090	3,2361	3249	3,0777	1,0515	48	1,2566
3185	13	15	3132	1932	3298	3,0326	0530	47	2522
3229	14	30	3173	1515	3346	2,9887	0545	46	2479
3272	15	45	3214	1110	3395	9459	0560	45	2435
3316	16	19 0	3256	3,0716	3443	2,9042	1,0576	44	1,2392
3360	17	15	3297	3,0331	3492	8636	0592	43	2348
3403	18	30	3338	2,9937	3541	8239	0608	42	2305
3447	19	45	3379	9593	3590	7852	0625	41	2261
3491	20	20 0	3420	2,9238	3640	2,7475	1,0642	40	1,2217
3534	21	15	3461	8892	3689	7106	0659	39	2174
3578	22	30	3502	8555	3739	6746	0676	38	2130
3622	23	45	3543	8225	3789	6395	0692	37	2086
3666	24	21 0	3584	2,7904	3839	2,6051	1,0711	36	1,2043
3709	25	15	3624	7591	3889	5715	0730	35	1999
3752	26	30	3665	7285	3939	5386	0748	34	1956
3796	27	45	3706	6986	3990	5065	0766	33	1912
3840	28	22 0	3746	2,6095	4040	2,4751	1,0785	32	1,1868
3883	29	15	3786	6410	4091	4443	0804	31	1825
3927	30	30	3827	6131	4142	4142	0824	30	1781
3971	31	45	3867	5859	4193	3847	0844	29	1737
4014	32	23 0	3907	2,5093	4245	2,3559	1,0864	28	1,1694
4058	33	15	3947	5333	4296	3276	0884	27	1650
4102	34	30	3987	5078	4348	2998	0904	26	1606
4145	35	45	4027	4810	4400	2727	0925	25	1563
4189	36	24 0	4067	2,4586	4452	2,2400	1,0946	24	1,1519
4232	37	15	4107	4348	4505	2199	0968	23	1476
4276	38	30	4147	4114	4557	1913	0989	22	1432
4320	39	45	4187	3886	4610	1692	1011	21	1388
4363	40	25 0	4226	2,3662	4663	2,1445	1,1034	20	1,1345
4407	41	15	4266	3413	4716	1203	1056	19	1301
4451	42	30	4305	3228	4770	9965	1079	18	1257
4494	43	45	4344	3018	4823	9732	1102	17	1214
4538	44	26 0	4384	2,2812	4877	2,0303	1,1126	16	1,1170
4581	45	15	4423	2610	4931	0278	1150	15	1126
4625	46	30	4462	2412	4986	2,0057	1174	14	1083
4669	47	45	4501	2217	5040	19810	1198	13	1039
4712	48	27 0	4540	2,2027	5095	1,9626	1,1223	12	1,0996
4756	49	15	4579	1840	5150	9116	1248	11	1052
4800	50	30	4617	1657	5206	9210	1274	10	1008
4843	51	45	4656	1477	5261	9007	1300	9	965
4887	52	28 0	4695	2,1301	5317	1,8807	1,1336	8	1,0821
4931	53	15	4733	1127	5373	8611	1352	7	9777
4974	54	30	4772	9957	5430	8418	1379	6	9734
5018	55	45	4810	9791	5486	8228	1406	5	9690
5061	56	29 0	4848	2,0627	5543	1,8040	1,1434	4	1,0647
5105	57	15	4886	0466	5600	7856	1461	3	9603
5149	58	30	4924	0308	5658	7675	1490	2	9559
5192	59	45	4962	0152	5715	7496	1518	1	9516
5236	60	30 0	5000	2,0000	5774	1,7321	1,1547	0	1,0472
o,	1 <sup>h</sup>	°	o,		o,			4 <sup>h</sup>	R
R			Cos.	Séc.	Cotg.	Tang.	Coséc.	Sinus.	Arc.



**X. — LOGARITHMES DES FONCTIONS CIRCULAIRES DE MINUTE EN MINUTE**  
 pour les 100 premières minutes, et de 10 en 10 minutes pour le reste du quadrant.

Arc.	Sin.	Tang.	Cotg.	Cos.	Arc.	Sin.	Tang.	Cotg.	Cos.	
0° 0'				0,0000	0° 90'				0,0000	
1	4,6637	7,4637	3,5363	0000	59	2,2419	2,2419	1,7581	1,9999	
2	7648	7648	2352	0000	58	2490	2490	7509	9999	
3	1,948	1,9408	3,0592	0000	57	2561	2562	7438	9999	
4	3,0658	3,0658	2,9342	0000	56	2630	2631	7369	9999	
5	1627	1627	8373	0000	55	2699	2700	7300	9999	
0 6	3,2419	3,2419	2,7581	0,0000	54 89	2766	2767	7233	9999	
7	3088	3088	6912	0000	53	2832	2833	7167	1,9999	
8	3668	3668	6332	0000	52	2898	2899	7101	9999	
9	4180	4180	5820	0000	51	2962	2963	7037	9999	
10	4637	4637	5363	0000	50	3025	3026	6974	9999	
11	5051	5051	4949	0000	49	3088	3089	6911	9999	
0 12	3,5429	3,5429	2,4571	0,0000	48 89	3150	3150	6850	9999	
13	5777	5777	4223	0000	47	2,3210	2,3211	1,6789	1,9999	
14	6099	6099	3901	0000	46	3270	3271	6729	9999	
15	6398	6398	3602	0000	45	3329	3330	6670	9999	
16	6678	6678	3322	0000	44	3388	3389	6611	9999	
17	6942	6942	3058	0000	43	3445	3446	6554	9999	
0 18	3,7190	3,7190	2,2810	0,0000	42 89	3502	3503	6497	9999	
19	7425	7425	2575	0000	41	2,3558	2,3559	1,6441	1,9999	
20	7648	7648	2352	0000	40	3613	3614	6386	9999	
21	7859	7860	2140	0000	39	3668	3669	6331	9999	
22	8061	8062	1938	0000	38	3722	3723	6277	9999	
23	8255	8255	1745	0000	37	3775	3776	6224	9999	
0 24	3,8439	3,8439	2,1561	0,0000	36 89	3828	3829	6171	9999	
25	8617	8617	1383	0000	35	2,3880	2,3881	1,6119	1,9999	
26	8787	8787	1213	0000	34	3931	3932	6068	9999	
27	8951	8951	1049	0000	33	3982	3983	6017	9999	
28	9109	9109	891	0000	32	4032	4033	5967	9999	
29	9261	9261	739	0000	31	4082	4083	5917	9999	
0 30	3,9408	3,9408	2,0591	0,0000	30 89	4131	4132	5868	9999	
31	9511	9511	549	0000	29	2,4179	2,4181	1,5819	1,9999	
32	9689	9689	0311	0000	28	4227	4229	5771	9998	
33	9822	9823	0177	0000	27	4275	4276	5724	9998	
34	3,9952	3,9952	2,0048	0000	26	4322	4323	5677	9998	
35	2,0078	2,0078	1,9922	0000	25	4368	4370	5630	9998	
0 36	2,0200	2,0200	1,9800	0,0000	24 89	4414	4416	5584	9998	
37	0319	0319	9681	0000	23	2,4459	2,4461	1,5539	1,9998	
38	0435	0435	9565	0000	37	4504	4506	5491	9998	
39	0548	0548	9452	0000	38	4549	4551	5449	9998	
40	0658	0658	9342	0000	39	4593	4595	5405	9998	
41	0765	0765	9235	0000	40	4637	4638	5362	9998	
0 42	2,0870	2,0870	1,9130	0,0000	19	5050	5053	4917	9998	
43	0972	0972	9028	0000	24 89	2,4461	2,4461	1,5539	1,9997	
44	1072	1072	8928	0000	17	4504	4506	5491	9998	
45	1169	1170	8830	0000	37	4549	4551	5449	9998	
46	1265	1265	8735	0000	38	4593	4595	5405	9998	
47	1358	1359	8641	0000	39	4637	4638	5362	9998	
0 48	2,1450	2,1450	1,8550	0,0000	20	5050	5053	4917	9998	
49	1539	1540	8560	0000	19	2,4461	2,4461	1,5539	1,9997	
50	1627	1627	8473	0000	10	4504	4506	5491	9998	
51	1713	1713	8387	0000	20	4549	4551	5449	9998	
52	1797	1798	8302	0,0000	30	4593	4595	5405	9998	
53	1880	1880	8210	1,9999	40	4637	4638	5362	9998	
0 54	2,1961	2,1962	1,8038	1,9999	50	5050	5053	4917	9998	
55	2041	2041	7959	9999	3 0	2,7188	2,7194	1,2806	1,9994	
56	2119	2120	7880	9999	10	7423	7429	2571	9993	
57	2196	2196	7804	9999	20	7645	7652	2348	9993	
58	2271	2272	7728	9999	30	7857	7865	2135	9992	
59	2346	2346	7654	9999	40	8059	8067	1933	9991	
1 0	2,2419	2,2419	1,7581	1,9999	50	8251	8261	1739	9990	
	Cos.	Cotg.	Tang.	Sin.	Arc.	Cos.	Cotg.	Tang.	Sin.	Arc.
					0 89	2,9403	2,9420	1,0580	1,9983	0 85









DE SIX EN SIX MINUTES, OU DE DIXIÈME EN DIXIÈME DE DEGRÉ.

Log. cosinus.

Deg.	0°.0 0°.1 0°.2 0°.3 0°.4					0°.5 0°.6 0°.7 0°.8 0°.9 1°.0						Deg.
	0'	6'	12'	18'	24'	30'	36'	42'	48'	54'	60'	
0	0,0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	9999	9999	89
1	1,9999	9999	9999	9999	9999	9999	9998	9998	9998	9998	9997	88
2	9997	9997	9997	9996	9996	9996	9996	9995	9994	9994	9994	87
3	9994	9994	9993	9993	9991	9992	9991	9991	9990	9990	9989	86
4	9989	9989	9988	9988	9987	9987	9987	9985	9985	9984	9983	85
5	1,9983	9983	9981	9981	9981	9980	9979	9978	9978	9977	9976	84
6	9976	9975	9975	9974	9973	9972	9971	9970	9969	9968	9968	83
7	9968	9967	9966	9965	9964	9963	9962	9961	9960	9959	9958	82
8	9958	9956	9955	9954	9953	9952	9951	9950	9949	9947	9946	81
9	9946	9945	9944	9943	9941	9940	9939	9937	9936	9935	9934	80
10	1,9934	9934	9931	9929	9928	9927	9925	9924	9922	9921	9919	79
11	9919	9918	9916	9915	9913	9912	9910	9909	9907	9906	9904	78
12	9911	9909	9907	9905	9904	9902	9900	9899	9897	9896	9894	77
13	9887	9885	9883	9882	9880	9878	9876	9875	9873	9871	9869	76
14	9869	9867	9865	9863	9861	9859	9857	9855	9853	9851	9849	75
15	1,9846	9846	9845	9843	9841	9839	9837	9835	9833	9831	9828	74
16	9828	9826	9824	9822	9820	9817	9815	9813	9811	9808	9806	73
17	9806	9804	9801	9799	9797	9794	9792	9789	9787	9785	9782	72
18	9782	9780	9777	9775	9772	9770	9767	9764	9762	9759	9757	71
19	9757	9754	9751	9749	9746	9743	9741	9738	9735	9733	9730	70
20	1,9730	9727	9724	9722	9719	9716	9713	9710	9707	9704	9702	69
21	9702	9699	9696	9693	9690	9687	9684	9681	9678	9675	9672	68
22	9672	9669	9666	9662	9659	9656	9653	9650	9647	9643	9640	67
23	9640	9637	9634	9631	9627	9624	9621	9617	9614	9611	9607	66
24	9607	9604	9601	9597	9594	9590	9587	9583	9580	9576	9573	65
25	1,9573	9569	9566	9562	9558	9555	9551	9548	9544	9540	9537	64
26	9537	9533	9529	9525	9522	9518	9514	9510	9506	9503	9499	63
27	9499	9495	9491	9487	9483	9479	9475	9471	9467	9463	9459	62
28	9459	9455	9451	9447	9443	9439	9435	9431	9427	9423	9418	61
29	9418	9414	9410	9406	9401	9397	9393	9388	9384	9380	9375	60
30	1,9375	9371	9367	9362	9358	9353	9349	9344	9340	9335	9331	59
31	9331	9326	9322	9317	9312	9308	9303	9298	9294	9289	9284	58
32	9284	9279	9275	9270	9265	9260	9255	9251	9246	9241	9236	57
33	9236	9231	9226	9221	9216	9211	9206	9201	9196	9191	9186	56
34	9186	9181	9175	9170	9165	9160	9155	9149	9144	9139	9134	55
35	1,9134	9128	9123	9118	9112	9107	9101	9096	9091	9085	9080	54
36	9080	9074	9069	9063	9057	9052	9046	9041	9035	9029	9023	53
37	9023	9018	9012	9006	9000	8995	8989	8983	8977	8971	8965	52
38	8965	8959	8953	8947	8941	8935	8929	8923	8917	8911	8905	51
39	8905	8899	8893	8887	8880	8874	8868	8862	8855	8849	8843	50
40	1,8843	8836	8830	8823	8817	8810	8804	8797	8791	8784	8778	49
41	8778	8771	8765	8758	8751	8745	8738	8731	8724	8718	8711	48
42	8711	8704	8697	8690	8683	8676	8669	8662	8655	8648	8641	47
43	8641	8634	8627	8620	8613	8606	8599	8591	8584	8577	8569	46
44	8569	8562	8555	8547	8540	8532	8525	8517	8510	8502	8495	45
	60'	54'	48'	42'	36'	30'	24'	18'	12'	6'	0'	
	1°.0	0°.9	0°.8	0°.7	0°.6	0°.5	0°.4	0°.3	0°.2	0°.1	0°.0	

Log. sinus.

Parties décimales du degré en minutes et secondes.

	0°.00	0°.01	0°.02	0°.03	0°.04	0°.05	0°.06	0°.07	0°.08	0°.09
0	0	0.36,0	1.12,0	1.48,0	2.24,0	3. 0,0	3.36,0	4.12,0	4.48,0	5.24,0
1	3,6	0.39,6	1.15,6	1.51,6	2.27,6	3. 3,6	3.39,6	4.15,6	4.51,6	5.27,6
2	7,2	0.43,2	1.19,2	1.55,2	2.3,2	3. 7,2	3.43,2	4.19,2	4.55,2	5.31,2
3	10,8	0.46,8	1.22,8	1.58,8	2.34,8	3.10,8	3.46,8	4.22,8	4.58,8	5.34,8
4	14,4	0.50,4	1.26,4	2. 2,4	2.38,4	3.14,4	3.50,4	4.26,4	5. 2,4	5.38,4
5	18,0	0.54,0	1.30,0	2. 6,0	2.42,0	3.18,0	3.54,0	4.30,0	5. 6,0	5.42,0
6	21,6	0.57,6	1.33,6	2. 9,6	2.45,6	3.21,6	3.57,6	4.33,6	5. 9,6	5.45,6
7	25,2	1. 1,2	1.37,2	2.13,2	2.49,2	3.25,2	4. 1,2	4.37,2	5.13,2	5.49,2
8	28,8	1. 4,8	1.40,8	2.16,8	2.52,8	3.28,8	4. 4,8	4.40,8	5.16,8	5.52,8
9	32,4	1. 8,4	1.44,4	2.20,4	2.56,4	3.32,4	4. 8,4	4.44,4	5.20,4	5.56,4



DE SIX EN SIX MINUTES, OU DE DIXIÈME EN DIXIÈME DE DEGRÉ.

Log. cotang.

Deg.	0° 0' 0" 1' 0" 2' 0" 3' 0" 4' 0"					0° 5' 0" 6' 0" 7' 0" 8' 0" 9' 0" 10' 0"						Deg.
	0'	6'	12'	18'	24'	30'	36'	42'	48'	54'	60'	
0	2,	7581	4571	2810	1561	0591	0880	09130	8550	8038	7581	89
1	1,7581	7167	6789	6441	6119	5819	5539	5275	5027	4792	4569	88
2	4569	4357	4155	3962	3777	3599	3429	3264	3106	2954	2806	87
3	2806	2663	2525	2391	2261	2135	2012	1893	1777	1664	1554	86
4	1554	1446	1341	1238	1138	1040	0944	0850	0759	0669	0580	85
5	1,0580	0494	0409	0326	0244	0164	0085	0008	9932	9857	9784	84
6	0,9784	9711	9640	9570	9501	9433	9367	9301	9236	9172	9109	83
7	9109	9046	8985	8924	8865	8806	8748	8690	8633	8577	8522	82
8	8522	8467	8413	8360	8307	8255	8203	8152	8102	8052	8003	81
9	8003	7954	7906	7858	7811	7764	7718	7672	7626	7581	7537	80
10	0,7537	7493	7449	7406	7363	7320	7278	7236	7195	7154	7113	79
11	7113	7073	7033	6994	6954	6915	6877	6838	6800	6763	6725	78
12	6725	6688	6651	6615	6578	6542	6507	6471	6436	6401	6366	77
13	6366	6332	6298	6264	6230	6196	6163	6130	6097	6065	6032	76
14	6032	6000	5968	5936	5905	5873	5842	5811	5780	5750	5719	75
15	0,5719	5689	5659	5629	5600	5570	5541	5512	5483	5454	5425	74
16	5425	5397	5368	5340	5312	5284	5256	5229	5201	5174	5147	73
17	5147	5120	5093	5066	5039	5013	4986	4960	4934	4908	4882	72
18	4882	4857	4831	4805	4780	4755	4730	4705	4680	4655	4630	71
19	4630	4606	4581	4557	4533	4509	4484	4461	4437	4413	4389	70
20	0,4389	4366	4342	4319	4296	4273	4250	4227	4204	4181	4158	69
21	4158	4136	4113	4091	4068	4046	4024	4002	3980	3958	3936	68
22	3936	3914	3892	3871	3849	3828	3806	3785	3764	3743	3721	67
23	3721	3700	3679	3659	3638	3617	3596	3576	3555	3535	3514	66
24	3514	3494	3473	3453	3433	3413	3393	3373	3353	3333	3313	65
25	0,3313	3294	3274	3254	3235	3215	3196	3176	3157	3137	3118	64
26	3118	3099	3080	3061	3042	3023	3004	2985	2966	2947	2928	63
27	2928	2910	2891	2872	2854	2835	2817	2798	2780	2762	2743	62
28	2743	2725	2707	2689	2670	2652	2634	2616	2598	2580	2562	61
29	2562	2545	2527	2509	2491	2474	2456	2438	2421	2403	2386	60
30	0,2386	2368	2351	2333	2316	2299	2281	2264	2247	2229	2212	59
31	2212	2195	2178	2161	2144	2127	2110	2093	2076	2059	2042	58
32	2042	2025	2008	1992	1975	1958	1941	1925	1908	1891	1875	57
33	1875	1858	1842	1825	1809	1792	1776	1759	1743	1726	1710	56
34	1710	1694	1677	1661	1645	1629	1612	1596	1580	1564	1548	55
35	0,1548	1532	1516	1499	1483	1467	1451	1435	1419	1403	1387	54
36	1387	1371	1356	1340	1324	1308	1292	1276	1260	1245	1229	53
37	1229	1213	1197	1182	1166	1150	1135	1119	1103	1088	1072	52
38	1072	1056	1041	1025	1010	994	978	963	947	932	916	51
39	916	901	885	870	854	839	824	808	793	777	762	50
40	0,762	746	731	716	700	685	670	654	639	624	608	49
41	608	593	578	562	547	532	517	501	486	471	456	48
42	0456	0440	0425	0410	0395	0379	0364	0349	0334	0319	0303	47
43	0303	0288	0273	0258	0243	0227	0212	0197	0182	0167	0151	46
44	0152	0136	0121	0106	0091	0076	0061	0045	0030	0015	0000	45
	60'	54'	48'	42'	36'	30'	24'	18'	12'	6'	0'	Deg.
	1°,0	0°,9	0°,8	0°,7	0°,6	0°,5	0°,4	0°,3	0°,2	0°,1	0°,0	

Log. tang.

		Log. tang.											
Dizaines de degrés.	Deg.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dizaines de degrés.
		0		2,242	2,543	2,719	2,845	2,942	1,022	1,089	1,148	1,200	
	1	1,246	289	327	363	397	428	457	485	512	537	561	7
	2	561	584	606	628	649	669	688	707	726	744	761	6
	3	761	779	796	813	829	845	861	877	893	908	924	5
	4	1,924	939	954	970	985	1000	1015	1030	1046	1061	1076	4
	5	0,076	092	107	123	139	155	171	187	204	221	239	3
	6	239	256	274	293	312	331	351	372	394	416	439	2
	7	439	463	488	515	543	572	603	637	673	711	754	1
	8	0,754	0,800	0,852	0,911	0,978	1,058	1,155	1,261	1,457	1,758	»	0
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Deg.

Log. cotang.









XIII. (Suite.) — LOGARITHMES DES FONCTIONS CIRCULAIRES

Log. sinus.												
0 <sup>q</sup>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0 <sup>q</sup>
00	»	3,1961	3,4971	3,6732	3,7982	3,8951	3,9743	2,0412	2,0992	2,1503	2,1961	99
01	2,1961	2375	2753	3100	3422	3722	4002	4265	4513	4748	4971	98
02	4971	5183	5385	5578	5762	5939	6110	6274	6431	6584	6731	97
03	6731	6873	7011	7144	7274	7400	7522	7641	7756	7869	7979	96
04	7979	8086	8191	8293	8392	8490	8585	8678	8769	8859	8946	95
05	2,8946	9032	9116	9199	9280	9359	9437	9514	9589	9664	9736	94
06	9736	9808	9878	9948	*0016	*0083	*0149	*0214	*0278	*0341	*0403	93
07	1,0403	0,465	0,525	0,585	0,644	0,702	0,759	0,816	0,871	0,926	0,981	92
08	0,981	1,034	1,087	1,140	1,191	1,242	1,293	1,343	1,392	1,441	1,489	91
09	1,489	1,537	1,584	1,631	1,677	1,722	1,767	1,812	1,856	1,900	1,943	90
10	1,1943	1,986	2,029	2,071	2,112	2,153	2,194	2,235	2,275	2,314	2,353	89
11	2,353	2,392	2,431	2,469	2,507	2,545	2,582	2,619	2,655	2,691	2,727	88
12	2,727	2,763	2,798	2,833	2,868	2,902	2,937	2,970	3,004	3,037	3,070	87
13	3,070	3,103	3,136	3,168	3,200	3,232	3,264	3,295	3,326	3,357	3,387	86
14	3,387	3,418	3,448	3,478	3,508	3,537	3,567	3,596	3,625	3,653	3,682	85
15	1,3682	3,710	3,738	3,766	3,794	3,822	3,849	3,876	3,903	3,930	3,957	84
16	3,957	3,983	4,009	4,036	4,061	4,087	4,113	4,138	4,164	4,189	4,214	83
17	4,214	4,239	4,264	4,288	4,312	4,337	4,361	4,385	4,409	4,432	4,456	82
18	4,456	4,479	4,503	4,526	4,549	4,572	4,594	4,617	4,639	4,662	4,684	81
19	4,684	4,706	4,728	4,750	4,772	4,793	4,815	4,836	4,858	4,879	4,900	80
20	1,4900	4,921	4,942	4,962	4,983	5,003	5,024	5,044	5,064	5,084	5,104	79
21	5,104	5,124	5,144	5,164	5,183	5,203	5,222	5,241	5,261	5,280	5,299	78
22	5,299	5,318	5,336	5,355	5,374	5,392	5,411	5,429	5,447	5,465	5,484	77
23	5,484	5,502	5,520	5,537	5,555	5,573	5,590	5,608	5,625	5,643	5,660	76
24	5,660	5,677	5,694	5,711	5,728	5,745	5,762	5,779	5,795	5,812	5,828	75
25	1,5828	5,845	5,861	5,877	5,894	5,910	5,926	5,942	5,958	5,974	5,990	74
26	5,990	6,005	6,021	6,037	6,052	6,068	6,083	6,098	6,114	6,129	6,144	73
27	6,144	6,159	6,174	6,189	6,204	6,219	6,233	6,248	6,263	6,277	6,292	72
28	6,292	6,306	6,321	6,335	6,349	6,364	6,378	6,392	6,406	6,420	6,434	71
29	6,434	6,448	6,462	6,475	6,489	6,503	6,516	6,530	6,544	6,557	6,570	70
30	1,6570	6,584	6,597	6,610	6,624	6,637	6,650	6,663	6,676	6,689	6,702	69
31	6,702	6,715	6,727	6,740	6,753	6,766	6,778	6,791	6,803	6,816	6,828	68
32	6,828	6,841	6,853	6,865	6,878	6,890	6,902	6,914	6,926	6,938	6,950	67
33	6,950	6,962	6,974	6,986	6,998	7,009	7,021	7,033	7,044	7,056	7,068	66
34	7,068	7,079	7,091	7,102	7,113	7,125	7,136	7,147	7,159	7,170	7,181	65
35	1,7181	7,192	7,203	7,214	7,225	7,236	7,247	7,258	7,269	7,279	7,290	64
36	7,290	7,301	7,312	7,322	7,333	7,344	7,354	7,365	7,375	7,386	7,396	63
37	7,396	7,406	7,417	7,427	7,437	7,447	7,458	7,468	7,478	7,488	7,498	62
38	7,498	7,508	7,518	7,528	7,538	7,548	7,558	7,567	7,577	7,587	7,597	61
39	7,597	7,606	7,616	7,626	7,635	7,645	7,654	7,664	7,673	7,683	7,692	60
40	1,7692	7,702	7,711	7,720	7,729	7,739	7,748	7,757	7,766	7,775	7,785	59
41	7,785	7,794	7,803	7,812	7,821	7,830	7,839	7,847	7,856	7,865	7,874	58
42	7,874	7,883	7,891	7,900	7,909	7,918	7,926	7,935	7,943	7,952	7,960	57
43	7,960	7,969	7,977	7,986	7,994	8,003	8,011	8,019	8,028	8,036	8,044	56
44	8,044	8,053	8,061	8,069	8,077	8,085	8,093	8,101	8,109	8,117	8,125	55
45	1,8125	8,133	8,141	8,149	8,157	8,165	8,173	8,181	8,189	8,196	8,204	54
46	8,204	8,212	8,219	8,227	8,235	8,242	8,250	8,258	8,265	8,273	8,280	53
47	8,280	8,288	8,295	8,303	8,310	8,317	8,325	8,332	8,339	8,347	8,354	52
48	8,354	8,361	8,369	8,376	8,383	8,390	8,397	8,404	8,411	8,418	8,426	51
49	8,426	8,433	8,440	8,447	8,454	8,460	8,467	8,474	8,481	8,488	8,495	50
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Log. cosinus.											0 <sup>q</sup>	



DE MILLIÈME EN MILLIÈME DU QUADRANT.

Log. cosinus.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0. <sup>q</sup> 00	0,0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	*9999	99
01	1,9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9998	9998	9998	9998	98
02	9998	9998	9997	9997	9997	9997	9996	9996	9996	9995	9995	97
03	9995	9995	9995	9994	9994	9993	9993	9993	9992	9992	9991	96
04	9991	9991	9991	9990	9990	9989	9989	9988	9988	9987	9987	95
05	1,9987	9986	9985	9985	9984	9984	9983	9983	9982	9981	9981	94
06	9981	9980	9979	9979	9978	9977	9977	9976	9975	9974	9974	93
07	9974	9973	9972	9971	9971	9970	9969	9968	9967	9966	9966	92
08	9966	9965	9964	9963	9962	9961	9960	9959	9958	9957	9956	91
09	9956	9955	9954	9953	9952	9951	9950	9949	9948	9947	9946	90
10	1,9946	9945	9944	9943	9942	9941	9940	9938	9937	9936	9935	89
11	9935	9934	9932	9931	9930	9929	9928	9926	9925	9924	9922	88
12	9922	9921	9920	9918	9917	9916	9914	9913	9912	9910	9909	87
13	9909	9907	9906	9905	9903	9902	9900	9899	9897	9896	9894	86
14	9894	9893	9891	9890	9888	9886	9885	9883	9882	9880	9878	85
15	1,9878	9877	9875	9873	9872	9870	9868	9867	9865	9863	9861	84
16	9861	9860	9858	9856	9854	9852	9851	9849	9847	9845	9843	83
17	9843	9841	9840	9838	9836	9834	9832	9830	9828	9826	9824	82
18	9824	9822	9820	9818	9816	9814	9812	9810	9808	9806	9804	81
19	9804	9802	9799	9797	9795	9793	9791	9789	9786	9784	9782	80
20	1,9782	9780	9778	9775	9773	9771	9769	9766	9764	9762	9759	79
21	9759	9757	9755	9752	9750	9747	9745	9743	9740	9738	9735	78
22	9735	9733	9730	9728	9725	9723	9720	9718	9715	9713	9710	77
23	9710	9708	9705	9702	9700	9697	9694	9692	9689	9686	9684	76
24	9684	9681	9678	9676	9673	9670	9667	9665	9662	9659	9656	75
25	1,9656	9653	9650	9648	9645	9642	9639	9636	9633	9630	9627	74
26	9627	9624	9621	9618	9615	9612	9609	9606	9603	9600	9597	73
27	9597	9594	9591	9588	9585	9582	9578	9575	9572	9569	9566	72
28	9566	9562	9559	9556	9553	9549	9546	9543	9540	9536	9533	71
29	9533	9530	9526	9523	9519	9516	9513	9509	9506	9502	9499	70
30	1,9499	9495	9492	9488	9485	9481	9478	9474	9471	9467	9463	69
31	9463	9460	9456	9452	9449	9445	9441	9438	9434	9430	9427	68
32	9427	9423	9419	9415	9411	9408	9404	9400	9396	9392	9388	67
33	9388	9384	9381	9377	9373	9369	9365	9361	9357	9353	9349	66
34	9349	9345	9341	9337	9332	9328	9324	9320	9316	9312	9308	65
35	1,9308	9303	9299	9295	9291	9287	9282	9278	9274	9269	9265	64
36	9265	9261	9256	9252	9248	9243	9239	9234	9230	9226	9221	63
37	9221	9217	9212	9208	9203	9198	9194	9189	9185	9180	9175	62
38	9175	9171	9166	9161	9157	9152	9147	9143	9138	9133	9128	61
39	9128	9124	9119	9114	9109	9104	9099	9094	9089	9085	9080	60
40	1,9080	9075	9070	9065	9060	9055	9050	9044	9039	9034	9029	59
41	9029	9024	9019	9014	9009	9003	8998	8993	8988	8982	8977	58
42	8977	8972	8967	8961	8956	8950	8945	8940	8934	8929	8923	57
43	8923	8918	8912	8907	8901	8896	8890	8885	8879	8873	8868	56
44	8868	8862	8856	8851	8845	8839	8834	8828	8822	8816	8810	55
45	1,8810	8805	8799	8793	8787	8781	8775	8769	8763	8757	8751	54
46	8751	8745	8739	8733	8727	8721	8715	8709	8703	8696	8690	53
47	8690	8684	8678	8671	8665	8659	8653	8646	8640	8633	8627	52
48	8627	8621	8614	8608	8601	8595	8588	8582	8575	8569	8562	51
49	8562	8555	8549	8542	8535	8529	8522	8515	8508	8502	8495	50
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0. <sup>q</sup>

Log. sinus.

**XIII. (Suite.) — LOGARITHMES DES FONCTIONS CIRCULAIRES**

Log. tang.												
0,	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
00	»	3,1961	3,4972	3,6732	3,7982	3,8951	3,9743	2,0412	2,0992	2,1504	2,1962	99
01	2,1962	2376	2754	3101	3423	3723	4003	4267	4515	4750	4973	98
02	4973	5185	5387	5580	5765	5943	6113	6277	6436	6588	6736	97
03	6736	6878	7016	7150	7280	7406	7529	7648	7764	7877	7988	96
04	7988	8095	8200	8302	8403	8501	8596	8690	8782	8872	8960	95
05	2,8960	9046	9131	9214	9296	9376	9454	9532	9608	9682	9756	94
06	9756	9828	9899	9969	+0038	+0105	+0172	+0238	+0303	+0367	+0430	93
07	1,0430	0492	0553	0614	0673	0732	0790	0847	0904	0960	1015	92
08	1015	1070	1123	1177	1229	1281	1333	1384	1434	1484	1533	91
09	1533	1581	1629	1677	1724	1771	1817	1863	1908	1953	1997	90
10	1,1997	2041	2085	2128	2170	2213	2255	2296	2337	2378	2419	89
11	2419	2459	2499	2538	2577	2616	2654	2692	2730	2768	2805	88
12	2805	2842	2878	2915	2951	2987	3022	3057	3092	3127	3162	87
13	3162	3196	3230	3264	3297	3330	3363	3396	3429	3461	3493	86
14	3493	3525	3557	3588	3620	3651	3682	3713	3743	3773	3804	85
15	1,3804	3833	3863	3893	3922	3952	3981	4010	4038	4067	4095	84
16	4095	4123	4152	4179	4207	4235	4262	4290	4317	4344	4371	83
17	4371	4397	4424	4450	4477	4503	4529	4555	4581	4606	4632	82
18	4632	4657	4683	4708	4733	4758	4782	4807	4832	4856	4880	81
19	4880	4905	4929	4953	4977	5000	5024	5048	5071	5094	5118	80
20	1,5118	5141	5164	5187	5210	5233	5255	5278	5300	5323	5345	79
21	5345	5367	5389	5411	5433	5455	5477	5499	5520	5542	5563	78
22	5563	5585	5606	5627	5648	5669	5690	5711	5732	5753	5773	77
23	5773	5794	5815	5835	5855	5876	5896	5916	5936	5956	5976	76
24	5976	5996	6016	6036	6055	6075	6095	6114	6134	6153	6172	75
25	1,6172	6192	6211	6230	6249	6268	6287	6306	6325	6344	6362	74
26	6362	6381	6400	6418	6437	6455	6474	6492	6510	6529	6547	73
27	6547	6565	6583	6601	6619	6637	6655	6673	6691	6708	6726	72
28	6726	6744	6762	6779	6797	6814	6832	6849	6866	6884	6901	71
29	6901	6918	6935	6953	6970	6987	7004	7021	7038	7055	7072	70
30	1,7072	7089	7105	7122	7139	7156	7172	7189	7205	7222	7238	69
31	7238	7255	7271	7288	7304	7320	7337	7353	7369	7386	7402	68
32	7402	7418	7434	7450	7466	7482	7498	7514	7530	7546	7562	67
33	7562	7578	7593	7609	7625	7641	7656	7672	7688	7703	7719	66
34	7719	7734	7750	7765	7781	7796	7812	7827	7843	7858	7873	65
35	1,7873	7888	7904	7919	7934	7949	7965	7980	7995	8010	8025	64
36	8025	8040	8055	8070	8085	8100	8115	8130	8145	8160	8175	63
37	8175	8190	8205	8219	8234	8249	8264	8278	8293	8308	8323	62
38	8323	8337	8352	8366	8381	8396	8410	8425	8439	8454	8468	61
39	8468	8483	8497	8512	8526	8541	8555	8570	8584	8598	8613	60
40	1,8613	8627	8641	8656	8670	8684	8698	8713	8727	8741	8755	59
41	8755	8770	8784	8798	8812	8826	8840	8855	8869	8883	8897	58
42	8897	8911	8925	8939	8953	8967	8981	8995	9009	9023	9037	57
43	9037	9051	9065	9079	9093	9107	9121	9135	9149	9163	9176	56
44	9176	9190	9204	9218	9232	9246	9260	9274	9287	9301	9315	55
45	1,9315	9329	9343	9356	9370	9384	9398	9412	9425	9439	9453	54
46	9453	9467	9480	9494	9508	9522	9535	9549	9563	9576	9590	53
47	9590	9604	9617	9631	9645	9659	9672	9686	9700	9713	9727	52
48	9727	9741	9754	9768	9782	9795	9809	9823	9836	9850	9864	51
49	9864	9877	9891	9904	9918	9932	9945	9959	9973	9986	+0000	50
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0,

Log. cotang.

DE MILLIÈME EN MILLIÈME DU QUADRANT.

Log. cotang.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 <sup>q</sup>												
00	"	2,8039	2,5028	2,3268	2,2018	2,1049	2,0257	1,9588	1,9008	1,8496	1,8038	99
01	1,8038	7624	7246	6899	6577	6277	5997	5733	5485	5250	5027	98
02	5027	4815	4613	4420	4235	4057	3887	3723	3564	3412	3264	97
03	3264	3122	2984	2850	2720	2594	2471	2352	2236	2123	2012	96
04	2012	1905	1800	1698	1597	1495	1404	1310	1218	1128	1040	95
05	1,1040	0954	0869	0786	0704	0624	0546	0468	0392	0318	0244	94
06	0244	0172	0101	0031	*9962	*9895	*9828	*9762	*9697	*9633	*9570	93
07	0,9570	9508	9447	9386	9327	9268	9210	9153	9096	9040	8985	92
08	8985	8930	8877	8823	8771	8719	8667	8616	8566	8516	8467	91
09	8467	8419	8371	8323	8276	8229	8183	8137	8092	8047	8003	90
10	0,8003	7959	7915	7872	7830	7787	7745	7704	7663	7622	7581	89
11	7581	7541	7501	7462	7423	7384	7346	7308	7270	7232	7195	88
12	7195	7158	7122	7085	7049	7013	6978	6943	6908	6873	6838	87
13	6838	6804	6770	6736	6703	6670	6637	6604	6571	6539	6507	86
14	6507	6475	6443	6412	6380	6349	6318	6287	6257	6227	6196	85
15	0,6196	6167	6137	6107	6078	6048	6019	5990	5962	5933	5905	84
16	5905	5877	5848	5821	5793	5765	5738	5710	5683	5656	5629	83
17	5629	5603	5576	5550	5523	5497	5471	5445	5419	5394	5368	82
18	5368	5343	5317	5292	5267	5242	5218	5193	5168	5144	5120	81
19	5120	5095	5071	5047	5023	5000	4976	4952	4929	4906	4882	80
20	0,4882	4859	4836	4813	4790	4767	4745	4722	4700	4677	4655	79
21	4655	4633	4611	4589	4567	4545	4523	4501	4480	4458	4437	78
22	4437	4415	4394	4373	4352	4331	4310	4289	4268	4247	4227	77
23	4227	4206	4185	4165	4145	4124	4104	4084	4064	4044	4024	76
24	4024	4004	3984	3964	3945	3925	3905	3886	3866	3847	3828	75
25	0,3828	3808	3789	3770	3751	3732	3713	3694	3675	3656	3638	74
26	3638	3619	3600	3582	3563	3545	3526	3508	3490	3471	3453	73
27	3453	3435	3417	3399	3381	3363	3345	3327	3309	3292	3274	72
28	3274	3256	3238	3221	3203	3186	3168	3151	3134	3116	3099	71
29	3099	3082	3065	3047	3030	3013	2996	2979	2962	2945	2928	70
30	0,2928	2911	2895	2878	2861	2844	2828	2811	2795	2778	2762	69
31	2762	2745	2729	2712	2696	2680	2663	2647	2631	2614	2598	68
32	2598	2582	2566	2550	2534	2518	2502	2486	2470	2454	2438	67
33	2438	2422	2407	2391	2375	2359	2344	2328	2312	2297	2281	66
34	2281	2266	2250	2235	2219	2204	2188	2173	2157	2142	2127	65
35	0,2127	2112	2096	2081	2066	2051	2035	2020	2005	1990	1975	64
36	1975	1960	1945	1930	1915	1900	1885	1870	1855	1840	1825	63
37	1825	1810	1795	1781	1766	1751	1736	1722	1707	1692	1677	62
38	1677	1663	1648	1634	1619	1604	1590	1575	1561	1546	1532	61
39	1532	1517	1503	1488	1474	1459	1445	1430	1416	1402	1387	60
40	0,1387	1373	1359	1344	1330	1316	1302	1287	1273	1259	1245	59
41	1245	1230	1216	1202	1188	1174	1160	1145	1131	1117	1103	58
42	1103	1089	1075	1061	1047	1033	1019	1005	991	977	963	57
43	963	949	935	921	907	893	879	865	851	837	824	56
44	0824	0810	0796	0782	0768	0754	0740	0726	0713	0699	0685	55
45	0,0685	0671	0657	0644	0630	0616	0602	0588	0575	0561	0547	54
46	0547	0533	0520	0506	0492	0478	0465	0451	0437	0424	0410	53
47	0410	0396	0383	0369	0355	0341	0328	0314	0300	0287	0273	52
48	0273	0259	0246	0232	0218	0205	0191	0177	0164	0150	0136	51
49	0136	0123	0109	0096	0082	0068	0055	0041	0027	0014	0000	50

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Log. tang.

XIV. — FONCTIONS CIRCULAIRES

Valeurs naturelles.

n	d	Amh u		Tgh u		Sh u		Ch u		O <sup>q</sup>	u	d
		arc	sinus	coséc	tang	cotg	séc	costn				
0,		O <sup>q</sup>	o,			O,				O <sup>q</sup>		
0000	16	000	0000	∞	0000	∞	1,0000	1,0000	0000	∞		
0016	15	001	0016	636,62	0016	636,62	0000	0000	0000	999	7,149	693
0031	16	002	0031	318,31	0031	318,31	0000	0000	0000	998	6,456	403
0047	16	003	0047	212,21	0047	212,21	0000	0000	0000	997	6,051	288
0063	16	004	0063	159,16	0063	159,15	0000	0000	0000	996	5,763	223
0079	15	005	0079	127,33	0079	127,32	1,0000	1,0000	0000	995	5,540	182
0094	16	006	0094	106,10	0094	106,10	0000	1,0000	0000	994	358	155
0110	16	007	0110	90,95	0110	90,94	0001	0,9999	0001	993	203	135
0126	15	008	0126	79,58	0126	79,57	0001	9999	0001	992	5,070	118
0141	16	009	0141	70,74	0141	70,73	0001	9999	0001	991	4,952	105
0157	16	010	0157	63,66	0157	63,66	1,0001	0,9999	0001	990	4,847	96
0173	16	011	0173	57,88	0173	57,87	0001	9999	0001	989	751	87
0189	15	012	0188	53,05	0189	53,05	0002	9998	0002	988	664	80
0204	16	013	0204	48,97	0204	48,96	0002	9998	0002	987	584	74
0220	16	014	0220	45,48	0220	45,47	0002	9998	0002	986	510	69
0236	15	015	0236	42,45	0236	42,43	1,0003	0,9997	0003	985	4,441	64
0251	16	016	0251	39,79	0251	39,78	0003	9997	0003	984	377	61
0267	16	017	0267	37,45	0267	37,44	0004	9996	0004	983	316	57
0283	15	018	0283	35,37	0283	35,36	0004	9996	0004	982	259	54
0298	16	019	0298	33,51	0298	33,50	0004	9996	0004	981	205	51
0314	16	020	0314	31,84	0314	31,82	1,0005	0,9995	0005	980	4,154	49
0330	16	021	0330	30,32	0330	30,30	0005	9995	0005	979	105	47
0346	15	022	0346	28,94	0346	28,93	0006	9994	0006	978	058	44
0361	16	023	0361	27,69	0361	27,67	0007	9993	0007	977	4,014	43
0377	16	024	0377	26,53	0377	26,51	0007	9993	0007	976	3,971	41
0393	16	025	0393	25,47	0393	25,45	1,0008	0,9992	0008	975	3,930	39
0409	15	026	0408	24,49	0409	24,47	0008	9992	0008	974	891	38
0424	16	027	0424	23,59	0424	23,56	0009	9991	0009	973	853	36
0440	16	028	0440	22,74	0440	22,72	0010	9990	0010	972	817	35
0456	15	029	0455	21,96	0456	21,94	0010	9990	0010	971	782	34
0471	16	030	0471	21,23	0472	21,20	1,0011	0,9989	0011	970	3,748	33
0487	16	031	0487	20,54	0487	20,52	0012	9988	0012	969	715	32
0503	16	032	0502	19,90	0503	19,88	0013	9987	0013	968	683	30
0519	15	033	0518	19,30	0519	19,27	0013	9987	0013	967	653	30
0534	16	034	0534	18,73	0535	18,71	0014	9986	0014	966	623	29
0550	16	035	0550	18,20	0550	18,17	1,0015	0,9985	0015	965	3,594	28
0566	16	036	0565	17,69	0566	17,67	0016	9984	0016	964	566	28
0582	15	037	0581	17,22	0582	17,19	0017	9983	0017	963	538	27
0597	16	038	0597	16,76	0598	16,73	0018	9982	0018	962	511	26
0613	16	039	0612	16,33	0613	16,30	0019	9981	0019	961	485	25
0629	15	040	0628	15,93	0629	15,89	1,0020	0,9980	0020	960	3,460	25
0644	16	041	0644	15,54	0645	15,51	0021	9979	0021	959	435	24
0660	16	042	0659	15,17	0661	15,14	0022	9978	0022	958	411	23
0676	16	043	0675	14,82	0676	14,78	0023	9977	0023	957	388	23
0692	15	044	0691	14,48	0692	14,45	0024	9976	0024	956	365	23
0707	16	045	0706	14,16	0708	14,12	1,0025	0,9975	0025	955	3,342	22
0723	16	046	0722	13,85	0724	13,82	0026	9974	0026	954	320	21
0739	16	047	0738	13,56	0740	13,52	0027	9973	0027	953	299	21
0755	15	048	0753	13,28	0755	13,24	0028	9972	0028	952	278	21
0770	16	049	0769	13,01	0771	12,97	0030	9970	0030	951	257	21
0786	16	050	0785	12,75	0787	12,71	1,0031	0,9969	0031	950	3,237	20
o,		O <sup>q</sup>	o,			O,				O <sup>q</sup>		
		cosin	d	séc	d	cotg	d	tang	d	coséc	sinus	arc
		Ch u		Ch u		Sh u		Sh u		Tgh u	Amh u	u

ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u	Sh u	Ch u	Amh u	M u	d
		arc	sin	coséc	tang	séc	arc	
		O <sup>q</sup>	d	O <sup>q</sup>	d	O <sup>q</sup>	O <sup>q</sup>	
		cosin	coséc	cotg	cotg	coséc	sin	
		Ch u	Ch u	Sh u	Sh u	Tgh u	Amh u	M u
		1/Ch u	1/Ch u	1/Sh u	1/Sh u	1/Tgh u		
0,00		0 <sup>q</sup>				0,	0 <sup>q</sup>	
0000	682	000	"	"	"	0000	0,0000	*000
0682	682	001	"	"	"	0000	0000	999
1364	683	002	"	"	"	0000	0000	998
2047	682	003	"	"	"	0000	0000	997
2729	682	004	"	"	"	0000	0000	996
3411	681	005	"	"	"	0000	0,0000	995
4093	682	006	"	"	"	0000	0000	994
4775	683	007	"	"	"	0000	0000	993
5458	682	008	"	"	"	0000	0000	992
6140	682	009	"	"	"	0000	0000	991
6822	682	010	"	"	"	0001	1,9999	990
7504	683	011	"	"	"	0001	9999	989
8187	682	012	"	"	"	0001	9999	988
8869	682	013	"	"	"	0001	9999	987
9551	683	014	"	"	"	0001	9999	986
1023	69	015	"	"	"	0001	1,9999	985
1092	68	016	"	"	"	0001	9999	984
1160	68	017	"	"	"	0002	9998	983
1228	68	018	"	"	"	0002	9998	982
1296	69	019	"	"	"	0002	9998	981
1365	68	020	"	"	"	0002	1,9998	980
1433	68	021	"	"	"	0002	9998	979
1501	68	022	"	"	"	0003	9997	978
1569	69	023	"	"	"	0003	9997	977
1638	68	024	"	"	"	0003	9997	976
1706	68	025	"	"	"	0003	1,9997	975
1774	68	026	"	"	"	0004	9996	974
1842	69	027	"	"	"	0004	9996	973
1911	68	028	"	"	"	0004	9996	972
1979	68	029	"	"	"	0005	9995	971
2047	69	030	"	"	"	0005	1,9995	970
2116	68	031	"	"	"	0005	9995	969
2184	68	032	"	"	"	0005	9995	968
2252	69	033	"	"	"	0006	9994	967
2321	68	034	"	"	"	0006	9994	966
2389	68	035	"	"	"	0007	1,9993	965
2457	69	036	"	"	"	0007	9993	964
2526	68	037	"	"	"	0007	9993	963
2594	68	038	"	"	"	0008	9992	962
2662	69	039	"	"	"	0008	9992	961
2731	68	040	"	"	"	0009	1,9991	960
2799	68	041	"	"	"	0009	9991	959
2867	69	042	"	"	"	0009	9991	958
2936	68	043	"	"	"	0010	9990	957
3004	68	044	"	"	"	0010	9990	956
3072	69	045	"	"	"	0011	1,9989	955
3141	68	046	"	"	"	0011	9989	954
3209	68	047	"	"	"	0012	9988	953
3278	69	048	"	"	"	0012	9988	952
3346	68	049	"	"	"	0013	9987	951
3414		050	"	"	"	0013	1,9987	950
0,0		0 <sup>q</sup>				0,	0 <sup>q</sup>	
		cosin	d	séc	cotg	d	coséc	sin
		1/Ch u	Ch u	1/Ch u	1/Sh u	Sh u	1/Tgh u	Tgh u



ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u	1		Sh u	1		Ch u	1		O <sup>q</sup>	M u	d
		arc	sinus	d	coséc	tang	d	cotg	sec	cosin				
0,0		O <sup>q</sup>							0,	I,	O <sup>q</sup>			
3414	69	<b>050</b>	2,8946	86	1,1054	2,8960	86	1,1040	0013	9987	<b>950</b>	1,4057	86	
3483	68	<b>051</b>	9032	84	0968	9046	85	0954	0014	9986	<b>949</b>	3971	84	
3551	68	<b>052</b>	9116	83	0884	9131	83	0869	0015	9985	<b>948</b>	3887	83	
3620	68	<b>053</b>	9199	81	0801	9214	82	0786	0015	9985	<b>947</b>	3804	81	
3688	69	<b>054</b>	9280	79	0720	9296	80	0704	0016	9984	<b>946</b>	3723	80	
3757	68	<b>055</b>	2,9359	78	1,0641	2,9376	78	1,0624	0016	9984	<b>945</b>	1,3643	79	
3825	68	<b>056</b>	9437	77	0563	9454	78	0546	0017	9983	<b>944</b>	3564	77	
3894	68	<b>057</b>	9514	75	0486	9532	76	0468	0017	9983	<b>943</b>	3487	75	
3962	69	<b>058</b>	9589	75	0411	9608	74	0392	0018	9982	<b>942</b>	3412	75	
4031	68	<b>059</b>	9664	72	0336	9682	74	0318	0019	9981	<b>941</b>	3337	73	
4099	69	<b>060</b>	2,9736	72	1,0264	2,9756	72	1,0244	0019	9981	<b>940</b>	1,3264	72	
4168	68	<b>061</b>	9808	70	0192	9828	71	0172	0020	9980	<b>939</b>	3192	70	
4236	69	<b>062</b>	9878	70	0122	9899	70	0101	0021	9979	<b>938</b>	3122	70	
4305	68	<b>063</b>	2,9948	68	1,0052	2,9969	69	1,0031	0021	9979	<b>937</b>	3052	68	
4373	69	<b>064</b>	1,0016	67	0,9984	1,0038	67	0,9962	0022	9978	<b>936</b>	2984	68	
4442	68	<b>065</b>	1,0083	66	0,9917	1,0105	67	0,9895	0023	9977	<b>935</b>	1,2916	66	
4511	68	<b>066</b>	0149	65	9851	0172	66	9828	0023	9977	<b>934</b>	2850	66	
4579	69	<b>067</b>	0214	64	9786	0238	65	9762	0024	9976	<b>933</b>	2784	64	
4648	68	<b>068</b>	0278	63	9722	0303	64	9697	0025	9975	<b>932</b>	2720	64	
4716	69	<b>069</b>	0341	62	9659	0367	63	9633	0026	9974	<b>931</b>	2656	62	
4785	69	<b>070</b>	1,0403	62	0,9597	1,0430	62	0,9570	0026	9974	<b>930</b>	1,2594	62	
4854	68	<b>071</b>	0465	60	9535	0492	61	9508	0027	9973	<b>929</b>	2532	61	
4922	69	<b>072</b>	0525	60	9475	0553	61	9447	0028	9972	<b>928</b>	2471	60	
4991	69	<b>073</b>	0585	59	9415	0614	61	9386	0029	9971	<b>927</b>	2411	60	
5060	68	<b>074</b>	0644	58	9356	0673	59	9327	0029	9971	<b>926</b>	2352	59	
5128	69	<b>075</b>	1,0702	57	0,9298	1,0732	58	0,9268	0030	9970	<b>925</b>	1,2293	57	
5197	69	<b>076</b>	0759	57	9241	0790	57	9210	0031	9969	<b>924</b>	2236	57	
5266	68	<b>077</b>	0816	56	9184	0847	57	9153	0032	9968	<b>923</b>	2179	56	
5334	69	<b>078</b>	0871	55	9129	0904	56	9096	0033	9967	<b>922</b>	2123	56	
5403	69	<b>079</b>	0926	55	9074	0960	55	9040	0034	9966	<b>921</b>	2067	55	
5472	69	<b>080</b>	1,0981	53	0,9019	1,1015	55	0,8985	0034	9966	<b>920</b>	1,2012	54	
5541	68	<b>081</b>	1034	53	8966	1070	53	8930	0035	9965	<b>919</b>	1958	53	
5609	69	<b>082</b>	1087	53	8913	1123	54	8877	0036	9964	<b>918</b>	1905	53	
5678	69	<b>083</b>	1140	51	8860	1177	52	8823	0037	9963	<b>917</b>	1852	52	
5747	69	<b>084</b>	1191	51	8809	1229	52	8771	0038	9962	<b>916</b>	1800	52	
5816	69	<b>085</b>	1,1242	51	0,8758	1,1281	52	0,8719	0039	9961	<b>915</b>	1,1748	50	
5885	69	<b>086</b>	1293	50	8707	1333	51	8667	0040	9960	<b>914</b>	1698	51	
5954	69	<b>087</b>	1343	49	8657	1384	50	8616	0041	9959	<b>913</b>	1647	50	
6022	68	<b>088</b>	1392	49	8608	1434	50	8566	0042	9958	<b>912</b>	1597	49	
6091	69	<b>089</b>	1441	48	8559	1484	50	8516	0043	9957	<b>911</b>	1548	49	
6160	69	<b>090</b>	1,1489	48	0,8511	1,1533	48	0,8467	0044	9956	<b>910</b>	1,1499	48	
6229	69	<b>091</b>	1537	47	8463	1581	48	8419	0045	9955	<b>909</b>	1451	47	
6298	69	<b>092</b>	1584	47	8416	1629	48	8371	0046	9954	<b>908</b>	1404	47	
6367	69	<b>093</b>	1631	46	8369	1677	47	8323	0047	9953	<b>907</b>	1357	47	
6436	69	<b>094</b>	1677	45	8323	1724	47	8276	0048	9952	<b>906</b>	1310	46	
6505	69	<b>095</b>	1,1722	45	0,8278	1,1771	46	0,8229	0049	9951	<b>905</b>	1,1264	46	
6574	69	<b>096</b>	1767	45	8233	1817	46	8183	0050	9950	<b>904</b>	1218	45	
6643	69	<b>097</b>	1812	44	8188	1863	45	8137	0051	9949	<b>903</b>	1173	45	
6712	69	<b>098</b>	1856	44	8144	1908	45	8092	0052	9948	<b>902</b>	1128	44	
6781	69	<b>099</b>	1900	43	8100	1953	44	8047	0053	9947	<b>901</b>	1084	44	
6850	69	<b>100</b>	1,1943		0,8057	1,1997		0,8003	0054	9946	<b>900</b>	1,1040		
0,0		O <sup>q</sup>							0,	I,	O <sup>q</sup>			
		cosin	d	sec	cotg	d	tang	coséc	sinus	arc				
		1		Ch u	1		Sh u	1	Tgh u	Amh u				
		Ch u			Sh u			Tgh u						

XIV. (Suite.) — FONCTIONS CIRCULAIRES

Valeurs naturelles.

<i>u</i>	<i>d</i>	Amb <i>u</i>	Tgh <i>u</i>	$\frac{1}{\text{Tgh } u}$	Sh <i>u</i>	$\frac{1}{\text{Sh } u}$	Ch <i>u</i>	$\frac{1}{\text{Ch } u}$	<i>u</i>	<i>d</i>	
o,		arc	sinus	coséc	tang	cotg	sec	cosin	o,		
o,		$0^q$	o,		o,		o,	$0^q$	o,		
1577	16	100	1564	6,392	1584	6,314	1,0125	9877	200	2,5421	100
1593	16	101	1580	330	1600	250	0127	9874	209	5321	99
1609	16	102	1595	268	1616	188	0130	9872	208	5222	98
1625	16	103	1611	208	1632	127	0132	9869	207	5124	97
1641	16	104	1626	149	1648	67	0135	9867	206	5027	96
1657	16	105	1642	6,091	1664	6,008	1,0138	9864	205	2,4931	95
1673	16	106	1657	6,034	1681	5,950	0140	9862	204	4836	95
1689	16	107	1673	5,978	1697	894	0143	9859	203	4741	93
1705	16	108	1688	923	1713	838	0146	9856	202	4648	93
1721	16	109	1704	869	1729	783	0148	9854	201	4555	92
1737	15	110	1719	5,816	1745	5,730	1,0151	9851	200	2,4463	92
1752	16	111	1735	764	1761	677	0154	9848	209	4373	90
1768	16	112	1750	714	1778	625	0157	9846	208	4282	91
1784	16	113	1766	663	1794	575	0160	9843	207	4193	89
1800	16	114	1781	614	1810	525	0163	9840	206	4104	87
1816	16	115	1797	5,566	1826	5,475	1,0165	9837	205	2,4017	87
1832	16	116	1812	519	1843	427	0168	9834	204	3930	87
1848	16	117	1828	472	1859	380	0171	9832	203	3843	85
1864	16	118	1843	426	1875	333	0174	9829	202	3758	85
1880	16	119	1858	381	1891	287	0177	9826	201	3673	84
1896	16	120	1874	5,337	1908	5,242	1,0180	9823	200	2,3589	84
1912	16	121	1889	293	1924	198	0183	9820	209	3505	83
1928	16	122	1905	250	1940	154	0186	9817	208	3422	82
1944	16	123	1920	208	1956	111	0190	9814	207	3340	81
1960	16	124	1935	167	1973	69	0193	9811	206	3259	81
1976	16	125	1951	5,126	1989	5,027	1,0196	9808	205	2,3178	80
1992	16	126	1966	086	2005	4,986	0199	9805	204	3098	80
2008	16	127	1982	046	2022	946	0202	9802	203	3018	79
2024	16	128	1997	5,007	2038	906	0206	9799	202	2939	78
2040	16	129	2012	4,969	2055	867	0209	9795	201	2861	78
2056	16	130	2028	4,931	2071	4,829	1,0212	9792	200	2,2783	77
2072	16	131	2043	894	2087	791	0216	9789	209	2706	77
2088	16	132	2059	858	2104	754	0219	9786	208	2629	76
2105	17	133	2074	822	2120	717	0222	9783	207	2553	76
2121	16	134	2089	786	2137	681	0226	9779	206	2478	75
2137	16	135	2105	4,751	2153	4,645	1,0229	9776	205	2,2403	74
2153	16	136	2120	717	2169	610	0233	9773	204	2329	74
2169	16	137	2135	683	2186	575	0236	9769	203	2255	74
2185	16	138	2151	650	2202	541	0240	9766	202	2181	72
2201	16	139	2166	617	2219	507	0243	9763	201	2109	73
2217	16	140	2181	4,584	2235	4,474	1,0247	9759	200	2,2036	71
2233	16	141	2197	552	2252	441	0250	9756	209	1965	72
2249	16	142	2212	521	2268	409	0254	9752	208	1893	72
2265	16	143	2227	490	2285	377	0258	9749	207	1823	70
2281	17	144	2243	459	2301	345	0261	9745	206	1752	71
2298	16	145	2258	4,429	2318	4,314	1,0265	9742	205	2,1682	69
2314	16	146	2273	399	2334	284	0269	9738	204	1613	69
2330	16	147	2289	369	2351	254	0273	9735	203	1544	68
2346	16	148	2304	340	2368	224	0276	9731	202	1476	68
2362	16	149	2319	312	2384	194	0280	9727	201	1408	68
2378		150	2334	4,284	2401	4,165	1,0284	9724	200	2,1340	68
o,		$0^q$	o,		o,		o,	$0^q$	o,		
		cosin	d	sec	d	cotg	d	coséc	sinus	arc	
		$\frac{1}{\text{Ch } u}$		Ch <i>u</i>		$\frac{1}{\text{Sh } u}$		$\frac{1}{\text{Tgh } u}$	Tgh <i>u</i>	Amb <i>u</i>	<i>u</i>





XIV. (Suite.) — FONCTIONS CIRCULAIRES

Valeurs naturelles.

$u$	$d$	Amh $u$	Tgh $u$	$\frac{1}{\text{Tgh } u}$	Sh $u$	$\frac{1}{\text{Sh } u}$	Ch $u$	$\frac{1}{\text{Ch } u}$						
		arc	sinus	coséc	tang	cotg	sec	cosin						
0,		$0^q$	0,	0,	0,		0,	$0^q$						
2378	16	150	2334	4,284	28	2401	16	4,165	28	1,0284	9724	850	2,1340	67
2394	17	151	2350	256	28	2417	17	137	29	0288	9720	849	1273	66
2411	16	152	2365	228	27	2434	16	108	28	0292	9716	848	1207	66
2427	16	153	2380	201	27	2451	16	080	27	0296	9713	847	1144	66
2443	16	154	2396	174	26	2467	17	053	27	0300	9709	846	1073	66
2459	16	155	2411	4,148	26	2484	17	4,026	27	1,0304	9705	845	2,1009	65
2475	17	156	2426	122	26	2501	16	3,999	27	0308	9701	844	0944	64
2492	17	157	2441	096	25	2517	17	972	26	0312	9697	843	0880	64
2508	16	158	2456	071	25	2534	17	946	26	0316	9694	842	0816	61
2524	16	159	2472	046	25	2551	17	920	25	0320	9690	841	0752	63
2540	16	160	2487	4,021	24	2568	16	3,895	26	1,0324	9686	840	2,0689	63
2556	17	161	2502	3,997	23	2584	17	869	25	0329	9682	839	0626	63
2573	17	162	2517	972	23	2601	17	845	24	0333	9678	838	0563	62
2589	16	163	2533	949	23	2618	17	820	25	0337	9674	837	0501	62
2605	16	164	2548	925	23	2635	16	796	24	0341	9670	836	0439	61
2621	17	165	2563	3,902	23	2651	17	3,772	24	1,0346	9666	835	2,0378	62
2638	17	166	2578	879	23	2668	17	748	24	0350	9662	834	0316	60
2654	16	167	2593	856	22	2685	17	724	23	0354	9658	833	0256	61
2670	16	168	2608	834	22	2702	17	701	23	0359	9654	832	0195	60
2686	17	169	2624	812	22	2719	17	678	23	0363	9650	831	0135	59
2703	16	170	2639	3,790	22	2736	17	3,655	22	1,0367	9646	830	2,0076	60
2719	16	171	2654	768	21	2753	16	633	22	0372	9641	829	2,0016	59
2735	17	172	2669	747	21	2769	17	611	22	0376	9637	828	1,9957	59
2752	16	173	2684	726	21	2786	17	589	22	0381	9633	827	9898	58
2768	16	174	2699	705	21	2803	17	567	21	0386	9629	826	9840	58
2784	17	175	2714	3,684	20	2820	17	3,546	21	1,0390	9625	825	1,9782	58
2801	16	176	2730	664	21	2837	17	525	21	0395	9620	824	9724	57
2817	16	177	2745	643	21	2854	17	504	21	0399	9616	823	9667	57
2833	17	178	2760	624	19	2871	17	483	21	0404	9612	822	9610	57
2850	16	179	2775	604	20	2888	17	462	20	0409	9607	821	9553	56
2866	16	180	2790	3,584	19	2905	17	3,442	20	1,0413	9603	820	1,9497	56
2882	17	181	2805	565	19	2922	17	422	20	0418	9599	819	9441	56
2899	16	182	2820	546	19	2939	17	402	20	0423	9594	818	9385	56
2915	16	183	2835	527	18	2956	17	382	19	0428	9590	817	9329	55
2931	17	184	2850	509	19	2974	17	363	19	0433	9585	816	9274	55
2948	16	185	2865	3,490	18	2991	17	3,344	19	1,0438	9581	815	1,9219	55
2964	17	186	2880	472	18	3008	17	325	19	0443	9576	814	9164	54
2981	16	187	2895	454	18	3025	17	306	19	0447	9572	813	9110	54
2997	16	188	2910	436	18	3042	17	287	19	0452	9567	812	9056	54
3013	17	189	2925	418	18	3059	17	269	18	0457	9563	811	9002	53
3030	16	190	2940	3,401	17	3076	18	3,251	19	1,0463	9558	810	1,8948	53
3046	17	191	2955	384	17	3094	17	232	17	0468	9553	809	8895	53
3063	16	192	2970	367	17	3111	17	215	18	0473	9549	808	8842	53
3079	17	193	2985	350	17	3128	17	197	18	0478	9544	807	8789	52
3096	16	194	3000	333	17	3145	17	179	17	0483	9539	806	8737	52
3112	17	195	3015	3,316	16	3163	17	3,162	17	1,0488	9535	805	1,8685	52
3129	16	196	3030	300	16	3180	17	145	17	0493	9530	804	8633	52
3145	17	197	3045	284	16	3197	17	128	17	0499	9525	803	8581	52
3162	16	198	3060	268	16	3214	17	111	17	0504	9520	802	8529	51
3178	17	199	3075	252	16	3232	18	94	17	0509	9515	801	8478	51
3195		200	3090	3,236	16	3249	17	3,078	16	1,0515	9511	800	1,8427	51
0,		$0^q$	0,			0,					0,	$0^q$		
		cosin	d	sec	d	cotg	d	tang	d	coséc	sinus	arc		
		$\frac{1}{\text{Ch } u}$		Ch $u$		$\frac{1}{\text{Sh } u}$		Sh $u$		$\frac{1}{\text{Tgh } u}$	Tgh $u$	Amh $u$	$u$	$d$

ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u	1		Sh u	1		Ch u	1		O <sup>q</sup>	o,	
		arc	sinus	d	coséc	tang	d	ootg	séc	cosin	O <sup>q</sup>			
o,		O <sup>q</sup>	ī,		o,	ī,	o,	ī,	o,	ī,	O <sup>q</sup>	o,		
10329	70	150	3682	28	6318	3804	29	6196	0122	9878	850	9268	29	
10399	70	151	3710	28	6290	3833	30	6167	0123	9877	849	9239	29	
10469	70	152	3738	28	6262	3863	30	6137	0125	9875	848	9210	29	
10539	71	153	3766	28	6234	3893	30	6107	0127	9873	847	9181	29	
10610	71	154	3794	28	6206	3922	29	6078	0128	9872	846	9153	28	
10680	70	155	3822	27	6178	3952	29	6048	0130	9870	845	9124	28	
10750	70	156	3849	27	6151	3981	29	6019	0132	9868	844	9096	28	
10821	71	157	3876	27	6124	4010	28	5990	0133	9867	843	9068	28	
10891	70	158	3903	27	6097	4038	29	5962	0135	9865	842	9040	28	
10961	71	159	3930	27	6070	4067	28	5933	0137	9863	841	9012	27	
11032	70	160	3957	26	6043	4095	28	5905	0139	9861	840	8985	27	
11102	71	161	3983	26	6017	4123	29	5877	0140	9860	839	8957	28	
11173	71	162	4009	27	5991	4152	27	5848	0142	9858	838	8930	27	
11243	70	163	4036	25	5964	4179	28	5821	0144	9856	837	8903	27	
11314	71	164	4061	26	5939	4207	28	5793	0146	9854	836	8877	26	
11384	71	165	4087	26	5913	4235	27	5765	0148	9852	835	8850	27	
11455	71	166	4113	25	5887	4262	28	5738	0149	9851	834	8823	27	
11525	70	167	4138	26	5862	4290	27	5710	0151	9849	833	8797	26	
11596	71	168	4164	25	5836	4317	27	5683	0153	9847	832	8771	26	
11667	71	169	4189	25	5811	4344	27	5656	0155	9845	831	8745	26	
11738	70	170	4214	25	5786	4371	26	5629	0157	9843	830	8719	26	
11808	71	171	4239	25	5761	4397	27	5603	0159	9841	829	8693	26	
11879	71	172	4264	24	5736	4424	26	5576	0160	9840	828	8667	25	
11950	71	173	4288	24	5712	4450	27	5550	0162	9838	827	8642	26	
12021	71	174	4312	25	5688	4477	26	5523	0164	9836	826	8616	25	
12092	70	175	4337	24	5663	4503	26	5497	0166	9834	825	8591	25	
12162	71	176	4361	24	5639	4529	26	5471	0168	9832	824	8566	25	
12233	71	177	4385	23	5615	4555	26	5445	0170	9830	823	8541	25	
12304	71	178	4409	23	5591	4581	25	5419	0172	9828	822	8516	24	
12375	71	179	4432	24	5568	4606	26	5394	0174	9826	821	8492	25	
12446	71	180	4456	23	5544	4632	25	5368	0176	9824	820	8467	24	
12517	71	181	4479	23	5521	4657	26	5343	0178	9822	819	8443	24	
12588	72	182	4503	23	5497	4683	25	5317	0180	9820	818	8419	24	
12660	72	183	4526	23	5474	4708	25	5292	0182	9818	817	8395	24	
12731	71	184	4549	23	5451	4733	25	5267	0184	9816	816	8371	24	
12802	71	185	4572	22	5428	4758	24	5242	0186	9814	815	8347	24	
12873	71	186	4594	22	5406	4782	25	5218	0188	9812	814	8323	24	
12944	71	187	4617	23	5383	4807	25	5193	0190	9810	813	8299	23	
13016	72	188	4639	23	5361	4832	24	5168	0192	9808	812	8276	24	
13087	71	189	4662	22	5338	4856	24	5144	0194	9806	811	8252	23	
13158	72	190	4684	22	5316	4880	25	5120	0196	9804	810	8229	23	
13230	72	191	4706	22	5294	4905	24	5095	0198	9802	809	8206	23	
13301	71	192	4728	22	5272	4929	24	5071	0201	9799	808	8183	23	
13373	72	193	4750	22	5250	4953	24	5047	0203	9797	807	8160	23	
13444	71	194	4772	21	5228	4977	23	5023	0205	9795	806	8137	22	
13516	72	195	4793	22	5207	5000	24	5000	0207	9793	805	8115	23	
13587	72	196	4815	21	5185	5024	24	4976	0209	9791	804	8092	22	
13659	71	197	4836	22	5164	5048	23	4952	0211	9789	803	8070	23	
13731	72	198	4858	21	5142	5071	23	4929	0214	9786	802	8047	22	
13802	71	199	4879	21	5121	5094	24	4906	0216	9784	801	8025	22	
13874	72	200	4900		5100	5118		4882	0218	9782	800	8003		
o,		O <sup>q</sup>	ī,		o,	ī,	o,	ī,	o,	ī,	O <sup>q</sup>	o,		
		cosin	d	séc	ootg	d	tang	coséc	sinus	arc	Amh u	M u	d	
		1		Ch u	1		Sh u	1	Tgh u					
		Ch u			Sh u			Tgh u						







ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u		$\frac{1}{Tgh u}$	Sh u		$\frac{1}{Sh u}$	Ch u	$\frac{1}{Ch u}$			
o,		arc	sinus	d	coséc	tang	d	cotg	sec	cosin	o <sup>q</sup>	o,	
		O <sup>q</sup>	I,		o,	I,		o,	o,	I,	O <sup>q</sup>	o,	
17511	71	250	5828	17	4172	6172	20	3828	0344	9656	750	7013	17
17585	71	251	5845	16	4155	6192	19	3808	0347	9653	749	6996	18
17659	71	252	5861	16	4139	6211	19	3789	0350	9650	748	6978	18
17732	71	253	5877	17	4123	6230	19	3770	0352	9648	747	6960	17
17806	71	254	5894	16	4106	6249	19	3751	0355	9645	746	6943	18
17881	71	255	5910	16	4090	6268	19	3732	0358	9642	745	6925	17
17955	71	256	5926	16	4074	6287	19	3713	0361	9639	744	6908	17
18029	71	257	5942	16	4058	6306	19	3694	0364	9636	743	6890	18
18103	71	258	5958	16	4042	6325	19	3675	0367	9633	742	6873	17
18177	71	259	5974	16	4026	6344	18	3656	0370	9630	741	6856	18
18252	74	260	5990	15	4010	6362	19	3638	0373	9627	740	6838	17
18326	74	261	6005	16	3995	6381	19	3619	0376	9624	739	6821	17
18400	74	262	6021	16	3979	6400	18	3600	0379	9621	738	6804	17
18475	74	263	6037	15	3963	6418	18	3582	0382	9618	737	6787	17
18549	74	264	6052	16	3948	6437	18	3563	0385	9615	736	6770	17
18624	74	265	6068	15	3932	6455	19	3545	0388	9612	735	6753	17
18698	74	266	6083	15	3917	6474	18	3526	0391	9609	734	6736	16
18773	74	267	6098	16	3902	6492	18	3508	0394	9606	733	6720	17
18848	74	268	6114	15	3886	6510	18	3490	0397	9603	732	6703	17
18923	74	269	6129	15	3871	6529	18	3471	0400	9600	731	6686	17
18997	75	270	6144	15	3856	6547	18	3453	0403	9597	730	6670	17
19072	75	271	6159	15	3841	6565	18	3435	0406	9594	729	6653	16
19147	75	272	6174	15	3826	6583	18	3417	0409	9591	728	6637	17
19222	75	273	6189	15	3811	6601	18	3399	0412	9588	727	6620	17
19297	75	274	6204	15	3796	6619	18	3381	0415	9585	726	6604	17
19372	75	275	6219	14	3781	6637	18	3363	0418	9582	725	6587	16
19447	75	276	6233	15	3767	6655	18	3345	0422	9578	724	6571	16
19523	75	277	6248	15	3752	6673	18	3327	0425	9575	723	6555	16
19598	75	278	6263	14	3737	6691	17	3309	0428	9572	722	6539	16
19673	75	279	6277	15	3723	6708	18	3292	0431	9569	721	6523	16
19749	75	280	6292	14	3708	6726	18	3274	0434	9565	720	6507	16
19824	75	281	6306	15	3694	6744	18	3256	0438	9562	719	6491	16
19900	76	282	6321	14	3679	6762	17	3238	0441	9559	718	6475	16
19975	76	283	6335	14	3665	6779	18	3221	0444	9555	717	6459	16
20051	76	284	6349	15	3651	6797	17	3203	0447	9553	716	6443	16
20126	76	285	6364	14	3636	6814	18	3186	0451	9549	715	6427	15
20202	76	286	6378	14	3622	6832	17	3168	0454	9546	714	6412	16
20278	76	287	6392	14	3608	6849	17	3151	0457	9543	713	6396	16
20354	76	288	6406	14	3594	6866	18	3134	0460	9540	712	6380	16
20430	76	289	6420	14	3580	6884	17	3116	0463	9536	711	6365	15
20505	76	290	6434	14	3566	6901	17	3099	0467	9533	710	6349	15
20581	76	291	6448	14	3552	6918	17	3082	0470	9530	709	6334	16
20657	76	292	6462	13	3538	6935	18	3065	0474	9526	708	6318	16
20734	77	293	6475	14	3525	6953	17	3047	0477	9523	707	6303	15
20810	76	294	6489	14	3511	6970	17	3030	0481	9519	706	6287	15
20886	76	295	6503	13	3497	6987	17	3013	0484	9516	705	6272	15
20962	77	296	6516	14	3484	7004	17	2996	0487	9513	704	6257	15
21039	77	297	6530	14	3470	7021	17	2979	0491	9509	703	6242	15
21115	77	298	6544	13	3456	7038	17	2962	0494	9506	702	6227	15
21192	77	299	6557	13	3443	7055	17	2945	0498	9502	701	6212	16
21268	76	300	6570		3430	7072		2928	0501	9499	700	6196	
o,		O <sup>q</sup>	I,		o,	I,		o,	o,	I,	O <sup>q</sup>	o,	
		cosin	d	sec	cotg	d	tang	coséc	sinus	arc		M u	d
		$\frac{1}{Ch u}$		Ch u	$\frac{1}{Sh u}$		Sh u	$\frac{1}{Tgh u}$	Tgh u	Amh u			

XIV. (Suite.) — FONCTIONS CIRCULAIRES

Valeurs naturelles.

u	d	Amhu		Tghu		Shu		Chu		Tghu		Amhu	u	d			
		arc	sinus	d	coséc	d	tang	d	cotg	d	séc				d	cosin	d
4897	18	300	4540	14	2,2027	68	5095	70	1,9626	76	1,1223	8910	700	1,4268	35		
4915	17	301	4554	14	1959	67	5115	75	9550	75	1232	8903	699	4233	34		
4932	18	302	4568	14	1892	67	5135	75	9475	75	1241	8896	698	4199	34		
4950	18	303	4582	14	1825	66	5155	75	9400	75	1250	8889	697	4165	35		
4968	17	304	4596	14	1759	66	5175	74	9325	74	1260	8881	696	4130	34		
4985	18	305	4610	14	2,1693	65	5195	73	1,9251	74	1,1269	8874	695	1,4096	34		
5003	18	306	4624	14	1628	65	5215	73	9177	73	1278	8867	694	4062	34		
5021	18	307	4638	14	1563	65	5235	73	9104	73	1287	8860	693	4028	34		
5039	18	308	4652	14	1498	65	5255	73	9031	73	1296	8852	692	3994	33		
5056	17	309	4665	14	1434	64	5275	72	8959	72	1306	8845	691	3961	34		
5074	18	310	4679	14	2,1371	63	5295	72	1,8887	72	1,1315	8838	690	1,3927	33		
5092	18	311	4693	14	1308	63	5315	71	8815	71	1325	8830	689	3894	34		
5110	18	312	4707	14	1245	63	5335	71	8744	71	1334	8823	688	3860	35		
5128	17	313	4721	14	1182	63	5355	70	8673	70	1344	8816	687	3827	33		
5145	18	314	4735	14	1121	62	5375	70	8603	70	1353	8808	686	3794	34		
5163	18	315	4749	14	2,1059	61	5396	69	1,8533	69	1,1363	8801	685	1,3760	33		
5181	18	316	4762	14	0998	61	5416	69	8464	69	1372	8793	684	3727	32		
5199	18	317	4776	14	0937	60	5436	69	8395	69	1382	8786	683	3695	33		
5217	18	318	4790	14	0877	60	5457	68	8326	68	1392	8778	682	3662	33		
5235	18	319	4804	14	0817	60	5477	68	8258	68	1402	8771	681	3629	33		
5253	18	320	4818	13	2,0757	59	5498	68	1,8190	68	1,1412	8763	680	1,3596	33		
5271	18	321	4831	14	0698	58	5518	67	8122	67	1421	8755	679	3564	32		
5289	18	322	4845	14	0640	58	5539	66	8055	66	1431	8748	678	3531	32		
5307	17	323	4859	14	0581	58	5559	66	7989	66	1441	8740	677	3499	32		
5324	18	324	4873	14	0523	58	5580	66	7922	66	1451	8733	676	3467	33		
5342	18	325	4886	14	2,0466	57	5600	65	1,7856	65	1,1461	8725	675	1,3434	32		
5360	19	326	4900	14	0409	57	5621	65	7791	65	1471	8717	674	3402	32		
5379	18	327	4914	13	0352	57	5642	64	7725	64	1482	8710	673	3370	32		
5397	18	328	4927	14	0295	57	5662	64	7661	64	1492	8702	672	3338	32		
5415	18	329	4941	14	0239	56	5683	64	7596	64	1502	8694	671	3307	32		
5433	18	330	4955	13	2,0183	55	5704	64	1,7532	64	1,1512	8686	670	1,3275	32		
5451	18	331	4968	14	0128	55	5725	63	7468	63	1523	8679	669	3243	31		
5469	18	332	4982	14	0073	55	5746	63	7405	63	1533	8671	668	3212	31		
5487	18	333	4995	14	2,0018	55	5767	62	7341	62	1544	8663	667	3180	31		
5505	18	334	5009	14	1,9964	54	5787	62	7279	62	1554	8655	666	3149	32		
5523	18	335	5023	13	1,9910	54	5808	62	1,7216	62	1,1565	8647	665	1,3117	31		
5541	19	336	5036	14	9856	53	5829	62	7154	62	1575	8639	664	3086	31		
5560	18	337	5050	14	9803	53	5851	62	7092	62	1586	8631	663	3055	31		
5578	18	338	5063	14	9750	53	5872	61	7031	61	1596	8623	662	3024	31		
5596	18	339	5077	13	9697	52	5893	61	6970	61	1607	8615	661	2993	31		
5614	19	340	5090	14	1,9645	52	5914	61	1,6909	60	1,1618	8607	660	1,2962	31		
5633	18	341	5104	13	9593	52	5935	61	6849	60	1629	8599	659	2931	31		
5651	18	342	5117	14	9541	51	5956	61	6788	60	1640	8591	658	2900	31		
5669	18	343	5131	14	9490	51	5978	60	6729	60	1650	8583	657	2870	30		
5687	19	344	5144	14	9439	51	5999	59	6669	59	1661	8575	656	2839	31		
5706	18	345	5158	13	1,9388	51	6020	59	1,6610	59	1,1672	8567	655	1,2809	30		
5724	19	346	5171	14	9337	50	6042	59	6551	59	1684	8559	654	2778	31		
5743	18	347	5185	14	9287	50	6063	58	6492	58	1695	8551	653	2748	30		
5761	18	348	5198	13	9238	49	6085	58	6434	58	1706	8543	652	2718	30		
5779	18	349	5212	14	9188	50	6106	58	6376	58	1717	8535	651	2688	30		
5798	19	350	5225	13	1,9139	49	6128	57	1,6319	57	1,1728	8526	650	1,2657	31		

0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
cosin	d	séc	d	cotg	d	tang	d	coséc	d	sinus	d	arc	
Ch u		Ch u		Sh u		Sh u		Tgh u		Tgh u		Amhu	u



ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u		$\frac{1}{\text{Tgh } u}$	Sh u		$\frac{1}{\text{Sh } u}$	Ch u	$\frac{1}{\text{Ch } u}$					
o,		O <sup>q</sup>	I,		o,	I,		o,	o,	I,	O <sup>q</sup>	o,			
		arc	sinus	d	coséc	tang	d	cotg	sec	cosin					
2127	7	300	6570	14	3430	7072	17	2928	0501	9499	700	6196	15		
2134	8	301	6584	13	3416	7089	16	2911	0505	9495	699	6181	14		
2142	8	302	6597	13	3403	7105	17	2895	0508	9492	698	6167	15		
2150	8	303	6610	14	3390	7122	17	2878	0512	9488	697	6152	15		
2157	7	304	6624	13	3376	7139	17	2861	0515	9485	696	6137	15		
2165	8	305	6637	13	3363	7156	16	2844	0519	9481	695	6122	15		
2173	8	306	6650	13	3350	7172	17	2828	0522	9478	694	6107	15		
2181	8	307	6663	13	3337	7189	16	2811	0526	9474	693	6092	15		
2188	7	308	6676	13	3324	7205	17	2795	0529	9471	692	6078	14		
2196	8	309	6689	13	3311	7222	16	2778	0533	9467	691	6063	15		
2204		310	6702	13	3298	7238		2762	0537	9463	690	6048	14		
2211	7	311	6715	12	3285	7255	17	2745	0540	9460	689	6034	14		
2219	8	312	6727	12	3273	7271	17	2729	0544	9456	688	6019	15		
2227	8	313	6740	13	3260	7288	16	2712	0548	9452	687	6005	14		
2235	8	314	6753	13	3247	7304	16	2696	0551	9449	686	5990	15		
2242	7	315	6766	12	3234	7320	17	2680	0555	9445	685	5976	14		
2250	8	316	6778	12	3222	7337	16	2663	0559	9441	684	5962	14		
2258	8	317	6791	12	3209	7353	16	2647	0562	9438	683	5947	15		
2266	8	318	6803	13	3197	7369	16	2631	0566	9434	682	5933	14		
2273	7	319	6816	13	3184	7386	17	2614	0570	9430	681	5919	14		
2281	8	320	6828	12	3172	7402	16	2598	0573	9427	680	5905	14		
2289	8	321	6841	12	3159	7418	16	2582	0577	9423	679	5891	14		
2297	8	322	6853	12	3147	7434	16	2566	0581	9419	678	5877	15		
2305	8	323	6865	13	3135	7450	16	2550	0585	9415	677	5862	14		
2312	7	324	6878	12	3122	7466	16	2534	0589	9411	676	5848	14		
2320	8	325	6890	12	3110	7482	16	2518	0592	9408	675	5834	13		
2328	8	326	6902	12	3098	7498	16	2502	0596	9404	674	5821	14		
2336	8	327	6914	12	3086	7514	16	2486	0600	9400	673	5807	14		
2344	8	328	6926	12	3074	7530	16	2470	0604	9396	672	5793	14		
2352	7	329	6938	12	3062	7546	16	2454	0608	9392	671	5779	14		
2359	8	330	6950	12	3050	7562	16	2438	0612	9388	670	5765	14		
2367	8	331	6962	12	3038	7578	15	2422	0616	9384	669	5751	13		
2375	8	332	6974	12	3026	7593	16	2407	0619	9381	668	5738	14		
2383	8	333	6986	12	3014	7609	16	2391	0623	9377	667	5724	14		
2391	8	334	6998	11	3002	7625	16	2375	0627	9373	666	5710	13		
2399	8	335	7009	12	2991	7641	15	2359	0631	9369	665	5697	14		
2407	8	336	7021	12	2979	7656	16	2344	0635	9365	664	5683	13		
2415	8	337	7033	11	2967	7672	16	2328	0639	9361	663	5670	14		
2422	7	338	7044	12	2956	7688	15	2312	0643	9357	662	5656	13		
2430	8	339	7056	12	2944	7703	16	2297	0647	9353	661	5643	14		
2438	8	340	7068	11	2932	7719	15	2281	0651	9349	660	5629	13		
2446	8	341	7079	12	2921	7734	16	2266	0655	9345	659	5616	13		
2454	8	342	7091	11	2909	7750	15	2250	0659	9341	658	5603	14		
2462	8	343	7102	11	2898	7765	16	2235	0663	9337	657	5589	13		
2470	8	344	7113	12	2887	7781	15	2219	0668	9332	656	5576	13		
2478	8	345	7125	11	2875	7796	16	2204	0672	9328	655	5563	13		
2486	8	346	7136	11	2864	7812	15	2188	0676	9324	654	5550	14		
2494	8	347	7147	12	2853	7827	16	2173	0680	9320	653	5536	13		
2502	8	348	7159	11	2841	7843	15	2157	0684	9316	652	5523	13		
2510	8	349	7170	11	2830	7858	15	2142	0688	9312	651	5510	13		
2518	8	350	7181	11	2819	7873	15	2127	0692	9308	650	5497	13		
o,		O <sup>q</sup>	I,		o,	I,		o,	o,	I,	O <sup>q</sup>	o,			
			cosin	d	sec	cotg	d	tang	coséc	sinus	arc				
			$\frac{1}{\text{Ch } u}$		Ch u	$\frac{1}{\text{Sh } u}$		Sh u	$\frac{1}{\text{Tgh } u}$	Tgh u	Amh u	M u	d		



ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u	$\frac{1}{Tgh u}$		Sh u	$\frac{1}{Sh u}$		Ch u	$\frac{1}{Ch u}$		O <sup>q</sup>	o,	
		arc	sinus	d	coséc	tang	d	cotg	sec	cosin	O <sup>q</sup>			
o,		O <sup>q</sup>	I,		o,	I,		o,	o,	I,		O <sup>q</sup>	o,	
2518	8	350	7181	11	2819	7873	15	2127	0692	9308		650	5497	13
2526	8	3 1	7192	11	2808	7888	16	2112	0697	9303		649	5484	13
2534	8	352	7203	11	2797	7904	15	2096	0701	9299		648	5471	13
2542	8	353	7214	11	2786	7919	15	2081	0705	9295		647	5458	13
2550	8	354	7225	11	2775	7934	15	2066	0709	9291		646	5445	13
2558	8	355	7236	11	2764	7949	16	2051	0713	9287		645	5432	13
2566	8	356	7247	11	2753	7965	15	2035	0718	9282		644	5419	13
2574	8	357	7258	11	2742	7980	15	2020	0722	9278		643	5406	12
2582	8	358	7269	10	2731	7995	15	2005	0726	9274		642	5394	13
2590	8	359	7279	11	2721	8010	15	1990	0731	9269		641	5381	13
2598	8	360	7290	11	2710	8025	15	1975	0735	9265		640	5368	13
2606	8	361	7301	11	2699	8040	15	1960	0739	9261		639	5355	12
2614	8	362	7312	10	2688	8055	15	1945	0744	9256		638	5343	13
2623	8	363	7322	11	2678	8070	15	1930	0748	9252		637	5330	13
2631	8	364	7333	11	2667	8085	15	1915	0752	9248		636	5317	12
2639	8	365	7344	10	2656	8100	15	1900	0757	9243		635	5305	13
2647	8	366	7354	10	2646	8115	15	1885	0761	9239		634	5292	12
2655	8	367	7365	10	2635	8130	15	1870	0766	9234		633	5280	13
2663	8	368	7375	10	2625	8145	15	1855	0770	9230		632	5267	12
2671	8	369	7386	11	2614	8160	15	1840	0774	9226		631	5255	13
2680	8	370	7396	10	2604	8175	15	1825	0779	9221		630	5242	12
2688	8	371	7406	11	2594	8190	15	1810	0783	9217		629	5230	12
2696	8	372	7417	10	2583	8205	14	1795	0788	9212		628	5218	13
2704	8	373	7427	10	2573	8219	15	1781	0792	9208		627	5205	12
2712	8	374	7437	10	2563	8234	15	1766	0797	9203		626	5193	12
2720	9	375	7447	11	2553	8249	15	1751	0802	9198		625	5181	13
2729	8	376	7458	10	2542	8264	14	1736	0806	9194		624	5168	12
2737	8	377	7468	10	2532	8278	15	1722	0811	9189		623	5156	12
2745	8	378	7478	10	2522	8293	15	1707	0815	9185		622	5144	12
2753	8	379	7488	10	2512	8308	15	1692	0820	9180		621	5132	12
2762	9	380	7498	10	2502	8323	14	1677	0825	9175		620	5120	13
2770	8	381	7508	10	2492	8337	15	1663	0829	9171		619	5107	12
2778	8	382	7518	10	2482	8352	14	1648	0834	9166		618	5095	12
2786	8	383	7528	10	2472	8366	15	1634	0839	9161		617	5083	12
2795	9	384	7538	10	2462	8381	15	1619	0843	9157		616	5071	12
2803	8	385	7548	10	2452	8396	14	1604	0848	9152		615	5059	12
2811	8	386	7558	9	2442	8410	15	1590	0853	9147		614	5047	12
2820	9	387	7567	10	2433	8425	14	1575	0857	9143		613	5035	12
2828	8	388	7577	10	2423	8439	15	1561	0862	9138		612	5023	12
2836	8	389	7587	10	2413	8454	14	1546	0867	9133		611	5011	11
2844	8	390	7597	9	2403	8468	15	1532	0872	9128		610	5000	12
2853	9	391	7606	10	2394	8483	14	1517	0876	9124		609	4988	12
2861	9	392	7616	10	2384	8497	15	1503	0881	9119		608	4976	12
2870	9	393	7626	10	2374	8512	14	1488	0886	9114		607	4964	12
2878	8	394	7635	9	2365	8526	15	1474	0891	9109		606	4952	11
2886	9	395	7645	9	2355	8541	14	1459	0896	9104		605	4941	12
2895	8	396	7654	10	2346	8555	15	1445	0901	9099		604	4929	12
2903	8	397	7664	9	2336	8570	14	1430	0906	9094		603	4917	11
2911	8	398	7673	9	2327	8584	14	1416	0911	9089		602	4906	12
2920	8	399	7683	9	2317	8598	15	1402	0915	9085		601	4894	12
2928	8	400	7692	9	2308	8613	15	1387	0920	9080		600	4882	12
o,		O <sup>q</sup>	I,		o,	I,		o,	o,	I,		O <sup>q</sup>	o,	
			cosin	d	sec	cotg	d	tang	coséc	sinus		arc	M u	d
			$\frac{1}{Ch u}$		Ch u	$\frac{1}{Sh u}$		Sh u	$\frac{1}{Tgh u}$	Tgh u		Amh u	M u	d

XIV. (Suite.) — FONCTIONS CIRCULAIRES

Valeurs naturelles.

$u$	$d$	$Amh u$	$Tgh u$	$\frac{1}{Tgh u}$	$Sh u$	$\frac{1}{Sh u}$	$Ch u$	$\frac{1}{Ch u}$	$o^q$	$u$	$d$
$o,$		$o,$	$o,$	$o,$	$o,$	$o,$	$o,$	$o,$	$o^q$	$o,$	$o^q$
		arc	sinus	coséc	tang	cotg	sec	coséc		arc	
		$\frac{1}{Ch u}$	$\frac{1}{Tgh u}$	$\frac{1}{Sh u}$	$\frac{1}{Tgh u}$	$\frac{1}{Sh u}$	$\frac{1}{Tgh u}$	$\frac{1}{Ch u}$		$\frac{1}{Ch u}$	$\frac{1}{Tgh u}$
6743	19	400	5878	1,7015	7265	1,3764	1,2361	8090	600	1,1242	27
6762	20	401	5891	6970	7289	3717	2375	8081	599	1215	27
6782	20	402	5903	6940	7314	3677	2389	8072	598	1188	27
6801	19	403	5916	6910	7338	3628	2403	8062	597	1162	27
6821	19	404	5929	6867	7362	3584	2418	8053	596	1135	27
6840	20	405	5941	1,6832	7386	1,3539	1,2432	8044	595	1,1109	27
6860	20	406	5954	6796	7410	3495	2446	8034	594	1082	27
6879	19	407	5966	6760	7435	3450	2461	8025	593	1056	27
6899	19	408	5979	6725	7459	3406	2476	8016	592	1030	27
6918	20	409	5992	6690	7484	3362	2490	8006	591	1004	27
6938	20	410	6004	1,6655	7508	1,3319	1,2505	7997	590	1,0977	27
6958	19	411	6017	6620	7533	3275	2520	7987	589	0951	26
6977	20	412	6029	6586	7557	3232	2535	7978	588	0925	26
6997	20	413	6042	6551	7582	3189	2549	7968	587	0899	26
7017	20	414	6054	6517	7607	3146	2564	7959	586	0873	26
7037	19	415	6067	1,6483	7632	1,3103	1,2579	7949	585	1,0847	26
7056	20	416	6079	6449	7657	3061	2595	7940	584	0821	25
7076	20	417	6092	6416	7682	3018	2610	7930	583	0796	26
7096	20	418	6104	6382	7707	2976	2625	7921	582	0770	26
7116	20	419	6117	6349	7732	2934	2640	7911	581	0744	26
7136	20	420	6129	1,6316	7757	1,2892	1,2656	7902	580	1,0718	25
7156	19	421	6141	6283	7782	2850	2671	7892	579	0693	25
7175	20	422	6154	6250	7807	2809	2687	7882	578	0667	26
7195	20	423	6166	6217	7833	2767	2702	7873	577	0642	26
7215	20	424	6179	6185	7858	2726	2718	7863	576	0616	25
7235	20	425	6191	1,6153	7883	1,2685	1,2734	7853	575	1,0591	25
7255	20	426	6203	6121	7909	2644	2750	7843	574	0566	25
7275	20	427	6216	6089	7934	2603	2765	7834	573	0540	26
7295	20	428	6228	6057	7960	2563	2781	7824	572	0515	25
7316	20	429	6240	6025	7986	2522	2797	7814	571	0490	25
7336	20	430	6252	1,5994	8012	1,2482	1,2813	7804	570	1,0465	25
7356	20	431	6265	5963	8037	2442	2830	7794	569	0440	25
7376	20	432	6277	5931	8063	2402	2846	7785	568	0415	25
7396	20	433	6289	5900	8089	2362	2862	7775	567	0390	25
7416	21	434	6301	5870	8115	2323	2879	7765	566	0365	25
7437	20	435	6314	1,5839	8141	1,2283	1,2895	7755	565	1,0340	25
7457	20	436	6326	5809	8167	2244	2912	7745	564	0315	25
7477	20	437	6338	5778	8194	2205	2928	7735	563	0290	25
7498	20	438	6350	5748	8220	2166	2945	7725	562	0265	25
7518	20	439	6362	5718	8246	2127	2962	7715	561	0241	24
7538	21	440	6374	1,5688	8273	1,2088	1,2978	7705	560	1,0216	25
7559	20	441	6386	5658	8299	2049	2995	7695	559	0191	25
7579	20	442	6398	5629	8326	2011	3012	7685	558	0167	24
7600	21	443	6410	5600	8352	1973	3029	7675	557	0142	25
7620	20	444	6423	5570	8379	1934	3046	7665	556	0118	24
7640	21	445	6435	1,5541	8406	1,1896	1,3064	7655	555	1,0093	25
7661	21	446	6447	5512	8433	1859	3081	7645	554	0069	24
7682	21	447	6459	5483	8460	1821	3098	7635	553	0045	24
7702	21	448	6471	5455	8487	1783	3116	7624	552	0020	25
7723	20	449	6483	5426	8514	1746	3133	7614	551	0,9996	24
7743	20	450	6494	1,5398	8541	1,1708	1,3151	7604	550	0,9972	24
$o,$		$o^q$	$o,$	$o,$	$o,$	$o,$	$o,$	$o,$	$o^q$	$o,$	$o^q$
		coséc	d	sec	d	tang	d	coséc	d	sinus	d
		$\frac{1}{Ch u}$		$\frac{1}{Sh u}$		$\frac{1}{Sh u}$		$\frac{1}{Tgh u}$		$\frac{1}{Tgh u}$	

ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u	$\frac{1}{Tgh u}$	Sh u	$\frac{1}{Sh u}$	Ch u	$\frac{1}{Ch u}$							
o,		arc	sinus	coséc	tang	cote	sec	cosin	O <sup>q</sup>	o,					
		$\bar{1}$ ,	d	$\bar{1}$	$\bar{1}$ ,	d	$\bar{1}$ ,	$\bar{1}$ ,	$\bar{1}$ ,	o,					
2928		400	7692	10	2308	8613	14	1387	0920	5	9080	600	4882		
2937	9	401	7702	9	2298	8627	14	1373	0925	5	9075	599	4871	11	12
2945	8	402	7711	9	2289	8641	15	1359	0930	5	9070	598	4859	11	11
2954	8	403	7720	9	2280	8656	14	1344	0935	5	9065	597	4848	12	12
2962	8	404	7729	10	2271	8670	14	1330	0940	5	9060	596	4836	11	11
2971	9	405	7739	9	2261	8684	14	1316	0945	5	9055	595	4825	12	12
2979	8	406	7748	9	2252	8698	15	1302	0950	6	9050	594	4813	11	12
2988	9	407	7757	9	2243	8713	14	1287	0956	5	9044	593	4802	12	12
2996	8	408	7766	9	2234	8727	14	1273	0961	5	9039	592	4790	11	11
3005	9	409	7775	10	2225	8741	14	1259	0966	5	9034	591	4779	12	12
3013	8	410	7785	9	2215	8755	15	1245	0971	5	9029	590	4767	11	12
3022	9	411	7794	9	2206	8770	14	1230	0976	5	9024	589	4756	11	11
3030	8	412	7803	9	2197	8784	14	1216	0981	5	9019	588	4745	12	12
3039	9	413	7812	9	2188	8798	14	1202	0986	5	9014	587	4733	11	11
3047	8	414	7821	9	2179	8812	14	1188	0991	6	9009	586	4722	11	11
3056	9	415	7830	9	2170	8826	14	1174	0997	5	9003	585	4711	11	11
3065	9	416	7839	8	2161	8840	15	1160	1002	5	8998	584	4700	12	12
3073	8	417	7847	9	2153	8855	14	1145	1007	5	8993	583	4688	11	11
3082	9	418	7856	9	2144	8869	14	1131	1012	6	8988	582	4677	11	11
3090	8	419	7865	9	2135	8883	14	1117	1018	5	8982	581	4666	11	11
3099	9	420	7874	9	2126	8897	14	1103	1023	5	8977	580	4655	11	11
3108	9	421	7883	8	2117	8911	14	1089	1028	5	8972	579	4644	11	11
3116	8	422	7891	9	2109	8925	14	1075	1033	6	8967	578	4633	11	11
3125	9	423	7900	9	2100	8939	14	1061	1039	5	8961	577	4622	11	11
3134	8	424	7909	9	2091	8953	14	1047	1044	6	8956	576	4611	11	11
3142	8	425	7918	8	2082	8967	14	1033	1050	5	8950	575	4600	11	11
3151	9	426	7926	8	2074	8981	14	1019	1055	5	8945	574	4589	11	11
3160	9	427	7935	8	2065	8995	14	1005	1060	6	8940	573	4578	11	11
3168	8	428	7943	9	2057	9009	14	991	1066	5	8934	572	4567	11	11
3177	9	429	7952	8	2048	9023	14	977	1071	6	8929	571	4556	11	11
3186	9	430	7960	9	2040	9037	14	963	1077	5	8923	570	4545	11	11
3195	9	431	7969	8	2031	9051	14	949	1082	6	8918	569	4534	11	11
3203	8	432	7977	9	2023	9065	14	935	1088	5	8912	568	4523	11	11
3212	9	433	7986	8	2014	9079	14	921	1093	6	8907	567	4512	11	11
3221	9	434	7994	8	2006	9093	14	907	1099	5	8901	566	4501	11	11
3230	9	435	8003	8	1997	9107	14	893	1104	6	8896	565	4490	10	10
3238	8	436	8011	8	1989	9121	14	879	1110	5	8890	564	4480	11	11
3247	9	437	8019	8	1981	9135	14	865	1115	6	8885	563	4469	11	11
3256	9	438	8028	8	1972	9149	14	851	1121	6	8879	562	4458	11	11
3265	9	439	8036	8	1964	9163	13	837	1127	5	8873	561	4447	10	10
3274	9	440	8044	8	1956	9176	14	824	1132	6	8868	560	4437	11	11
3283	9	441	8053	8	1947	9190	14	810	1138	6	8862	559	4426	11	11
3292	9	442	8061	8	1939	9204	14	796	1144	6	8856	558	4415	10	10
3300	8	443	8069	8	1931	9218	14	782	1149	5	8851	557	4405	11	11
3309	9	444	8077	8	1923	9232	14	768	1155	6	8845	556	4394	11	11
3318	9	445	8085	8	1915	9246	14	754	1161	5	8839	555	4383	10	10
3327	9	446	8093	8	1907	9260	14	740	1166	6	8834	554	4373	10	10
3336	9	447	8101	8	1899	9274	13	726	1172	6	8828	553	4362	10	10
3345	9	448	8109	8	1891	9287	14	713	1178	6	8822	552	4352	11	11
3354	9	449	8117	8	1883	9301	14	699	1184	6	8816	551	4341	11	11
3363	9	450	8125	8	1875	9315	14	685	1190	6	8810	550	4331	10	10
o,		O <sup>q</sup>	$\bar{1}$ ,		o,	$\bar{1}$ ,		o,	$\bar{1}$ ,		O <sup>q</sup>	o,			
		cosin	d	sec	cotg	d	tang	coséc	d	sinus	arc				
		$\frac{1}{Ch u}$		Ch u	$\frac{1}{Sh u}$		Sh u	$\frac{1}{Tgh u}$		Tgh u	Amh u	M u	d		



ET HYPERBOLIQUES.

Logarithmes.

M u	d	Amh u	Tgh u	$\frac{1}{Tgh u}$	Sh u	$\frac{1}{Sh u}$	Ch u	$\frac{1}{Ch u}$						
		aro	sinus	d	coséc	tang	d	cct						séc
0,		O <sup>q</sup>	I,	0,	I,	0,	0,	I,	O <sup>q</sup>	0,				
3363	9	450	8125	8	1875	9315	14	0685	1190	5	8810	550	4331	11
3372	9	451	8133	8	1867	9329	14	0671	1195	6	8805	549	4320	10
3381	9	452	8141	8	1859	9343	13	0657	1201	6	8799	548	4310	10
3390	9	453	8149	8	1851	9356	14	0644	1207	6	8793	547	4299	10
3399	9	454	8157	8	1843	9370	14	0630	1213	6	8787	546	4289	11
3408	9	455	8165	8	1835	9384	14	0616	1219	6	8781	545	4278	10
3417	9	456	8173	8	1827	9398	14	0602	1225	6	8775	544	4268	10
3426	9	457	8181	8	1819	9412	13	0588	1231	6	8769	543	4258	11
3435	9	458	8189	8	1811	9425	14	0575	1237	6	8763	542	4247	10
3444	9	459	8196	7	1804	9439	14	0561	1243	6	8757	541	4237	10
3453	9	460	8204	6	1796	9453	14	0547	1249	6	8751	540	4227	11
3462	9	461	8212	6	1788	9467	13	0533	1255	6	8745	539	4216	10
3471	10	462	8219	7	1781	9480	14	0520	1261	6	8739	538	4206	10
3481	9	463	8227	8	1773	9494	14	0506	1267	6	8733	537	4196	10
3490	9	464	8235	8	1765	9508	14	0492	1273	6	8727	536	4185	10
3499	9	465	8242	7	1758	9522	13	0478	1279	6	8721	535	4175	10
3508	9	466	8250	8	1750	9535	14	0465	1285	6	8715	534	4165	10
3517	9	467	8258	8	1742	9549	14	0451	1291	6	8709	533	4155	10
3526	9	468	8265	7	1735	9563	14	0437	1297	6	8703	532	4145	11
3536	10	469	8273	8	1727	9576	13	0424	1304	6	8696	531	4134	10
3545	9	470	8280	7	1720	9590	14	0410	1310	6	8690	530	4124	10
3554	9	471	8288	8	1712	9604	13	0396	1316	6	8684	529	4114	10
3563	9	472	8295	7	1705	9617	13	0383	1322	6	8678	528	4104	10
3573	10	473	8303	8	1697	9631	14	0369	1329	7	8671	527	4094	10
3582	9	474	8310	7	1690	9645	14	0355	1335	6	8665	526	4084	10
3591	9	475	8317	7	1683	9659	13	0341	1341	6	8659	525	4074	10
3600	9	476	8325	8	1675	9672	13	0328	1347	6	8653	524	4064	10
3610	10	477	8332	7	1668	9686	14	0314	1354	7	8646	523	4054	10
3619	9	478	8339	7	1661	9700	14	0300	1360	6	8640	522	4044	10
3628	10	479	8347	8	1653	9713	13	0287	1367	7	8633	521	4034	10
3638	9	480	8354	7	1646	9727	14	0273	1373	6	8627	520	4024	10
3647	9	481	8361	7	1639	9741	14	0259	1379	6	8621	519	4014	10
3656	9	482	8369	8	1631	9754	13	0246	1386	7	8614	518	4004	10
3666	10	483	8376	7	1624	9768	14	0232	1392	6	8608	517	3994	10
3675	9	484	8383	7	1617	9782	14	0218	1399	7	8601	516	3984	10
3685	10	485	8390	7	1610	9795	13	0205	1405	6	8595	515	3974	10
3694	9	486	8397	7	1603	9809	14	0191	1412	7	8588	514	3964	10
3704	10	487	8404	7	1596	9823	14	0177	1418	6	8582	513	3954	9
3713	9	488	8411	7	1589	9836	13	0164	1425	7	8575	512	3945	10
3723	10	489	8418	7	1582	9850	14	0150	1431	6	8569	511	3935	10
3732	9	490	8426	8	1574	9864	14	0136	1438	7	8562	510	3925	10
3742	10	491	8433	7	1567	9877	13	0123	1445	6	8555	509	3915	10
3751	9	492	8440	7	1560	9891	14	0109	1451	6	8549	508	3905	10
3761	10	493	8447	7	1553	9904	13	0096	1458	7	8542	507	3896	9
3770	9	494	8454	7	1546	9918	14	0082	1465	6	8535	506	3886	10
3780	10	495	8460	6	1540	9932	14	0068	1471	7	8529	505	3876	10
3789	9	496	8467	7	1533	9945	13	0055	1478	7	8522	504	3866	10
3799	10	497	8474	7	1526	9959	14	0041	1485	7	8515	503	3857	9
3808	9	498	8481	7	1519	9973	14	0027	1492	6	8508	502	3847	10
3818	10	499	8488	7	1512	9986	13	0014	1498	7	8502	501	3837	10
3828	10	500	8495	7	1505	*0000	14	0000	1505	7	8495	500	3828	9
0,		O <sup>q</sup>	I,	0,	I,	0,	0,	I,	O <sup>q</sup>	0,			0,	
		cosin	d	séc	cotg	d	tang	coséc	d	sinus	aro	Amh u	M u	d
		$\frac{1}{Ch u}$			$\frac{1}{Sh u}$			$\frac{1}{Tgh u}$						

XV. — FONCTIONS CIRCULAIRES NATURELLES A DIX DÉCIMALES.

Arc.	Sinus.	Tangente.	Cotangente.	Cosinus.	
<sup>q</sup> 0,00	0,0000 0000 00	0,0000 0000 00	∞	1,0000 0000 00	<sup>q</sup> 1,00
01	0,0157 0731 73	0,0157 0915 53	63 6567 4116 29	0,9998 7663 25	0,99
02	0,0314 1075 91	0,0314 2626 60	31,8205 1595 38	0,9995 0656 04	98
03	0,0471 0645 07	0,0471 5880 29	21,2049 4878 97	0,9988 8987 50	97
04	0,0627 9031 95	0,0629 1466 73	15,8945 4484 39	0,9980 2672 84	96
0,05	0,0784 5999 57	0,0787 0170 68	12,7062 0473 62	0,9969 1733 37	0,95
06	0,0941 0831 33	0,0945 2783 12	10,5788 9499 34	0,9955 6196 46	94
07	0,1097 3431 11	0,1104 0102 78	9,0578 8668 62	0,9939 6095 55	93
08	0,1253 3323 36	0,1263 2937 84	7,9158 1508 83	0,9921 1470 13	92
09	0,1409 0123 19	0,1423 2107 57	7,0263 6622 90	0,9900 2365 77	91
0,10	0,1564 3446 50	0,1583 8444 03	6,3137 5151 47	0,9876 8834 06	0,90
11	0,1719 2910 03	0,1745 2793 89	5,7297 4164 67	0,9851 0932 62	89
12	0,1873 8131 46	0,1907 6020 22	5,2421 8358 11	0,9822 8725 07	88
13	0,2027 8729 54	0,2070 9004 44	4,8228 1735 22	0,9792 2281 06	87
14	0,2181 4324 14	0,2235 2648 29	4,4737 4282 92	0,9759 1676 19	86
0,15	0,2334 4536 39	0,2400 7875 91	4,1652 9977 01	0,9723 6992 04	0,85
16	0,2486 8988 72	0,2567 5636 04	3,8947 4745 49	0,9685 8316 11	84
17	0,2638 7305 00	0,2735 6904 31	3,6533 8435 47	0,9645 5741 85	83
18	0,2789 9110 60	0,2905 2685 67	3,4420 2237 07	0,9602 9368 57	82
19	0,2940 4032 52	0,3076 4016 97	3,2505 5080 13	0,9557 9301 48	81
0,20	0,3090 1699 44	0,3249 1969 62	3,0776 8353 72	0,9510 5651 63	0,80
21	0,3239 1711 82	0,3403 7652 57	2,9207 6098 93	0,9460 8535 88	79
22	0,3387 3792 02	0,3600 2215 31	2,7776 0685 39	0,9408 8076 60	78
23	0,3534 7484 38	0,3778 6851 18	2,6464 2321 03	0,9354 4403 08	77
24	0,3681 2455 27	0,3959 2800 88	2,5237 1168 94	0,9297 7648 59	76
0,25	0,3826 8343 24	0,4142 1356 24	2,4142 1356 24	0,9238 7953 25	0,75
26	0,3971 4789 06	0,4327 3864 22	2,3108 6365 39	0,9177 5462 57	74
27	0,4115 1435 86	0,4515 1731 31	2,2147 5449 78	0,9114 0327 66	73
28	0,4257 7929 16	0,4705 6428 12	2,1251 0817 32	0,9048 2705 25	72
29	0,4399 3916 99	0,4898 9494 50	2,0412 5396 71	0,8980 2757 58	71
0,30	0,4539 9049 97	0,5095 2544 95	1,9626 1050 55	0,8919 0652 42	0,70
31	0,4679 2981 43	0,5294 7274 52	1,8886 3434 16	0,8857 6563 01	69
32	0,4817 5367 41	0,5497 5465 22	1,8189 9324 73	0,8793 0668 00	68
33	0,4954 5866 84	0,5703 8992 97	1,7531 8663 25	0,8726 3151 44	67
34	0,5090 4141 58	0,5913 9835 14	1,6909 0705 58	0,8657 4202 70	66
0,35	0,5224 9856 47	0,6128 0978 81	1,6318 5168 71	0,8582 4016 44	0,65
36	0,5358 2679 50	0,6346 1929 75	1,5757 4786 00	0,8504 2792 55	64
37	0,5490 2281 80	0,6568 7722 24	1,5223 5450 69	0,8423 0736 14	63
38	0,5620 8337 79	0,6795 9929 82	1,4714 5531 58	0,8338 8057 43	62
39	0,5750 0325 20	0,7028 1177 12	1,4228 5607 74	0,8248 4971 74	61
0,40	0,5877 8525 23	0,7265 4252 80	1,3763 8192 05	0,8156 1699 44	0,60
41	0,6004 2022 53	0,7508 2123 80	1,3318 7495 15	0,8066 8465 85	59
42	0,6129 0705 37	0,7756 7951 10	1,2891 9223 18	0,7970 5501 24	58
43	0,6252 4265 63	0,8011 5107 06	1,2482 0403 64	0,7874 3049 93	57
44	0,6374 2398 97	0,8272 7194 60	1,2087 9235 04	0,7775 1324 28	56
0,45	0,6494 4804 83	0,8540 8068 55	1,1708 4956 61	0,7674 0596 56	0,55
46	0,6613 1186 53	0,8816 1859 24	1,1342 7734 93	0,7561 1106 96	54
47	0,6730 1251 35	0,9099 2998 82	1,0989 8565 05	0,7436 3109 50	53
48	0,6845 4710 59	0,9390 6250 58	1,0648 9184 03	0,7299 6824 74	52
49	0,6959 1279 66	0,9690 6741 72	1,0319 1994 93	0,7151 2629 78	51
0,50	0,7071 0678 12	1,0000 0000 00	1,0000 0000 00	0,7071 0678 12	0,50
<sub>q</sub>	Cosinus.	Cotangente.	Tangente.	Sinus.	Arc.

Dix-millièmes.	0,000		0,001		0,002		0,003		0,004	
	o,00	Sin. Tg.	o,00	Sin. Tg.	o,00	Sin. Tg.	o,00	Sin. Tg.	o,00	Sin. Tg.
1	015707	96 96	17278	751 777	3298	6663 6843	4869	4494 5071	6440	2204 3740
2	031415	93 93	18819	545 578	3455	7430 7657	5026	5271 5066	6597	2667 4403
3	047123	89 89	20420	338 381	3612	8237 8473	5183	6047 6743	6754	3728 5369
4	062831	85 86	21991	131 184	3769	9023 9290	5340	6821 7583	6911	4188 6139
5	078539	81 83	23561	923 989	3926	9807 0110	5497	7594 8425	7068	5246 7012
6	094247	77 81	25132	715 794	4084	0591 0932	5654	8366 9211	7225	6002 7889
7	109955	72 79	26703	506 601	4241	1374 1755	5811	9137 0119	7382	6757 8769
8	125663	67 77	28274	296 409	4398	2153 2581	5968	9966 0919	7539	7509 9652
9	141371	62 76	29845	086 219	4555	2936 3409	6126	0674 1823	7696	8260 0549
10	157079	57 76	31415	875 030	4712	3715 4239	6283	1440 2680	7853	9009 1431









XVII. — TABLES DE DIVERSES TRANSCENDANTES.

Valeurs logarithmiques de la fonction  $\Gamma(1+x) = \int_0^\infty e^{-x} x^x dx = \int_0^1 \left[ \log \frac{1}{x} \right]^x dx$ .

Table with columns x (0 to 9) and d (187 to 182). Rows represent values of Gamma(1+x) for x from 0.0 to 0.9.

Pour x entier,  $\Gamma(1+x) = 1.2.3...x = x!$

Table with columns x (0 to 99) and Log Gamma(1+x). Rows show logarithmic values for integers from 0 to 99.

Pour -1 < x < 1,  $\log \Gamma(1+x) = \frac{1}{2} \log \left( \frac{\pi x}{\sin \pi x} \cdot \frac{1-x}{1+x} \right) + a_1 x - a_2 x^2 - a_3 x^3 - a_4 x^4 - \dots$

Pour x très-grand,  $\log \Gamma(1+x) = \log \sqrt{2\pi} + \left(x + \frac{1}{2}\right) \log x - Mx + \frac{b_1}{x} - \frac{b_2}{x^2} + \frac{b_3}{x^3} - \frac{b_4}{x^4} + \dots$

Table with columns Log and rows a1 through a7, b1 through b11, and sqrt(2pi) and M.

a1 = 0,1836 1290 38. M = 0,4342 9448 1903. b\_{2n+1} = \frac{MB\_{2n+1}}{(2n+1)(2n+2)}

Logarithmes des nombres de Bernoulli.

Table with columns B1 through B24 and their logarithmic values.

TABLES DE DIVERSES TRANSCENDANTES.

Logarithme intégral  $\text{lix} = \int_0^x \frac{dx}{\log x}$ .

$\log x$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7,	-0,00012	00013	00014	00016	00018	00020	00023	00026	00029	00032
6,	-0,00036	00040	00045	00051	00057	00064	00072	00081	00091	00102
5,	-0,00115	00121	00145	00164	00184	00207	00234	00263	00297	00335
4,	-0,00378	00427	00482	00545	00616	00697	00789	00894	01013	01149
3,	-0,01305	01482	01686	01918	02185	02491	02844	03245	03719	04261
2,	-0,04890	05620	06471	07465	08631	10002	11622	13545	15841	18599
1,	-0,2194	-0,2604	-0,3106	-0,3738	-0,4544	-0,5598	-0,7024	-0,9057	-1,2227	-1,8229
0,	-2	-1,6228	-0,8218	-0,3027	+0,1048	+0,4542	+0,7699	+1,0649	+1,3474	+1,6228
1,	+1,8951	2,1674	2,4421	2,7214	3,0072	3,3013	3,6053	3,9210	4,2499	4,5937
2,	+4,9542	5,3332	5,7326	6,1544	6,6007	7,0738	7,5761	8,1103	8,6793	9,2866
3,	+9,9338	10,6263	11,3673	12,1610	13,0121	13,9254	14,9063	15,9606	17,0948	18,3157
4,	+19,631	21,048	22,577	24,217	26,009	27,934	30,014	32,264	34,698	37,332
5,	+40,185	43,276	46,625	50,256	54,193	58,466	63,102	68,135	73,601	79,538
6,	+85,990	93,002	100,626	108,916	117,935	127,747	138,426	150,050	162,707	176,491

$\log x$	$x$	$\text{lix}$	$\log x$	$x$	$\text{lix}$	$\log x$	$x$	$\text{lix}$	$\log x$	$x$	$\text{lix}$
-10	0,04454	-0,04416	-0,5	0,6065	-0,5598	0,01	1,0101	-1,0179	1	2,718	1,895
-9	0,04123	-0,04124	-0,4	0,6703	-0,7024	0,02	1,0202	-3,3147	2	7,389	4,954
-8	0,03335	-0,03377	-0,3	0,7408	-0,9057	0,03	1,0305	-2,8991	3	20,086	9,934
-7	0,02912	-0,02115	-0,2	0,8187	-1,2227	0,04	1,0408	-2,6013	4	54,598	19,631
-6	0,02448	-0,02360	-0,1	0,9048	-1,8229	0,05	1,0513	-2,3679	5	148,413	40,185
-5	0,02074	-0,02115	-0,05	0,9512	-2,4679	0,1	1,1052	-1,6228	6	403,43	85,990
-4	0,01832	-0,02378	-0,04	0,9608	-2,6813	0,2	1,2214	-0,8218	7	1096,63	191,50
-3	0,01679	-0,01305	-0,03	0,9704	-2,9591	0,3	1,3499	-0,3027	8	2980,96	440,38
-2	0,13534	-0,04890	-0,02	0,9802	-3,3547	0,4	1,4918	+0,1048	9	8103,08	1037,88
-1	0,36788	-0,21938	-0,01	0,9900	-4,0379	0,5	1,6487	+0,4542	10	22026,47	2492,23

Valeurs de la fonction  $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx$ .

$x$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d
0,0	0,0000	0113	0226	0338	0451	0564	0676	0789	0901	1013	112
0,1	1125	1236	1348	1459	1569	1680	1790	1900	2009	2118	100
0,2	2227	2335	2443	2550	2657	2763	2869	2974	3079	3183	100
0,3	3286	3389	3491	3593	3694	3794	3893	3992	4090	4187	97
0,4	4284	4380	4475	4569	4662	4755	4847	4937	5028	5117	88
0,5	0,5205	5292	5379	5465	5549	5633	5716	5798	5879	5959	80
0,6	6039	6117	6194	6270	6346	6420	6494	6566	6638	6708	70
0,7	6778	6847	6914	6981	7047	7112	7175	7238	7300	7361	60
0,8	7421	7480	7538	7595	7651	7707	7761	7814	7867	7918	51
0,9	7969	8019	8068	8116	8163	8209	8254	8299	8344	8385	42
1,0	0,8427	8468	8508	8548	8586	8624	8661	8698	8733	8768	31
1,1	8802	8835	8868	8900	8931	8961	8991	9020	9048	9076	27
1,2	9103	9130	9155	9181	9205	9229	9252	9275	9297	9319	21
1,3	9340	9361	9381	9400	9419	9438	9456	9473	9490	9507	16
1,4	9523	9539	9554	9569	9583	9597	9611	9624	9637	9649	12
1,5	0,9661	9673	9684	9695	9706	9716	9726	9736	9745	9755	8
1,6	9763	9772	9780	9788	9796	9804	9811	9818	9825	9832	6
1,7	9838	9844	9850	9856	9861	9867	9872	9877	9882	9886	5
1,8	9891	9895	9899	9903	9907	9911	9915	9918	9922	9925	3
1,9	9928	9931	9934	9937	9939	9942	9944	9947	9949	9951	2
2,	0,9953	9970	9981	9989	9993	9996	9998	9999	9999	*0000	

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx = a_1 x - a_2 x^3 + a_3 x^5 - \dots = 1 - e^{-x^2} \left( \frac{b_1}{x} - \frac{b_2}{x^3} + \frac{b_3}{x^5} - \dots \right)$$

$$a_{2n+1} = \frac{2}{1.2.3 \dots n.(2n+1)\sqrt{\pi}}, \quad b_{2n+1} = \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n \sqrt{\pi}}$$

$a_1$	0,5024	5506	$a_9$	3,7180	0131	$b_1$	1,7514	2506	$b_9$	0,5684	9438
$a_2$	1,5753	3380	$a_{11}$	4,9318	8113	$b_2$	1,4503	9507	$b_{11}$	1,2217	0689
$a_3$	1,0524	5506	$a_{13}$	4,0811	7921	$b_3$	1,6264	8613	$b_{13}$	1,9620	6958
$a_7$	2,4292	0577	$a_{15}$	5,1739	3326	$b_7$	0,0244	2634	$b_{15}$	2,7749	8294

They are all given in the logarithmic tables, as usual in the 3<sup>rd</sup> reduction. They work all right.

XVIII. — TABLE DES CARRÉS


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d
<b>0,00</b>	0,0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0001	0001	0
<b>01</b>	0001	0001	0001	0002	0002	0002	0003	0003	0003	0004	0
<b>02</b>	0004	0004	0005	0005	0006	0006	0007	0007	0008	0008	1
<b>03</b>	0009	0010	0010	0011	0012	0012	0013	0014	0014	0015	1
<b>04</b>	0016	0017	0018	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	1
<b>0,05</b>	0,0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0034	0035	1
<b>06</b>	0036	0037	0038	0040	0041	0042	0044	0045	0046	0048	1
<b>07</b>	0049	0050	0052	0053	0055	0056	0058	0059	0061	0062	2
<b>08</b>	0064	0066	0067	0069	0071	0072	0074	0076	0077	0079	2
<b>09</b>	0081	0083	0085	0086	0088	0090	0092	0094	0096	0098	2
<b>0,10</b>	0,0100	0102	0104	0106	0108	0110	0112	0114	0117	0119	2
<b>11</b>	0121	0123	0125	0128	0130	0132	0135	0137	0139	0142	2
<b>12</b>	0144	0146	0149	0151	0154	0156	0159	0161	0164	0166	3
<b>13</b>	0169	0172	0174	0177	0180	0182	0185	0188	0190	0193	3
<b>14</b>	0196	0199	0202	0204	0207	0210	0213	0216	0219	0222	3
<b>0,15</b>	0,0225	0228	0231	0234	0237	0240	0243	0246	0250	0253	3
<b>16</b>	0256	0259	0262	0266	0269	0272	0276	0279	0282	0286	3
<b>17</b>	0289	0292	0296	0299	0303	0306	0310	0313	0317	0320	4
<b>18</b>	0324	0328	0331	0335	0339	0342	0346	0350	0353	0357	4
<b>19</b>	0361	0365	0369	0372	0376	0380	0384	0388	0392	0396	4
<b>0,20</b>	0,0400	0404	0408	0412	0416	0420	0424	0428	0433	0437	4
<b>21</b>	0441	0445	0449	0454	0458	0462	0467	0471	0475	0480	4
<b>22</b>	0484	0488	0493	0497	0502	0506	0511	0515	0520	0524	5
<b>23</b>	0529	0534	0538	0543	0548	0552	0557	0562	0566	0571	5
<b>24</b>	0576	0581	0586	0590	0595	0600	0605	0610	0615	0620	5
<b>0,25</b>	0,0625	0630	0635	0640	0645	0650	0655	0660	0666	0671	5
<b>26</b>	0676	0681	0686	0692	0697	0702	0708	0713	0718	0724	5
<b>27</b>	0729	0734	0740	0745	0751	0756	0762	0767	0773	0778	6
<b>28</b>	0784	0790	0795	0801	0807	0812	0818	0824	0829	0835	6
<b>29</b>	0841	0847	0853	0858	0864	0870	0876	0882	0888	0894	6
<b>0,30</b>	0,0900	0906	0912	0918	0924	0930	0936	0942	0949	0955	6
<b>31</b>	0961	0967	0973	0980	0986	0992	0999	1005	1011	1018	6
<b>32</b>	1024	1030	1037	1043	1050	1056	1063	1069	1076	1082	7
<b>33</b>	1089	1096	1102	1109	1116	1122	1129	1136	1142	1149	7
<b>34</b>	1156	1163	1170	1176	1183	1190	1197	1204	1211	1218	7
<b>0,35</b>	0,1225	1232	1239	1246	1253	1260	1267	1274	1282	1289	7
<b>36</b>	1296	1303	1310	1318	1325	1332	1340	1347	1354	1362	7
<b>37</b>	1369	1376	1384	1391	1399	1406	1414	1421	1429	1436	8
<b>38</b>	1444	1452	1459	1467	1475	1482	1490	1498	1505	1513	8
<b>39</b>	1521	1529	1537	1544	1552	1560	1568	1576	1584	1592	8
<b>0,40</b>	0,1600	1608	1616	1624	1632	1640	1648	1656	1665	1673	8
<b>41</b>	1681	1689	1697	1706	1714	1722	1731	1739	1747	1756	8
<b>42</b>	1764	1772	1781	1789	1798	1806	1815	1823	1832	1840	9
<b>43</b>	1849	1858	1866	1875	1884	1892	1901	1910	1918	1927	9
<b>44</b>	1936	1945	1954	1962	1971	1980	1989	1998	2007	2016	9
<b>0,45</b>	0,2025	2034	2043	2052	2061	2070	2079	2088	2098	2107	9
<b>46</b>	2116	2125	2134	2144	2153	2162	2172	2181	2190	2200	9
<b>47</b>	2209	2218	2228	2237	2247	2256	2266	2275	2285	2294	10
<b>48</b>	2304	2314	2323	2333	2343	2352	2362	2372	2381	2391	10
<b>49</b>	2401	2411	2421	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	10
<b>0,50</b>	0,2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2581	2591	10
<b>51</b>	2601	2611	2621	2632	2642	2652	2663	2673	2683	2694	10
<b>52</b>	2704	2714	2725	2735	2746	2756	2767	2777	2788	2798	11
<b>53</b>	2809	2820	2830	2841	2852	2862	2873	2884	2894	2905	11
<b>54</b>	2916	2927	2938	2948	2959	2970	2981	2992	3003	3014	11
<b>0,55</b>	0,3025	3036	3047	3058	3069	3080	3091	3102	3114	3125	11
<b>56</b>	3136	3147	3158	3170	3181	3192	3204	3215	3226	3238	11
<b>57</b>	3249	3260	3272	3283	3295	3306	3318	3329	3341	3352	12
<b>58</b>	3364	3376	3387	3399	3411	3422	3434	3446	3457	3469	12
<b>59</b>	3481	3493	3505	3516	3528	3540	3552	3564	3576	3588	12

A QUATRE DÉCIMALES.


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	d
<b>0,60</b>	0,3600	3612	3624	3636	3648	3660	3672	3684	3697	3709	12
<b>61</b>	3721	3733	3745	3758	3770	3782	3795	3807	3819	3832	12
<b>62</b>	3844	3856	3869	3881	3894	3906	3919	3931	3944	3956	13
<b>63</b>	3969	3982	3994	4007	4020	4032	4045	4058	4070	4083	13
<b>64</b>	4096	4109	4122	4134	4147	4160	4173	4186	4199	4212	13
<b>0,65</b>	0,4225	4238	4251	4264	4277	4290	4303	4316	4330	4343	13
<b>66</b>	4356	4369	4382	4396	4409	4422	4436	4449	4462	4476	13
<b>67</b>	4489	4502	4516	4529	4543	4556	4570	4583	4597	4610	14
<b>68</b>	4624	4638	4651	4665	4679	4692	4706	4720	4733	4747	14
<b>69</b>	4761	4775	4789	4802	4816	4830	4844	4858	4872	4886	14
<b>0,70</b>	0,4900	4914	4928	4942	4956	4970	4984	4998	5013	5027	14
<b>71</b>	5041	5055	5069	5084	5098	5112	5127	5141	5155	5170	14
<b>72</b>	5184	5198	5213	5227	5242	5256	5271	5285	5300	5314	15
<b>73</b>	5329	5344	5358	5373	5388	5402	5417	5432	5446	5461	15
<b>74</b>	5476	5491	5506	5520	5535	5550	5565	5580	5595	5610	15
<b>0,75</b>	0,5625	5640	5655	5670	5685	5700	5715	5730	5746	5761	15
<b>76</b>	5776	5791	5806	5822	5837	5852	5868	5883	5898	5914	15
<b>77</b>	5929	5944	5960	5975	5991	6006	6022	6037	6053	6068	16
<b>78</b>	6084	6100	6115	6131	6147	6162	6178	6194	6209	6225	16
<b>79</b>	6241	6257	6273	6288	6304	6320	6336	6352	6368	6384	16
<b>0,80</b>	0,6400	6416	6432	6448	6464	6480	6496	6512	6529	6545	16
<b>81</b>	6561	6577	6593	6610	6626	6642	6659	6675	6691	6708	16
<b>82</b>	6724	6740	6757	6773	6790	6806	6823	6839	6856	6872	17
<b>83</b>	6889	6906	6922	6939	6956	6972	6989	7006	7022	7039	17
<b>84</b>	7056	7073	7090	7106	7123	7140	7157	7174	7191	7208	17
<b>0,85</b>	0,7225	7242	7259	7276	7293	7310	7327	7344	7362	7379	17
<b>86</b>	7396	7413	7430	7448	7465	7482	7500	7517	7534	7552	17
<b>87</b>	7569	7586	7604	7621	7639	7656	7674	7691	7709	7726	18
<b>88</b>	7744	7762	7779	7797	7815	7832	7850	7868	7885	7903	18
<b>89</b>	7921	7939	7957	7974	7992	8010	8028	8046	8064	8082	18
<b>0,90</b>	0,8100	8118	8136	8154	8172	8190	8208	8226	8245	8263	18
<b>91</b>	8281	8299	8317	8336	8354	8372	8391	8409	8427	8446	18
<b>92</b>	8464	8482	8501	8519	8538	8556	8575	8593	8612	8630	19
<b>93</b>	8649	8668	8686	8705	8724	8742	8761	8780	8798	8817	19
<b>94</b>	8836	8855	8874	8892	8911	8930	8949	8968	8987	9006	19
<b>0,95</b>	0,9025	9044	9063	9082	9101	9120	9139	9158	9178	9197	19
<b>96</b>	9216	9235	9254	9274	9293	9312	9332	9351	9370	9390	19
<b>97</b>	9409	9428	9448	9467	9487	9506	9526	9545	9565	9584	20
<b>98</b>	9604	9624	9643	9663	9683	9702	9722	9742	9761	9781	20
<b>99</b>	9801	9821	9841	9860	9880	9900	9920	9940	9960	9980	20
<b>1,00</b>	1,0000	0020	0040	0060	0080	0100	0120	0140	0161	0181	20
<b>01</b>	0201	0221	0241	0262	0282	0302	0323	0343	0363	0384	20
<b>02</b>	0404	0424	0445	0465	0486	0506	0527	0547	0568	0588	21
<b>03</b>	0609	0630	0650	0671	0692	0712	0733	0754	0774	0795	21
<b>04</b>	0816	0837	0858	0878	0899	0920	0941	0962	0983	1004	21
<b>1,05</b>	1,1025	1046	1067	1088	1109	1130	1151	1172	1194	1215	21
<b>06</b>	1236	1257	1278	1300	1321	1342	1364	1385	1406	1428	21
<b>07</b>	1449	1470	1492	1513	1535	1556	1578	1599	1621	1642	22
<b>08</b>	1664	1686	1707	1729	1751	1772	1794	1816	1837	1859	22
<b>09</b>	1881	1903	1925	1946	1968	1990	2012	2034	2056	2078	22
<b>1,10</b>	1,2100	2122	2144	2166	2188	2210	2232	2254	2277	2299	22
<b>11</b>	2321	2343	2365	2388	2410	2432	2455	2477	2499	2522	22
<b>12</b>	2544	2566	2589	2611	2634	2656	2679	2701	2724	2746	23
<b>13</b>	2769	2792	2814	2837	2860	2882	2905	2928	2950	2973	23
<b>14</b>	2996	3019	3042	3064	3087	3110	3133	3156	3179	3202	23
<b>1,15</b>	1,3225	3248	3271	3294	3317	3340	3363	3386	3410	3433	23
<b>16</b>	3456	3479	3502	3526	3549	3572	3596	3619	3642	3666	23
<b>17</b>	3689	3712	3736	3759	3783	3806	3830	3853	3877	3900	24
<b>18</b>	3924	3948	3971	3995	4019	4042	4066	4090	4113	4137	24
<b>19</b>	4161	4185	4209	4232	4256	4280	4304	4328	4352	4376	24














D. 2  
A

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

*Scary - Vacuum Labs*  
*8/22/47*

